



2011年12月の放射能測定結果 314件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米 (こしひかり)	石川県輪島市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米 (あきたこまち)	秋田県湯沢市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	新潟県産見附市	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	北茨城市関南町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡浪江町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	南相馬市鹿島区	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	須賀川市岩瀬	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米 (ひとめぼれ)	河沼郡 会津坂下町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米 (ササニシキ)	会津若松市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	耶麻郡西会津町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	田村郡小野町 夏井	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市 四倉町八茎	2011年10月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 八茎	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 八茎	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 北神谷	2011年10月	Cs137	6.2 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	12.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 神谷	2011年10月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市山玉町	2011年10月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	12.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町 下小川	2011年9月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2011年9月	Cs137	9.2 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	15.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2011年10月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	15.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.2 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市内郷 高野町	2011年9月	Cs137	7.1 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	10.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市田人町 黒田	2011年10月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	9.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市沼部町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 西郷町	2011年12月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	9.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 藤原町	2011年9月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市鹿島町 蔵持	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市泉玉露	2011年10月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町 上釜戸	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町 上釜戸	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町 洞	2011年10月	Cs137	15.0 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	23.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
白米	北海道	2010年	Cs137	2.5	±	2.4	2.5	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0
白米	山形県長井市	2011年9月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
白米	茨城県北茨城市 華川町	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.5	Cs137	7.0
			Cs134	3.5	±	2.2		Cs134	6.0
白米	宮城県仙台市	2011年10月	Cs137	3.7	±	2.5	3.7	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0
白米	二本松市	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.3	Cs137	6.0
			Cs134	2.3	±	2.1		Cs134	4.0
白米	大沼郡 会津美里町	2011年10月	Cs137	4.0	±	2.8	7.9	Cs137	7.0
			Cs134	3.9	±	2.2		Cs134	6.0
白米	田村郡小野町 夏井	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.0	Cs137	7.0
			Cs134	3.0	±	2.2		Cs134	6.0
白米	田村郡小野町	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.2	Cs137	7.0
			Cs134	3.2	±	2.2		Cs134	6.0
白米	いわき市四倉町 八茎	2011年11月	Cs137	0.0	±	0.0	2.4	Cs137	6.0
			Cs134	2.4	±	2.2		Cs134	4.0
白米	いわき市四倉町 八茎	2011年11月	Cs137	0.0	±	0.0	2.4	Cs137	6.0
			Cs134	2.4	±	2.2		Cs134	4.0
白米	いわき市四倉町 駒込	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.9	Cs137	6.0
			Cs134	3.9	±	2.0		Cs134	4.0
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	4.5	Cs137	7.0
			Cs134	4.5	±	2.3		Cs134	6.0
白米	いわき市平 赤井	2010年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.9	Cs137	6.0
			Cs134	3.9	±	2.1		Cs134	4.0
白米	いわき市平 赤井	2010年10月	Cs137	2.5	±	2.5	2.5	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0
白米	いわき市平神谷	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	4.2	Cs137	6.0
			Cs134	4.2	±	2.2		Cs134	4.0
白米	いわき市平 中神谷	不明	Cs137	4.4	±	2.6	8.4	Cs137	7.0
			Cs134	4.0	±	2.1		Cs134	6.0
白米	いわき市平 下神谷	2011年11月	Cs137	4.4	±	2.7	6.5	Cs137	6.0
			Cs134	2.1	±	2.1		Cs134	4.0
白米	いわき市平 下片寄	2011年10月	Cs137	4.7	±	2.7	7.2	Cs137	6.0
			Cs134	2.5	±	2.2		Cs134	4.0
白米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.8	Cs137	6.0
			Cs134	2.8	±	2.1		Cs134	4.0
白米	いわき市平 高久	2011年10月	Cs137	3.4	±	2.7	6.7	Cs137	7.0
			Cs134	3.3	±	2.2		Cs134	6.0
白米	いわき市平 下高久	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.0	Cs137	7.0
			Cs134	3.0	±	2.2		Cs134	6.0
白米	いわき市平中塩	2010年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.3	Cs137	6.0
			Cs134	2.3	±	2.1		Cs134	4.0
白米	いわき市平 上平窪	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.8	Cs137	7.0
			Cs134	2.8	±	2.2		Cs134	6.0
白米	いわき市好間町 小谷作	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	4.2	Cs137	6.0
			Cs134	4.2	±	2.1		Cs134	4.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
白米	いわき市小川町 西小川	2011年9月	Cs137	0.0	±	0.0	3.5	Cs137	7.0
			Cs134	3.5	±	2.2		Cs134	6.0
白米	いわき市小川町 根本	2011年10月	Cs137	3.8	±	2.7	3.8	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
白米	いわき市田人町	2011年10月	Cs137	4.4	±	2.7	7.3	Cs137	7.0
			Cs134	2.9	±	2.2		Cs134	6.0
白米	いわき市田人町 黒田	2011年11月	Cs137	0.0	±	0.0	3.5	Cs137	7.0
			Cs134	3.5	±	2.1		Cs134	6.0
白米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0
白米	いわき市遠野町 上遠野	2011年10月	Cs137	5.1	±	3.5	10.7	Cs137	7.0
			Cs134	5.6	±	2.8		Cs134	6.0
白米	いわき市遠野町 上遠野	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	4.0	Cs137	7.0
			Cs134	4.0	±	2.2		Cs134	6.0
白米	いわき市鹿島町	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.9	Cs137	7.0
			Cs134	3.9	±	2.9		Cs134	6.0
白米	いわき市常磐 上矢田町	不明	Cs137	3.9	±	2.7	7.3	Cs137	6.0
			Cs134	3.4	±	2.2		Cs134	4.0
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.5	Cs137	6.0
			Cs134	3.5	±	2.1		Cs134	4.0
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	3.2	±	2.5	3.2	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0
白米	いわき市川部町 松ノ下	2011年11月	Cs137	0.0	±	0.0	2.7	Cs137	7.0
			Cs134	2.7	±	2.1		Cs134	6.0
白米	いわき市 小名浜大原	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	4.0	Cs137	6.0
			Cs134	4.0	±	2.1		Cs134	4.0
白米	いわき市 泉町本谷	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.9	Cs137	7.0
			Cs134	3.9	±	2.1		Cs134	6.0
白米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.9	Cs137	6.0
			Cs134	2.9	±	2.1		Cs134	4.0
白米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	3.7	±	2.6	7.5	Cs137	7.0
			Cs134	3.8	±	2.1		Cs134	6.0
白米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	3.8	±	2.7	7.7	Cs137	7.0
			Cs134	3.9	±	2.2		Cs134	6.0
白米	不明	不明	Cs137	0.0	±	0.0	2.5	Cs137	6.0
			Cs134	2.5	±	2.1		Cs134	4.0
白米	不明	2011年12月	Cs137	3.3	±	2.7	6.4	Cs137	7.0
			Cs134	3.1	±	2.2		Cs134	6.0
もち米(玄米)	いわき市田人町	2011年10月	Cs137	4.5	±	2.9	8.8	Cs137	7.0
			Cs134	4.3	±	2.3		Cs134	6.0
もち米(玄米)	いわき市勿来町	2011年9月	Cs137	11.9	±	4.0	22.1	Cs137	6.0
			Cs134	10.2	±	3.2		Cs134	4.0
もち米(玄米)	いわき市渡辺町 泉田	2011年10月	Cs137	6.3	±	3.1	9.0	Cs137	6.0
			Cs134	2.7	±	2.3		Cs134	4.0
もち米	山形県南陽市	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.5	Cs137	7.0
			Cs134	2.5	±	2.1		Cs134	6.0
もち米	福島市大波	2011年11月	Cs137	10.0	±	3.7	17.8	Cs137	7.0
			Cs134	7.8	±	2.9		Cs134	6.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
もち米	いわき市高倉町	2011年10月	Cs137	5.4	±	2.9	11.9	Cs137	6.0
			Cs134	6.5	±	2.6		Cs134	4.0
もち米	いわき市遠野町 上遠野	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	3.5	Cs137	7.0
			Cs134	3.5	±	2.2		Cs134	6.0
もち米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	4.8	±	2.7	8.8	Cs137	6.0
			Cs134	4.0	±	2.2		Cs134	4.0
もち米	いわき市小名浜	2011年10月	Cs137	6.8	±	0.4	11.1	Cs137	8.0
			Cs134	4.3	±	0.6		Cs134	8.0
もち米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	0.7	±	0.3	1.0	Cs137	8.0
			Cs134	0.3	±	0.5		Cs134	8.0
じゃがいも	いわき市三和町 合戸	2011年7月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
じゃがいも	いわき市 平下神谷	2011年7月	Cs137	1.5	±	0.4	7.3	Cs137	8.0
			Cs134	5.8	±	0.6		Cs134	8.0
じゃがいも	いわき市平 下神谷	2011年7月	Cs137	0.0	±	0.0	3.1	Cs137	6.0
			Cs134	3.1	±	3.0		Cs134	4.0
じゃがいも	いわき市平 下高久	2011年6月	Cs137	3.5	±	0.4	4.4	Cs137	8.0
			Cs134	0.9	±	0.6		Cs134	8.0
じゃがいも	いわき市平 下平窪	不明	Cs137	1.9	±	19.8	1.9	Cs137	10.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	10.0
じゃがいも	いわき市平中山	2011年7月	Cs137	0.0	±	0.0	3.6	Cs137	6.0
			Cs134	3.6	±	2.3		Cs134	4.0
さつまいも	いわき市内郷 御台境	2011年12月	Cs137	2.8	±	0.4	3.1	Cs137	10.0
			Cs134	0.3	±	0.6		Cs134	10.0
じゃがいも	いわき市鹿島町 下畑	2011年8月	Cs137	4.9	±	0.4	6.2	Cs137	8.0
			Cs134	1.3	±	0.6		Cs134	8.0
じゃがいも	いわき市遠野町	2011年7月	Cs137	0.0	±	0.0	2.9	Cs137	6.0
			Cs134	2.9	±	2.6		Cs134	4.0
じゃがいも	いわき市 泉町本谷	2011年7月	Cs137	4.1	±	3.3	4.1	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
じゃがいも	いわき市田人町 貝泊	2011年9月	Cs137	5.9	±	3.2	5.9	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0
じゃがいも	いわき市 常磐西郷町	2011年7月	Cs137	0.0	±	0.0	3.5	Cs137	7.0
			Cs134	3.5	±	2.2		Cs134	6.0
じゃがいも	いわき市永崎	2011年7月	Cs137	1.2	±	0.4	4.0	Cs137	10.0
			Cs134	2.8	±	0.6		Cs134	10.0
じゃがいも	いわき市小名浜	2011年6月	Cs137	1.4	±	0.4	2.7	Cs137	8.0
			Cs134	1.3	±	0.6		Cs134	8.0
じゃがいも	いわき市小名浜	2011年6月	Cs137	4.8	±	0.4	10.1	Cs137	8.0
			Cs134	5.3	±	0.6		Cs134	8.0
じゃがいも	いわき市小名浜 大原	2011年7月	Cs137	0.0	±	0.0	5.3	Cs137	7.0
			Cs134	5.3	±	2.9		Cs134	6.0
里芋	富山県黒部市	不明	Cs137	0.0	±	0.0	5.1	Cs137	7.0
			Cs134	5.1	±	3.1		Cs134	6.0
里芋	いわき市四倉町 細谷	2011年11月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0
里芋	いわき市平 下山口	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	6.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	4.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生	Cs137		Bq/Kg生	Cs134	Bq/Kg生
里芋	いわき市田人町 南大平	2011年11月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	±	2.6	4.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	4.0	Bq/Kg生
里芋	いわき市常磐 上湯長谷	2011年11月	Cs137	0.8	Bq/Kg生	±	0.3	0.8	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	10.0	Bq/Kg生
里芋	いわき市平 下山口	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	4.0	Bq/Kg生
里芋	いわき市泉玉露	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
里芋	いわき市泉玉露	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
里芋	いわき市小名浜 岡小名	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
とろろいも	いわき市小名浜 上神白	2011年12月	Cs137	13.0	Bq/Kg生	±	3.6	25.0	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.0	Bq/Kg生	±	5.6		Cs134	8.0	Bq/Kg生
とろろいも	いわき市小名浜 上神白	2011年12月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	±	0.4	5.0	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	±	0.6		Cs134	8.0	Bq/Kg生
京芋	いわき市田人町 黒田	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	5.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.8	Bq/Kg生	±	3.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
山芋	いわき市高倉町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	3.7	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	±	3.3		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大和芋	いわき市泉玉露	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	3.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	±	2.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じねんじょ	いわき市好間町 小谷作	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	10.0	Bq/Kg生
大根(葉付き)	いわき市 平中神谷	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	2.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	±	2.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市大久町 大久	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	2.7	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	±	2.7		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大根	いわき市好間町 下好間	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	8.0	Bq/Kg生
大根	いわき市好間町 北好間	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市平 上平窪	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	2.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	±	2.3		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大根	いわき市平 赤井	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	3.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	±	2.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市平 下高久	2011年12月	Cs137	0.2	Bq/Kg生	±	0.4	0.2	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	8.0	Bq/Kg生
大根	いわき市平 下山口	2011年12月	Cs137	5.6	Bq/Kg生	±	3.4	10.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	±	2.8		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大根	いわき市平 下山口	2011年12月	Cs137	5.6	Bq/Kg生	±	3.4	10.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	±	2.8		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大根	いわき市小川町 柴原	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	2.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	±	2.3		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市常磐 藤原町	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市 常磐西郷町	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
大根	いわき市内郷 綴町	2011年12月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市内郷 白水町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市泉町 下川	2011年12月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小名浜 上神白	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市田人町 貝泊	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市錦町 馬場	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市渡辺町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
丸大根	いわき市平中山	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
大根菜	いわき市内郷 白水町	2011年12月	Cs137	8.9 Bq/Kg生	± 8.9 Bq/Kg生	22.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	13.4 Bq/Kg生	± 7.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市平 赤井	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市大久町 大久	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市四倉町 屋敷前	2011年12月	Cs137	38.6 Bq/Kg生	± 9.0 Bq/Kg生	72.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	33.6 Bq/Kg生	± 7.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市四倉町 玉山	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市好間町 北好間	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市 平神谷	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.3 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 上平窪	2011年12月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 0.4 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 赤井	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 下荒川	2011年12月	Cs137	8.5 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 下山口	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市内郷 白水町	2011年12月	Cs137	7.1 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生	15.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.0 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市内郷 綴町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.5 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市 常磐西郷町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市 常磐西郷町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市常磐 水ノ谷町	2011年12月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生	12.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生	Cs137		Bq/Kg生	Cs134	Bq/Kg生
白菜	いわき市遠野町 根岸	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	4.0
白菜	いわき市遠野町 深山田	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	10.0
白菜	いわき市泉玉露	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	6.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.6	Bq/Kg生	±	4.5		Bq/Kg生	Cs134	6.0
白菜	いわき市三沢町	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	4.4	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.4	Bq/Kg生	±	4.3		Bq/Kg生	Cs134	4.0
白菜	いわき市田人町 南大平	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	4.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	±	3.2		Bq/Kg生	Cs134	6.0
白菜	いわき市永崎	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	10.0
白菜	いわき市小名浜 上神白	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	8.0
白菜	いわき市添野町	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	6.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	±	4.0		Bq/Kg生	Cs134	4.0
白菜	いわき市渡辺町	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	6.5	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.5	Bq/Kg生	±	5.8		Bq/Kg生	Cs134	4.0
ねぎ	富山県黒部市	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	5.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.7	Bq/Kg生	±	3.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ねぎ	いわき市四倉町 細谷	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	3.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	±	2.8		Bq/Kg生	Cs134	4.0
ねぎ	いわき市四倉町 玉山	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	10.0
ねぎ	いわき市平 下山口	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	4.9	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	±	3.1		Bq/Kg生	Cs134	4.0
ねぎ	いわき市平 赤井	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	3.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	±	3.3		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ねぎ	いわき市平 下平窪	2011年12月	Cs137	0.8	Bq/Kg生	±	0.4	0.8	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	8.0
ねぎ	いわき市若葉台	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ねぎ	いわき市常磐 水ノ谷町	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	5.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.6	Bq/Kg生	±	5.3		Bq/Kg生	Cs134	4.0
ねぎ	いわき市泉玉露	2011年12月	Cs137	4.4	Bq/Kg生	±	4.5	4.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ねぎ	いわき市田人町 南大平	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ねぎ	いわき市小名浜 上神白	2011年12月	Cs137	4.1	Bq/Kg生	±	0.4	4.1	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	8.0
ねぎ	いわき市小名浜 寺廻町	2011年12月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	±	4.2	8.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	±	3.5		Bq/Kg生	Cs134	4.0
ねぎ	いわき市小名浜 寺廻町	2011年12月	Cs137	6.1	Bq/Kg生	±	4.2	6.1	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	4.0
玉ねぎ	いわき市平泉崎	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	6.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	±	3.1		Bq/Kg生	Cs134	6.0
玉ねぎ	いわき市平 下平窪	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0		Bq/Kg生	Cs134	10.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜 大原	2011年7月	Cs137	8.8	±	4.9	8.8	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
玉ねぎ	いわき市 小名浜大原	2011年9月	Cs137	4.8	±	3.0	7.6	Cs137	6.0
			Cs134	2.8	±	2.5		Cs134	4.0
レタス	いわき市内郷 高野町	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	8.1	Cs137	7.0
			Cs134	8.1	±	4.3		Cs134	6.0
キャベツ	千葉県	2011年12月	Cs137	7.7	±	5.8	17.2	Cs137	7.0
			Cs134	9.5	±	4.9		Cs134	6.0
キャベツ	いわき市平 赤井	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	6.6	Cs137	7.0
			Cs134	6.6	±	4.0		Cs134	6.0
キャベツ	いわき市内郷 高野町	2011年12月	Cs137	7.8	±	6.7	16.9	Cs137	7.0
			Cs134	9.1	±	5.5		Cs134	6.0
キャベツ	いわき市常磐 藤原町	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	5.7	Cs137	7.0
			Cs134	5.7	±	3.7		Cs134	6.0
ほうれん草	いわき市 常磐西郷町	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	8.7	Cs137	7.0
			Cs134	8.7	±	5.1		Cs134	6.0
小松菜	宮城県仙台市 太白区	2011年11月	Cs137	0.5	±	71.4	0.5	Cs137	10.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	10.0
小松菜	いわき市平 赤井	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	6.1	Cs137	7.0
			Cs134	6.1	±	3.5		Cs134	6.0
小松菜	いわき市好間町 下好間	2011年12月	Cs137	11.2	±	7.1	19.0	Cs137	7.0
			Cs134	7.8	±	5.1		Cs134	6.0
水菜	いわき市 常磐西郷町	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	6.5	Cs137	7.0
			Cs134	6.5	±	4.1		Cs134	6.0
雪菜	宮城県仙台市 太白区	2011年11月	Cs137	0.1	±	270	0.1	Cs137	10.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	10.0
春菊	いわき市小名浜 岡小名	2011年12月	Cs137	7.2	±	6.6	7.2	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
春菊	いわき市内郷 白水町	2011年12月	Cs137	5.3	±	0.4	11.2	Cs137	10.0
			Cs134	5.9	±	0.6		Cs134	10.0
へら菜	いわき市四倉町 屋敷前	2011年12月	Cs137	12.8	±	4.1	20.5	Cs137	7.0
			Cs134	7.7	±	2.9		Cs134	6.0
プチヴェール	いわき市 中央台鹿島	2011年12月	Cs137	36.4	±	0.5	72.9	Cs137	10.0
			Cs134	36.5	±	0.7		Cs134	10.0
ブロッコリー	いわき市 平神谷	2011年12月	Cs137	8.4	±	5.7	17.2	Cs137	7.0
			Cs134	8.8	±	4.6		Cs134	6.0
ブロッコリー	いわき市常磐 西郷町	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
ブロッコリー	いわき市錦町 馬場	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	10.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	10.0
ヤーコン(乾燥)	いわき市遠野町 深山田	2011年10月	Cs137	175	±	1.4	365	Cs137	10.0
			Cs134	190	±	1.9		Cs134	10.0
しいたけ	いわき市常磐 湯本天神	2011年12月	Cs137	253	±	2.0	477	Cs137	10.0
			Cs134	224	±	2.2		Cs134	10.0
しいたけ	いわき市遠野町 滝	2011年11月	Cs137	144	±	1.2	275	Cs137	8.0
			Cs134	131	±	1.3		Cs134	8.0
しいたけ	いわき市田人町 南大平	2011年12月	Cs137	121	±	1.0	234	Cs137	10.0
			Cs134	113	±	1.1		Cs134	10.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 上神白	2011年12月	Cs137	88.0	±	0.6	157	Cs137	10.0
			Cs134	68.8	±	0.8		Cs134	10.0
しいたけ	いわき市泉玉露	2011年11月	Cs137	155	±	1.2	305	Cs137	8.0
			Cs134	150	±	1.5		Cs134	8.0
乾燥しいたけ	いわき市常磐 下船尾	2011年11月	Cs137	112	±	29.0	211	Cs137	6.0
			Cs134	98.5	±	24.0		Cs134	4.0
乾燥しいたけ	双葉郡川内村	2011年11月	Cs137	1557	±	10.9	2,872	Cs137	8.0
			Cs134	1315	±	13.2		Cs134	8.0
なめこ	いわき市 四倉町梅ヶ丘	2011年11月	Cs137	548	±	4.9	1,091	Cs137	8.0
			Cs134	543	±	5.4		Cs134	8.0
松茸	いわき市 四倉町玉山	不明	Cs137	55.9	±	0.6	96.4	Cs137	8.0
			Cs134	40.5	±	0.7		Cs134	8.0
ゆず (皮・種含む)	いわき市添野町	2011年12月	Cs137	74.7	±	17.2	141	Cs137	7.0
			Cs134	66.0	±	14.3		Cs134	6.0
ゆず	北茨城市関南町	2011年11月	Cs137	58.2	±	0.8	120	Cs137	10.0
			Cs134	61.4	±	1.0		Cs134	10.0
ゆず	いわき市三沢町	2011年12月	Cs137	40.0	±	9.4	72.3	Cs137	6.0
			Cs134	32.3	±	7.3		Cs134	4.0
ゆず	いわき市好間町 下好間	2011年12月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	8.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	8.0
ゆず	いわき市平	2011年12月	Cs137	72.5	±	0.9	136	Cs137	10.0
			Cs134	63.7	±	1.1		Cs134	10.0
ゆず	いわき市平 下荒川	2011年12月	Cs137	67.8	±	0.8	127	Cs137	10.0
			Cs134	58.8	±	0.9		Cs134	10.0
ゆず	いわき市若葉台	2011年12月	Cs137	64.0	±	0.9	124	Cs137	8.0
			Cs134	60.4	±	1.0		Cs134	8.0
ゆず	いわき市内郷 御台境	2011年12月	Cs137	45.6	±	0.7	87.4	Cs137	10.0
			Cs134	41.8	±	0.9		Cs134	10.0
ゆず	いわき市勿来町 窪田	2011年12月	Cs137	19.8	±	0.5	33.7	Cs137	10.0
			Cs134	13.9	±	0.7		Cs134	10.0
ゆず	いわき市遠野町 大平	2011年12月	Cs137	42.9	±	1.6	80.3	Cs137	10.0
			Cs134	37.4	±	2.3		Cs134	10.0
ゆず	いわき市常磐 上湯長谷町	2011年12月	Cs137	43.3	±	10.3	77.0	Cs137	7.0
			Cs134	33.7	±	7.8		Cs134	6.0
ゆず	いわき市洋向台	2011年12月	Cs137	212	±	1.7	403	Cs137	8.0
			Cs134	191	±	1.9		Cs134	8.0
ゆず	いわき市小名浜 玉川	2011年12月	Cs137	94.4	±	0.9	177	Cs137	8.0
			Cs134	82.8	±	1.1		Cs134	8.0
ゆず	いわき市小名浜 岡小名	2011年12月	Cs137	82.4	±	0.9	152	Cs137	10.0
			Cs134	69.9	±	1.0		Cs134	10.0
みかん	いわき市 平下神谷	2011年12月	Cs137	47.1	±	0.7	89.5	Cs137	8.0
			Cs134	42.4	±	0.9		Cs134	8.0
みかん	いわき市中央台 高久	2011年12月	Cs137	33.9	±	8.1	65.5	Cs137	6.0
			Cs134	31.6	±	7.0		Cs134	4.0
みかん	いわき市 中央台鹿島	2011年12月	Cs137	127	±	1.1	248	Cs137	10.0
			Cs134	121	±	1.3		Cs134	10.0
みかん	いわき市小名浜 野田	2011年12月	Cs137	61.4	±	0.8	117	Cs137	8.0
			Cs134	55.2	±	0.9		Cs134	8.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 住吉	2011年12月	Cs137	25.9	±	0.6	53.9	Cs137	8.0
			Cs134	28.0	±	0.8		Cs134	8.0
みかん	いわき市勿来町 窪田	2011年12月	Cs137	24.9	±	0.6	44.2	Cs137	10.0
			Cs134	19.3	±	0.8		Cs134	10.0
みかん	いわき市泉ヶ丘	2011年11月	Cs137	14.8	±	4.4	30.2	Cs137	7.0
			Cs134	15.4	±	3.9		Cs134	6.0
れもん	いわき市泉ヶ丘	2011年12月	Cs137	18.0	±	5.2	37.8	Cs137	7.0
			Cs134	19.8	±	4.8		Cs134	6.0
夏みかん	いわき市平 下荒川	2011年12月	Cs137	55.7	±	12.9	99.0	Cs137	6.0
			Cs134	43.3	±	9.7		Cs134	4.0
キウイ	川内村	2011年12月	Cs137	12.0	±	0.5	22.6	Cs137	8.0
			Cs134	10.6	±	0.7		Cs134	8.0
キウイ	いわき市桜ヶ丘	2011年11月	Cs137	33.2	±	0.6	62.6	Cs137	8.0
			Cs134	29.4	±	0.9		Cs134	8.0
キウイ	いわき市常磐 上湯長谷町	2011年11月	Cs137	36.4	±	1.8	68.9	Cs137	10.0
			Cs134	32.5	±	2.5		Cs134	10.0
キウイ	いわき市常磐 上湯長谷	2011年11月	Cs137	36.4	±	0.7	68.9	Cs137	10.0
			Cs134	32.5	±	0.8		Cs134	10.0
キウイ	いわき市鹿島町 下畑	2011年11月	Cs137	25.5	±	0.6	48.7	Cs137	8.0
			Cs134	23.2	±	0.8		Cs134	8.0
キウイ	いわき市小名浜	2011年12月	Cs137	14.0	±	0.5	23.4	Cs137	8.0
			Cs134	9.4	±	0.7		Cs134	8.0
キウイ	いわき市小名浜 岡小名	2011年11月	Cs137	15.9	±	0.5	24.9	Cs137	10.0
			Cs134	9.0	±	0.7		Cs134	10.0
キウイ	いわき市添野町	2011年11月	Cs137	5.0	±	3.3	13.2	Cs137	7.0
			Cs134	8.2	±	3.0		Cs134	6.0
りんご	福島市大笹生	2011年12月	Cs137	16.3	±	4.7	30.9	Cs137	6.0
			Cs134	14.6	±	3.8		Cs134	4.0
柿	双葉郡川内村	2011年11月	Cs137	8.9	±	0.5	18.6	Cs137	8.0
			Cs134	9.7	±	0.7		Cs134	8.0
柿	いわき市小名浜 中町境	2011年12月	Cs137	10.5	±	0.5	16.5	Cs137	8.0
			Cs134	6.0	±	0.6		Cs134	8.0
ぬき柿	いわき市小名浜 野田	2011年11月	Cs137	4.8	±	0.4	9.1	Cs137	8.0
			Cs134	4.3	±	0.6		Cs134	8.0
干柿	いわき市植田町	2011年11月	Cs137	18.2	±	5.0	37.4	Cs137	6.0
			Cs134	19.2	±	4.6		Cs134	4.0
干し柿	いわき市平 中平窪	2011年12月	Cs137	23.9	±	0.6	46.4	Cs137	8.0
			Cs134	22.5	±	0.8		Cs134	8.0
干し柿	いわき市四倉 駒込	2011年11月	Cs137	19.8	±	0.6	41.8	Cs137	8.0
			Cs134	22.0	±	0.8		Cs134	8.0
猪肉	いわき市三和町 差塩	2011年12月	Cs137	104	±	21.0	185	Cs137	6.0
			Cs134	81.0	±	16.2		Cs134	4.0
猪肉	いわき市三和町	不明	Cs137	69.3	±	15.1	131	Cs137	7.0
			Cs134	62.1	±	12.6		Cs134	6.0
猪肉	いわき市三和町	2011年12月	Cs137	90.1	±	1.0	167	Cs137	8.0
			Cs134	77.0	±	1.2		Cs134	8.0
猪肉	いわき市常磐 藤原町	2011年12月	Cs137	0.6	±	0.4	0.6	Cs137	10.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	10.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
猪肉	いわき市常磐 藤原町	2011年11月	Cs137	119 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生	221	Cs137	10.0 Bq/Kg生	
			Cs134	102 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生	
はちみつ	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	70.2 Bq/Kg生	± 15.1 Bq/Kg生	135	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	64.4 Bq/Kg生	± 12.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
牛乳	本宮市	不明	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 0.2 Bq/Kg生	1.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生	
牛乳 (学校給食)	本宮市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生	
いちご ヨーグルト	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
粉ミルク	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
粉ミルク	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
乾麺	小麦(外国産) 青海苔(相馬市)	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
生ラーメン	不明	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
梅干し	いわき市小名浜 岡小名	2011年6月	Cs137	24.8 Bq/Kg生	± 6.3 Bq/Kg生	49.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	24.3 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
漬け物	いわき市 平久保町	2011年11月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
とうふ	北海道産 大豆使用	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
納豆	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ミックス野菜	いわき市平 下荒川	2011年12月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 0.4 Bq/Kg生	13.3	Cs137	10.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.6 Bq/Kg生	± 0.6 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	2011年12月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市常磐 上湯長谷町	2011年12月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
夕食一食分	不明	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
夕食3食分	不明	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
おがくず	群馬県	2011年5月	Cs137	23.8 Bq/Kg生	± 37.0 Bq/Kg生	52.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	28.3 Bq/Kg生	± 7.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市小川町 上小川	2011年12月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 0.2 Bq/Kg生	1.8	Cs137	10.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市平 下平窪	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市中央台 鹿島	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市小名浜 岡小名	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
井戸水 (沢水)	石川郡 古殿町論田	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水 (生活水)	いわき市三和町 中寺	2011年12月	Cs137	16.3 Bq/Kg生	± 1.6	Bq/Kg生	35.5	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.2 Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 中寺	2011年12月	Cs137	1.0 Bq/Kg生	± 0.2	Bq/Kg生	1.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 下永山	2011年12月	Cs137	22.2 Bq/Kg生	± 0.3	Bq/Kg生	49.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	27.2 Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 下永井	2011年12月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.5	Bq/Kg生	2.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 下永井	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.4	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 下永井	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
井戸水 (生活水)	いわき市三和町 合戸	2011年12月	Cs137	14.7 Bq/Kg生	± 0.3	Bq/Kg生	33.9	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.2 Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町	2011年12月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 1.5	Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 下永井	2011年12月	Cs137	12.0 Bq/Kg生	± 0.3	Bq/Kg生	28.2	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	16.2 Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 下市萱	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生
井戸水 (生活水)	いわき市三和町	2011年12月	Cs137	16.3 Bq/Kg生	± 0.3	Bq/Kg生	35.5	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.2 Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市内郷 高野町	2011年12月	Cs137	10.4 Bq/Kg生	± 0.2	Bq/Kg生	21.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.8 Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市四倉町 細谷	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水(上)	いわき市小川町 柴原	2011年12月	Cs137	9.1 Bq/Kg生	± 0.2	Bq/Kg生	16.4	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.3 Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
井戸水(下)	いわき市小川町 柴原	2011年12月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 0.2	Bq/Kg生	13.3	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.2 Bq/Kg生	± 0.3	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市遠野町 入遠野	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市遠野町 大平	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市四倉町 細谷	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市四倉町 玉山	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市小川町 柴原	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市平 中平窪	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
井戸水 (生活水)	いわき市久之浜	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
井戸水 (生活水)	いわき市久之浜 田之網	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
井戸水 (わき水)	いわき市田人町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市内郷 高野町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
地下水 (生活水)	いわき市三和町 合戸	2011年12月	Cs137	35.2 Bq/Kg生	±	0.4 Bq/Kg生	87.7	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	52.5 Bq/Kg生	±	0.5 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
山水(飲み水)	いわき市三和町 上永井	2011年12月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	±	6.3 Bq/Kg生	4.7	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	±	22.2 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
山水(飲み水)	いわき市三和町 差塩	2011年12月	Cs137	0.9 Bq/Kg生	±	0.2 Bq/Kg生	0.9	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
沢水	いわき市田人町 南大平	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
沢水	いわき市三和町 下三坂	2011年12月	Cs137	1.3 Bq/Kg生	±	0.2 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.1 Bq/Kg生	±	0.5 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生
沢水	いわき市三和町 合戸	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生