



2012年1月の放射能測定結果 328件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	青森県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	山形県	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	山形県	不明	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	新潟県	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	新潟県新潟市	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	茨城県	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	熊本県	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	茨城県磯原市	2011年10月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	茨城県北茨城市 華川町	2011年10月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡	2011年9月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡楢葉町	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡浪江町	2010年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	会津	2011年11月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	東白河郡棚倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	西白川郡矢吹町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	石川郡石川町	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	喜多方市高郷町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市三和町	2011年11月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市四倉町 細谷	2011年11月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 北神谷	2011年10月	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	10.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下神谷	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平神谷	2011年11月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	9.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	6.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	13.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 上高久	2011年10月	Cs137	7.4 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	10.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 赤井	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 赤井	2011年10月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 赤井	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	8.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 中平窪	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 平窪	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 平窪	2011年11月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	8.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町	2011年11月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町 桑原	2011年10月	Cs137	8.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	15.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町 上小川	2011年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町 下小川	2011年10月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	9.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町 下小川	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町 下小川	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	6.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市好間町	2011年9月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市好間町 榊小屋	2011年11月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	8.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 下湯長谷	2011年9月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市常磐三沢町	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町入遠野	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐西郷町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町入遠野	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町根岸	2011年10月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町根岸	2011年10月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町滝	2011年11月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	10.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町滝	2011年11月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	7.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市添野町	2011年11月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	8.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2011年9月	Cs137	7.5 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	14.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.3 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市田人町	不明	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市三沢町	2011年10月	Cs137	7.2 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	17.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.0 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	8.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市中岡町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	青森県	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	青森県	2011年11月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	不明	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県尾花沢市	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県遠田郡美里町	2011年10月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	福井県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県	2011年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	茨城県 北茨城市河尻町	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	6.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	双葉郡楢葉町	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	田村郡小野町	2011年10月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	伊達市	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	二本松市	不明	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	4.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	会津	2011年11月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	大沼郡 会津美里町	不明	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町	不明	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町 差塩	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町 差塩	2011年10月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	不明	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年11月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 下柳生	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 下柳生	2011年5月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 長友	2011年11月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市川前町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平原高 野	2011年9月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 大室	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 下神谷	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 赤井	2011年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 赤井	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 豊間	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.3	Cs137	Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	Bq/Kg生	
白米	いわき市平 豊間	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.3	Cs137	Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市平藤間	2011年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 下山口	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 北神谷	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 神谷	2011年11月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平菅波	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平菅波	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平中塩	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 片寄	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年11月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町 上小川	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町 高崎	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町 高崎	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町 上好間	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市内郷 高野町	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 西郷町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 5.4 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 下湯長谷	2012年1月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 上矢田町	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市鹿島町 蔵持	不明	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年11月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市渡辺町	2011年11月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町 田部	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町 釜戸	不明	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町	2011年9月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町 黒田	2011年10月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町 黒田	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三沢町	2011年10月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	9.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市川部町 川原	2011年9月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	8.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 入遠野	2011年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 滝	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 入上	2011年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 入遠野	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 入遠野	2011年12月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2011年11月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市泉町 滝尻	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市川部町	2011年9月	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 下神白	2011年11月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 金成	2011年9月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	11.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 岡小名	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	10.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市 小名浜大原	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市佐糠町	2011年12月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	12.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.3 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市中岡町	2011年9月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	6.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米(もち米)	いわき市添野町	2011年11月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米(もち米)	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	郡山市中田町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	郡山市片平	2011年11月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市四倉町	2011年11月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市四倉町 北向	2011年11月	Cs137	11.2 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	20.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.2 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市平豊間	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市平 幕ノ内	2011年10月	Cs137	10.2 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	17.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市鹿島町	2011年10月	Cs137	7.0 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	13.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小麦	いわき市永崎	2011年6月	Cs137	50.7 Bq/Kg生	± 11.6 Bq/Kg生	98.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	48.0 Bq/Kg生	± 10.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
米ぬか	会津	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	石川郡平田村	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市常磐 上矢田町	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市常磐 藤原町	2011年7月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	10.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市 小名浜大原	2011年7月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 岡小名	2011年7月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 大原	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市鹿島町	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市鹿島町 走熊	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	いわき市下小川	2011年7月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小川町 塩田	2011年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市遠野町 入遠野	2011年7月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市泉 もえぎ台	2011年7月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市泉町 滝尻	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市 山田町	2011年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市川部町	2011年6月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市四倉町 駒込	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町 上好間	2011年11月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市中央台 高久	2012年1月	Cs137	7.6 Bq/Kg生	± 7.6 Bq/Kg生	7.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市内郷 宮町	2012年1月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 赤井	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	20.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	20.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 沼の内	2011年7月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 中平窪	2011年6月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生	5.9	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 北白土	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下山口	2011年6月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市平 平窪	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市小名浜 大原	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市泉 もえぎ台	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市常磐 下湯長谷町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市内郷 高坂町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市好間町 上好間	2011年10月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
長芋	いわき市平 上高久	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
長芋	いわき市泉町 下川	2012年1月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
長芋	いわき市小名浜 金成	2011年12月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いもがら	いわき市泉 もえぎ台	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 上大越	不明	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市常磐 下湯長谷町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	北茨城市関本町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市泉町 下川	2012年1月	Cs137	8.5 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市田人町 黒田	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市 山田町	2012年1月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生	15.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 上高久	2012年1月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	10.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.2 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平菅波	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平高久	2012年1月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	10.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市泉町 下川	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市泉町 下川	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市泉町 滝尻	2012年1月	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市 泉玉露	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市泉町 もえぎ台	2012年1月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市鹿島町 走熊	2012年1月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市遠野町 深山田	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市遠野町 入遠野	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平高久	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市四倉町 細谷	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市川部町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市内郷 宮町	2012年1月	Cs137	6.9 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	10.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市錦町 御宝町	2011年1月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
大根	いわき市豊間合磯	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜・大根ミックス	いわき市小名浜下神白	2012年1月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
切干大根	いわき市泉もえぎ台	2011年12月	Cs137	122 Bq/Kg生	± 35.0 Bq/Kg生	250	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	128 Bq/Kg生	± 35.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市平中山	2012年1月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生	4.8	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市平下神谷	2012年1月	Cs137	7.7 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市平下平窪	2012年1月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	9.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.6 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たまねぎ	いわき市平中塩	2011年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たまねぎ	いわき市小川町塩田	2011年6月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生	9.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たまねぎ	いわき市小名浜玉川町	2012年1月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たまねぎ	いわき市泉もえぎ台	2011年6月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たまねぎ	いわき市錦町御宝殿	2011年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市勿来町関田	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市平下神谷	2012年1月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	11.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市平上高久	2012年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市常磐藤原町	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.3 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市小名浜岡小名	2012年1月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	11.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.3 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市小名浜大原	2012年1月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ごぼう	いわき市泉もえぎ台	2012年1月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	10.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ヤーコン	いわき市平下大越	2011年12月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市常磐西郷町	2011年12月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 5.4 Bq/Kg生	11.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市平菅波	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市田人町黒田	2012年1月	Cs137	8.3 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生	13.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.6 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市豊間合磯	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市泉町下川	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.8 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
苣つみ菜	いわき市平 中山	2011年1月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	4.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市平 赤井	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	20.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	20.0 Bq/Kg生	
青菜	いわき市小川町 前原	2012年1月	Cs137	7.8 Bq/Kg生	± 10.4 Bq/Kg生	9.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 11.4 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
チンゲンサイ	いわき市小名浜 玉川町	2012年1月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市平 赤井	2012年1月	Cs137	10.1 Bq/Kg生	± 8.1 Bq/Kg生	17.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.6 Bq/Kg生	± 7.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
長ネギ	いわき市小名浜 大原	2012年1月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あぶら菜	いわき市中央台 高久	2012年1月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	11.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.7 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
菜の花	いわき市永崎	2012年1月	Cs137	10.3 Bq/Kg生	± 8.3 Bq/Kg生	23.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.9 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
コウサイタイ	いわき市平 下大越	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市四倉町 太夫坂	2012年1月	Cs137	77.9 Bq/Kg生	± 16.7 Bq/Kg生	142	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	64.3 Bq/Kg生	± 13.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市泉ヶ丘	2012年1月	Cs137	24.3 Bq/Kg生	± 8.1 Bq/Kg生	37.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.7 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市佐糠町	2011年12月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	12.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.3 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市小名浜	2012年1月	Cs137	10.9 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生	20.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.2 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市小名浜 下神白	2011年1月	Cs137	24.3 Bq/Kg生	± 6.1 Bq/Kg生	38.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	14.3 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市小浜町 北ノ作	2011年12月	Cs137	7.5 Bq/Kg生	± 6.3 Bq/Kg生	20.9	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	13.4 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市内郷 高坂町	2011年11月	Cs137	19.3 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	32.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	13.2 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市小川町 西小川	2012年1月	Cs137	11.7 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生	14.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
りんご	福島市瀬上町	2011年12月	Cs137	12.7 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生	24.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.4 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市四倉町 太夫坂	2012年1月	Cs137	206 Bq/Kg生	± 41.0 Bq/Kg生	382	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	176 Bq/Kg生	± 35.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市四倉町	2012年1月	Cs137	139 Bq/Kg生	± 28.0 Bq/Kg生	245	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	106 Bq/Kg生	± 21.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市小浜町 北ノ作	2012年1月	Cs137	30.4 Bq/Kg生	± 8.9 Bq/Kg生	49.2	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	18.8 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市内郷 宮町	2012年1月	Cs137	91.2 Bq/Kg生	± 17.2 Bq/Kg生	133	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	41.5 Bq/Kg生	± 9.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市泉ヶ丘	2012年1月	Cs137	59.7 Bq/Kg生	± 12.4 Bq/Kg生	86.8	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	27.1 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市渡辺町 薄作	2012年1月	Cs137	54.2 Bq/Kg生	± 12.0 Bq/Kg生	105	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	50.5 Bq/Kg生	± 10.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
かぼす	いわき市内郷 綴町	2012年1月	Cs137	191	Bq/Kg生	± 38.0	347	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	156	Bq/Kg生	± 31.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市好間町 上好間	2011年10月	Cs137	28.6	Bq/Kg生	± 6.9	58.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	29.6	Bq/Kg生	± 6.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市常磐 藤原町	2011年8月	Cs137	49.4	Bq/Kg生	± 11.1	97.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	47.6	Bq/Kg生	± 9.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キウイ	いわき市下小川	2011年12月	Cs137	14.3	Bq/Kg生	± 4.1	20.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.6	Bq/Kg生	± 2.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キウイ	いわき市 小川町	2012年1月	Cs137	20.8	Bq/Kg生	± 5.3	34.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	13.9	Bq/Kg生	± 3.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キウイ	いわき市小川町 西小川	2011年11月	Cs137	6.6	Bq/Kg生	± 5.9	13.1	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.5	Bq/Kg生	± 4.7		Cs134	8.0	Bq/Kg生
キウイ	いわき市平 下荒川	2011年11月	Cs137	11.3	Bq/Kg生	± 4.0	23.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.6	Bq/Kg生	± 3.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キウイ	いわき市内郷 宮町	2012年1月	Cs137	16.7	Bq/Kg生	± 7.9	29.7	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	13.0	Bq/Kg生	± 5.7		Cs134	8.0	Bq/Kg生
夏みかん	いわき市川部町 根古屋	2012年1月	Cs137	52.0	Bq/Kg生	± 11.9	96.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	44.3	Bq/Kg生	± 9.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
はやとろり	いわき市好間町 上好間	2011年11月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.4	4.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
マツタケ	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	128	Bq/Kg生	± 26.0	231	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	103	Bq/Kg生	± 21.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
まいたけ	いわき市勿来町 関田	2011年12月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.9	6.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市田人町	2011年10月	Cs137	198	Bq/Kg生	± 40.0	374	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	176	Bq/Kg生	± 35.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市泉町 下川	2011年11月	Cs137	116	Bq/Kg生	± 24.0	217	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	101	Bq/Kg生	± 20.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
干しいたけ	いわき市泉町 横山	2011年10月	Cs137	1844	Bq/Kg生	± 211.8	3,116	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1272	Bq/Kg生	± 137.8		Cs134	8.0	Bq/Kg生
干しいたけ	いわき市永崎	2011年12月	Cs137	2850	Bq/Kg生	± 570	5,190	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2340	Bq/Kg生	± 470		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふきのとう	いわき市平 北白土	2012年1月	Cs137	18.0	Bq/Kg生	± 9.7	46.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	28.2	Bq/Kg生	± 9.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市田人町	2011年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市小川町	不明	Cs137	12.4	Bq/Kg生	± 5.5	17.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 4.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
うど	いわき市田人町	2011年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 2.2		Cs134	6.0	Bq/Kg生
あずき	いわき市田人町	2011年11月	Cs137	5.6	Bq/Kg生	± 5.2	5.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
乾燥パング豆	いわき市泉町 横山	2011年10月	Cs137	7.2	Bq/Kg生	± 7.9	13.4	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	± 6.4		Cs134	8.0	Bq/Kg生
イノシシの肉	茨城県	2011年11月	Cs137	79.5	Bq/Kg生	± 12.0	193	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	113	Bq/Kg生	± 19.0		Cs134	8.0	Bq/Kg生
イノシシ(♀)	いわき市	2011年11月	Cs137	226	Bq/Kg生	± 45.0	410	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	184	Bq/Kg生	± 37.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
イノシシ(♂)	いわき市	2011年11月	Cs137	171 Bq/Kg生	± 34.0 Bq/Kg生	299	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	128 Bq/Kg生	± 26.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
イノシシの肉	いわき市平上荒川	2011年11月	Cs137	110 Bq/Kg生	± 22.0 Bq/Kg生	207	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	96.7 Bq/Kg生	± 19.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
イノシシの肉	いわき市	2011年11月	Cs137	190 Bq/Kg生	± 38.0 Bq/Kg生	366	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	176 Bq/Kg生	± 35.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
鶏卵	いわき市常磐松久須根町	2012年1月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	7.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
乾麺	外国産粉	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
青梅苔乾麺	外国産粉 青海苔相馬産	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄そば	会津若松市 神指町	2011年11月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
はちみつ	いわき市泉町 滝尻	2011年9月	Cs137	23.2 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生	42.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	19.1 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
はちみつ	いわき市 平神谷	2011年10月	Cs137	32.1 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生	62.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	30.4 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
コンニャク	いわき市田人町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅干し	いわき市川部町	2011年6月	Cs137	122 Bq/Kg生	± 16.4 Bq/Kg生	200	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	78.4 Bq/Kg生	± 10.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ふき塩漬け	北茨城市関本町	2011年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しょうゆ	不明	不明	Cs137	9.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	15.1	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
塩	いわき市 三崎公園沖	2011年7月	Cs137	12.4 Bq/Kg生	± 8.8 Bq/Kg生	30.9	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	18.5 Bq/Kg生	± 8.5 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市常磐	不明	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生	4.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	不明	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	不明	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ヨーグルト	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
牛乳	郡山市大槻町	2012年1月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	1.7	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
牛乳	不明	不明	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
母乳	いわき市小名浜	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.5	Cs137	20.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.5 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	20.0 Bq/Kg生	
柚ジュース	いわき市小名浜 下神白	2012年1月	Cs137	18.2 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	33.9	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	15.7 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
梅酒	いわき市平 下荒川	2011年7月	Cs137	22.9 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	41.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	18.6 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市平 下荒川	2012年1月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	3.8	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
水道水	いわき市平 南白土	2011年12月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市四倉町	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市錦町 江栗	2012年1月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	3.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市泉ヶ丘	2012年1月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	4.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市好間町 下好間	2012年1月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	1.9	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市小名浜	2012年1月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
水	いわき市三和町	2011年12月	Cs137	13.7 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	25.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.0 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
井戸水	二本松市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市三和町 上永井	2012年1月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	2.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市四倉町	2011年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市遠野町	2012年1月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	4.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市平 上大越	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
山水	いわき市遠野町 入遠野	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
沢水	いわき市三和町 合戸	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
沢水	いわき市小川町 柴原	2011年12月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	3.9	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
地下水	いわき市三和町	2012年1月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	1.8	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
地下水	いわき市三和 遅川	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
湧き水	いわき市鹿島町	2011年12月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
イナワラ	いわき市 泉玉露	2011年10月	Cs137	838 Bq/Kg生	± 186.0 Bq/Kg生	1,585	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	747 Bq/Kg生	± 157.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
竹	いわき市常磐	2011年12月	Cs137	346 Bq/Kg生	± 71.0 Bq/Kg生	643	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	297 Bq/Kg生	± 59.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
松の葉	いわき市中央台	2011年11月	Cs137	81.6 Bq/Kg生	± 22.4 Bq/Kg生	144	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	62.4 Bq/Kg生	± 17.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
松の葉	いわき市中央台	2011年11月	Cs137	59.3 Bq/Kg生	± 18.9 Bq/Kg生	121	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	62.0 Bq/Kg生	± 17.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	