



2012年2月の放射能測定結果 401件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	宮城県角田市	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	6.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	新潟県南魚沼市	不明	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	長野県佐久市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	千葉県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	茨城県	2011年10月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	10.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	二本松市上川崎	2011年11月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	伊達郡国見町	2011年10月	Cs137	69.8 Bq/Kg生	± 14.2 Bq/Kg生	123	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	53.9 Bq/Kg生	± 10.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	郡山市田村町	2011年11月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	福島県	2011年10月	Cs137	10.3 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	16.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	会津	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	白河市	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡楢葉町井出	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡楢葉町	2010年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡富岡町	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	石川郡	2011年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川前町	不明	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川前町下桶売	2011年9月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	6.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市三沢町田島	2011年9月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	15.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.3 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 大野	2011年11月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 大浦	2011年10月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	7.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 玉山	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.2 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 玉山	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	8.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 狐塚	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 狐塚	2011年11月	Cs137	9.9 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	18.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.6 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町 駒込	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	8.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下高久	不明	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下高久	不明	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.5 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下高久	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平平窪	2011年10月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	7.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平平窪	2011年11月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 中平窪	2011年10月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 藤間	2011年10月	Cs137	5.9 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	10.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 藤間	2011年11月	Cs137	9.7 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	14.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 山口	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 上片寄	2011年10月	Cs137	6.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 北神谷	2011年10月	Cs137	7.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下大越	2011年10月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下大越	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市高野町 白狐	2011年10月	Cs137	15.5 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	26.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.5 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市好間町 小谷作	2011年11月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市泉町	2011年10月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市泉町	2012年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市泉町 堀の内	2011年10月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市田人町	2011年10月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	9.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市田人町	2011年11月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市田人町 荷路夫	2011年11月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2011年9月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市沼部町	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市沼部町	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	不明	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	10.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 上矢田	2011年11月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 上矢田	2011年11月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 長孫町	2011年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 長孫町	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 岩ヶ岡	2011年10月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市植田町	2010年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市錦町	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜	不明	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	不明	不明	Cs137	5.9 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	不明	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	6.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	不明	不明	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	北海道	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	秋田県	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	2.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	秋田県	2011年9月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県南陽市	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県	2011年11月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県古川市	不明	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県角田市	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県巨理郡 巨理町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	岩手県奥州市 小山区	2011年9月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県北茨城市 関本町	2011年11月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	北茨城市	2011年12月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県北茨城市 関本町	2011年11月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県つくば市	2011年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県	2011年3月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	栃木県	不明	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	栃木県	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	福島県	不明	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	福島県	不明	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	福島市飯野町	不明	Cs137	16.1 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	25.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	福島市山田	2011年11月	Cs137	27.1 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生	50.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	23.3 Bq/Kg生	± 5.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市田村町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	二本松市小浜町	2011年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	9.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	二本松市渋川	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	耶麻郡西会津町奥川	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	耶麻郡猪苗代町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	喜多方市豊川町	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津若松市	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津坂下町	2011年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	須賀川市下山田	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	双葉郡楢葉町	2010年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	双葉郡富岡町	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	双葉郡富岡町	2010年10月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	4.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	田村郡小野町	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	田村郡小野町	2011年11月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	安達郡大玉村玉井	2011年11月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	岩瀬郡	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市	不明	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市	2011年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市川前高部	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	5.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町	2011年11月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町 差塩	2011年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町 上永井	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	6.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	7.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	不明	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 玉山	2011年11月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	6.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 玉山	2011年11月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	6.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 八茎	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 大森	2011年10月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 長友	2011年10月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町 西小川	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町 塩田	不明	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年11月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平	2011年11月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平	2011年	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平神谷	2011年	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市平夏井	2011年9月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	6.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平草野	2011年9月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平北神谷	2011年10月	Cs137	5.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	10.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平上神谷	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平下神谷	2011//11	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平中神谷	2010年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	4.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平中神谷	2011年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平赤井	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平赤井	2011年11月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平赤井	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平赤井	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平赤井	2011年12月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平上荒川	2011年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平上荒川	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平高久山口	2011年11月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	7.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平下高久	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平下高久	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平下高久	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平下高久	2011年11月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平下高久	2011年10月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	8.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平下高久	2011年10月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平藤間	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平藤間	2011年10月	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市平山口	2011年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平山口	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	4.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平山口	2011年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平馬目	2011年10月	Cs137	5.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	7.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平沼の内	2012年11月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平豊間	2011年10月	Cs137	8.8 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	12.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平豊間	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平豊間	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平原高野	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町上好間	2011年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町久保	2011年10月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町今新田	2011年10月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市高倉町	2011年10月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	12.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市沼部町	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	3.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市沼部町	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	3.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市川部町	2011年10月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市川部町大久保	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	7.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市高野町白狐	2011年10月	Cs137	12.2 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	12.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町	2011年9月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町黒田	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町	2011年11月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市鹿島町	2011年11月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市鹿島町 米田	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市鹿島町 船戸	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 西郷町	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 西郷町	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 竜ヶ沢	2011年10月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 上矢田	2011年11月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐 岩ヶ岡	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	6.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市泉町	2011年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市泉町	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市泉 玉露	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市泉町 本谷	2011年11月	Cs137	9.6 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	19.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市泉町 本谷	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	不明	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2011年9月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 入遠野	2011年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 入遠野	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町 入遠野町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	4.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	9.6 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	14.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町 上釜戸	2011年9月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市錦町	2011年11月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市錦町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市富津町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	不明	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	不明	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	不明	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	4.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米とぎ汁	宮城県	不明	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち玄米	富山県	不明	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち玄米	いわき市常磐 西郷町	2011年10月	Cs137	7.7 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	11.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち玄米	伊達郡 国見町	2011年10月	Cs137	143.0 Bq/Kg生	± 29.0 Bq/Kg生	254	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	111.0 Bq/Kg生	± 22.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
もち玄米	いわき市四倉町 八茎	2011年10月	Cs137	9.9 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	12.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	長野県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	岩瀬郡	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市四倉町 大森	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市平 下大越	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	6.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
もち米	いわき市 田人町	2011年9月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市渡辺町 中釜戸	2011年9月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市錦町	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市平赤井	2011年10月	Cs137	7.7 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	15.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市常磐 西郷町	2011年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	9.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
米ぬか	いわき市小名浜	2012年2月	Cs137	7.4 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生	15.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.7 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
米ぬか	いわき市小名浜 花畑	2012年2月	Cs137	10.4 Bq/Kg生	± 5.5 Bq/Kg生	10.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
米ぬか	いわき市小名浜	2011年9月	Cs137	56.0 Bq/Kg生	± 13.7 Bq/Kg生	97.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	41.8 Bq/Kg生	± 10.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
米ぬか	いわき市小名浜	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
胚芽米	いわき市平 下高久	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	安達郡大玉村 玉井	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	二本松市 上川崎	2011年6月	Cs137	7.7 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	西白河郡 矢吹町	2011年8月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下高久	2011年7月	Cs137	15.3 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	21.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下高久	2011年6月	Cs137	7.8 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	11.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小川町 上小川	2011年6月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市三和町 上永井	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市四倉町 細谷	2011年6月	Cs137	8.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	15.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.1 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平神谷	2011年8月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	9.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 上神谷	2011年7月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下神谷	2011年10月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下神谷	2011年8月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下山口	2011年6月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	いわき市平藤間	2011年7月	Cs137	28.8 Bq/Kg生	± 7.2 Bq/Kg生	47.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	18.5 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平藤間	2011年7月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	10.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平馬目	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町	2011年6月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町下好間	2011年7月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町下好間	2011年7月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町下好間	2011年7月	Cs137	9.5 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	9.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市田人町荷路夫	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜定西	2011年7月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜下神白	2011年6月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市泉町滝尻	2011年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市勿来町窪田	2011年9月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市四倉町細谷	2011年7月	Cs137	12.0 Bq/Kg生	± 5.7 Bq/Kg生	18.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.3 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市添野町	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小川町	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
山芋	いわき市豊間町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
山芋	いわき市湯本高倉	2011年12月	Cs137	16.0 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生	22.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.1 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
山芋	いわき市平南白土	2011年11月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 6.3 Bq/Kg生	10.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市四倉町狐塚	2011年11月	Cs137	8.0 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	12.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市小川町上小川	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市好間町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋(皮付)	いわき市平藤間	2011年11月	Cs137	7.3 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	11.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小川町塩田	不明	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平下神谷	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
大根	いわき市平下高久	2012年2月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平馬目	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平赤井	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小名浜定西	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小名浜玉川町	2012年2月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小名浜大原	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市高倉町鶴巻	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
切干大根	いわき市小川町	2012年1月	Cs137	83.1 Bq/Kg生	± 27.9 Bq/Kg生	175	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	92.0 Bq/Kg生	± 21.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
切干大根	いわき市もえぎ台	2012年2月	Cs137	226.0 Bq/Kg生	± 55.0 Bq/Kg生	400	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	174.0 Bq/Kg生	± 42.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
凍み大根	いわき市四倉町細谷	2012年1月	Cs137	26.4 Bq/Kg生	± 8.9 Bq/Kg生	41.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	15.4 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
凍み大根戻し汁	いわき市四倉町細谷	2012年1月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市渡辺町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平赤井	2011年10月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	11.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市四倉町	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平藤間	2011年6月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	8.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平上神谷	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平豊間	2011年6月	Cs137	5.4 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	9.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平赤井	2011年7月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市勿来町窪田	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市好間町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市四倉町狐塚	2012年2月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市洋向台	2011年1月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	8.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市常磐上矢田町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	石川郡石川町	2011年12月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白菜	いわき市小川町 上小川	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	9.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.3 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 赤井	2012年2月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 南白土	2012年2月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平神谷	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 下神谷	2012年1月	Cs137	8.6 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生	8.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 下神谷	2012年2月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	6.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 下神谷	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 下高久	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 藤間	2012年2月	Cs137	7.5 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	15.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市高倉町 鶴巻	2012年2月	Cs137	10.7 Bq/Kg生	± 5.9 Bq/Kg生	18.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.8 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市 玉川町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市渡辺町	2012年2月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市田人町	2012年2月	Cs137	6.3 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市常磐 上矢田町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.5 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市小名浜 君ヶ塚	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市鹿島町 米田	2011年12月	Cs137	9.0 Bq/Kg生	± 6.1 Bq/Kg生	9.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市小名浜 大原	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市渡辺町 上釜戸	2012年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.2 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
チンゲンサイ	いわき市平 平窪	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.0 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あぶり菜	いわき市小名浜 南富岡	2012年2月	Cs137	10.3 Bq/Kg生	± 6.2 Bq/Kg生	18.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.1 Bq/Kg生	± 5.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市平 中塩	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
らっきょう	いわき市四倉町 狐塚	2012年2月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	9.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市小名浜 上神白	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ピーマン	いわき市四倉町 細谷	2011年12月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生	4.7	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
しいたけ	いわき市平 下山口	2011年10月	Cs137	2030 Bq/Kg生	± 410 Bq/Kg生	3,650	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1620 Bq/Kg生	± 320 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しいたけ	いわき市三沢町 中畑	2011年3月	Cs137	2280 Bq/Kg生	± 460 Bq/Kg生	4,240	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1960 Bq/Kg生	± 390 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	宮城県角田市	2011年12月	Cs137	39.3 Bq/Kg生	± 9.0 Bq/Kg生	73.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	34.4 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市湯本町 八仙	2011年10月	Cs137	55.5 Bq/Kg生	± 12.5 Bq/Kg生	101	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	45.5 Bq/Kg生	± 9.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市平豊間	2011年12月	Cs137	57.1 Bq/Kg生	± 12.4 Bq/Kg生	98.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	41.7 Bq/Kg生	± 8.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
デコポン	いわき市好間町 下好間	2012年2月	Cs137	32.1 Bq/Kg生	± 7.7 Bq/Kg生	65.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	32.9 Bq/Kg生	± 7.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
デコポン	いわき市勿来町	2012年2月	Cs137	90.4 Bq/Kg生	± 18.5 Bq/Kg生	158	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	67.8 Bq/Kg生	± 12.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市勿来町	2012年2月	Cs137	49.9 Bq/Kg生	± 12.4 Bq/Kg生	87.7	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	37.8 Bq/Kg生	± 8.4 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市 郷ヶ丘	2011年12月	Cs137	58.9 Bq/Kg生	± 12.6 Bq/Kg生	97.9	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	39.0 Bq/Kg生	± 8.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ネーブル (皮付)	いわき市勿来町	2012年2月	Cs137	78.3 Bq/Kg生	± 16.0 Bq/Kg生	127	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	48.5 Bq/Kg生	± 9.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
キウイ	福島市上野寺	2011年12月	Cs137	45.9 Bq/Kg生	± 10.4 Bq/Kg生	82.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	36.3 Bq/Kg生	± 8.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キウイ	いわき市内郷 高野	2011年10月	Cs137	31.8 Bq/Kg生	± 9.2 Bq/Kg生	54.7	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	22.9 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
キウイ	いわき市平 上山口	2011年11月	Cs137	30.3 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生	58.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	28.6 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市小名浜 下神白	2011年10月	Cs137	7.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	20.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.4 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かりん	いわき市四倉町 塩木	2011年11月	Cs137	85.4 Bq/Kg生	± 18.5 Bq/Kg生	153	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	67.6 Bq/Kg生	± 14.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかさぎ	東白川郡棚倉町	2012年2月	Cs137	8.1 Bq/Kg生	± 7.9 Bq/Kg生	19.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.3 Bq/Kg生	± 6.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
目光	愛媛県	不明	Cs137	7.2 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小エビ	愛媛県	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 8.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
生わかめ	いわき市平 豊間	2012年2月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市小名浜	2012年2月	Cs137	8.9 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生	11.6	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
鶏卵(鳥骨鶏)	いわき市平 下平窪	2012年1月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
鶏卵	千葉県いすみ市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
黒毛和牛もも	福島県産	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
豚口ース	日本	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
乾燥ぜんまい	いわき市遠野町	2011年6月	Cs137	1122	Bq/Kg生	± 138	1,808	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	686	Bq/Kg生	± 81.5		Cs134	8.0	Bq/Kg生
銀杏	白河市和尚壇	2011年10月	Cs137	44.6	Bq/Kg生	± 10.5	61.8	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	17.2	Bq/Kg生	± 5.5		Cs134	8.0	Bq/Kg生
小豆	いわき市平上片寄	2011年11月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 3.2	4.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
小豆	いわき市平上山口	2011年11月	Cs137	3.6	Bq/Kg生	± 3.4	3.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
黒豆	いわき市遠野町入遠野	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
あおばた豆	いわき市葉山	2011年11月	Cs137	10.1	Bq/Kg生	± 4.5	10.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大豆	いわき市平下高久	2011年12月	Cs137	12.6	Bq/Kg生	± 5.1	20.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.6	Bq/Kg生	± 3.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
梅干し	双葉郡富岡町	2011年6月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.6	3.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
梅干し	いわき市江名	2011年6月	Cs137	82.5	Bq/Kg生	± 17.4	150	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	67.2	Bq/Kg生	± 13.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
梅干し(種入り)	いわき市田人町	2011年5月	Cs137	59.0	Bq/Kg生	± 13.0	111	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	52.1	Bq/Kg生	± 10.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
こんにゃく	いわき市金山町南台	2011年11月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 3.8	4.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき(塩漬け)	いわき市田人町	2011年5月	Cs137	7.9	Bq/Kg生	± 3.9	15.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.1	Bq/Kg生	± 3.3		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たくあん	いわき市洋向台	2012年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
マッシュポテト	いわき市平藤間	2011年7月	Cs137	3.6	Bq/Kg生	± 2.5	6.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 2.2		Cs134	6.0	Bq/Kg生
給食	不明	2012年2月	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 2.0	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
給食	不明	2012年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
牛乳	北海道	2012年2月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 1.4	1.7	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
牛乳	本宮市	2012年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
母乳	いわき市佐糠町	2012年2月	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 1.4	2.4	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
井戸水	北茨城市関本町	2012年2月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 1.3	1.7	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
井戸水	いわき市四倉町細谷	2012年2月	Cs137	1.4	Bq/Kg生	± 1.3	1.4	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
井戸水	いわき市泉玉露	2012年2月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 1.4	2.2	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町上永井	2012年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
井戸水	いわき市三和町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市三和町	2012年2月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生	1.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市平藤間	2012年2月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	2.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市渡辺町 上釜戸	2012年2月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市 田人町	2012年2月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市錦町	不明	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	2.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市四倉町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市小名浜 大原	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市小名浜 岡小名	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市常磐 上湯長谷町	2012年2月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	1.8	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市植田町	2012年2月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生	1.7	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ミネラル ウォーター	不明	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ミネラル ウォーター	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
雪解け水	いわき市山田町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
簡易水道水	いわき市三和町 渡戸	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
沢水	いわき市小川町 柴原	2012年2月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
湧水	いわき市勿来町	2012年2月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
落ち葉②	いわき市鹿島町	2012年2月	Cs137	438 Bq/Kg生	± 96 Bq/Kg生	760	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	322 Bq/Kg生	± 68 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
落ち葉①	いわき市鹿島町	2012年2月	Cs137	392 Bq/Kg生	± 86 Bq/Kg生	637	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	245 Bq/Kg生	± 54 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
竹炭	いわき市常磐	2012年2月	Cs137	673 Bq/Kg生	± 135 Bq/Kg生	1,225	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	552 Bq/Kg生	± 110 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
竹酢液	いわき市常磐	2012年2月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	4.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
畑土	いわき市赤井 諸荷	2012年2月	Cs137	395.0 Bq/Kg生	± 79.0 Bq/Kg生	740	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	345.0 Bq/Kg生	± 69.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	