

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
畳土	いわき市中央台 飯野	2012年3月	Cs137	146	Bq/Kg乾	± 23.0	Bq/Kg乾	254	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	108	Bq/Kg乾	± 16.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市常磐 下湯長谷町	2012年3月	Cs137	247	Bq/Kg乾	± 33.0	Bq/Kg乾	419	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	172	Bq/Kg乾	± 21.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市常磐 上湯長谷町	2012年3月	Cs137	277	Bq/Kg乾	± 36.0	Bq/Kg乾	488	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	211	Bq/Kg乾	± 24.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜 上神白	2012年3月	Cs137	293	Bq/Kg乾	± 38.0	Bq/Kg乾	502	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	209	Bq/Kg乾	± 25.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜 下神白	2012年3月	Cs137	492	Bq/Kg乾	± 56.0	Bq/Kg乾	885	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	393	Bq/Kg乾	± 40.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜 下神白	2012年3月	Cs137	261	Bq/Kg乾	± 35.0	Bq/Kg乾	458	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	197	Bq/Kg乾	± 24.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市永崎	2012年3月	Cs137	114	Bq/Kg乾	± 18.0	Bq/Kg乾	191	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	77.0	Bq/Kg乾	± 12.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市錦町	2012年3月	Cs137	413	Bq/Kg乾	± 49.0	Bq/Kg乾	727	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	314	Bq/Kg乾	± 33.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
水田	いわき市山玉町 神申	2012年3月	Cs137	358	Bq/Kg乾	± 42.0	Bq/Kg乾	608	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	250	Bq/Kg乾	± 27.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
水田	いわき市山玉町 神申	2012年3月	Cs137	387	Bq/Kg乾	± 45.0	Bq/Kg乾	612	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	225	Bq/Kg乾	± 26.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
庭土	いわき市平 北白土	2012年3月	Cs137	1043	Bq/Kg乾	± 107	Bq/Kg乾	1,795	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	752	Bq/Kg乾	± 72.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
庭土	いわき市中央台 飯野	2012年3月	Cs137	290	Bq/Kg乾	± 36.0	Bq/Kg乾	500	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	210	Bq/Kg乾	± 24.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
庭土	いわき市小名浜 下神白	2012年3月	Cs137	237	Bq/Kg乾	± 31.0	Bq/Kg乾	408	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	171	Bq/Kg乾	± 21.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
芝草・土	いわき市内郷 高野町	2012年3月	Cs137	2400	Bq/Kg乾	± 240	Bq/Kg乾	4,100	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	1700	Bq/Kg乾	± 160	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
芝土	いわき市内郷 高野町	2012年3月	Cs137	620	Bq/Kg乾	± 70.0	Bq/Kg乾	1,060	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	440	Bq/Kg乾	± 45.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾

