



2012年4月の放射能測定結果 522件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にはばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガ"ンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
玄米	宮崎県	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	福島市	2010年	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	福島市前鳴沢	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	福島市松川町	2011年10月	Cs137	6.6	Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	15.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	9.0	Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	南会津郡	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	会津只見町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	東白川郡棚倉町	2011年10月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	伊達市伊達町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.8	Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	白河市滑津中島	2011年10月	Cs137	4.5	Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	安達郡大玉村	不明	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	二本松市	不明	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	8.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	郡山市三穂町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	須賀川市	2011年10月	Cs137	6.1	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	12.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.9	Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	石川郡古殿町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	石川郡古殿町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	双葉郡浪江町 楓渡	2010年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小川町 上小川	2011年10月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 赤井	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市平赤井	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市平上山口	2011年10月	Cs137	4.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	7.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 1.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市平神谷	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市夏井	2011年10月	Cs137	6.5	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	6.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市夏井	2011年10月	Cs137	5.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	7.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市沼の内	2011年10月	Cs137	4.1	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	8.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市四倉町長友	2011年10月	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	5.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市錦町	2011年10月	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	7.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市遠野町入遠野	2011年10月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	4.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	9.5	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	19.4	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.9	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
玄米	いわき市山田町	不明	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	4.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	秋田県	2011年10月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生	4.5	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
白米	秋田県大仙市	2011年10月	Cs137	2.6	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	秋田県大曲市	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	山形県	2001年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	山形県	2011年10月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	2.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	宮城県白石市	2011年10月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	4.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	宮城県黒川郡	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	宮城県栗原市高清町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	宮城県角田市高倉	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	千葉県香取市石納	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	千葉県香取市森戸	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	新潟県	不明	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	2.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	新潟県	2011年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県日立市 十王町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	大沼郡 会津三里町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津若松市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市田村町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市中田町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	安達郡大玉村	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	安達郡大玉村	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	田村市船引町	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	石川郡古殿町 田口	2011年10月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	石川郡石川町	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	石川郡石川町	2011年11月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	相馬市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町 差塩	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	8.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	7.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町 細谷	2011年10月	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	7.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町 戸田	2011年10月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生	5.6	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 1.5	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町 柳生	2011年10月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	7.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市草野町	2011年10月	Cs137	4.1	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	6.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	5.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 赤井	2011年11月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	6.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 赤井	2011年9月	Cs137	5.2	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	5.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平字 絹谷	2012年11月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	5.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 吉野谷	2011年10月	Cs137	2.3	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	4.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 北白土	2011年10月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生	5.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 高久	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下高久	2011年10月	Cs137	3.6	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下平窪	2011年10月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	5.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下平窪	2011年10月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	5.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平水品	2011年10月	Cs137	2.6	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平	2011年10月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	6.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下大越	2011年10月	Cs137	5.0	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	8.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平鯨岡	2011年10月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	5.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市内郷 高坂町	2011年10月	Cs137	2.6	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市鹿島町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市鹿島町	2011年10月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生	5.0	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 4.1	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 住吉	2011年11月	Cs137	3.9	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	7.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
白米	いわき市常磐 西郷町	2011年10月	Cs137	3.7	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	6.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 西郷町	2011年11月	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 藤原町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 白鳥町	2011年10月	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町 上遠野	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市三沢町	2011年10月	Cs137	3.9	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市植田町 江畑	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.5	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 1.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市勿来町 田町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市	不明	Cs137	2.6	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	不明	不明	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
もち米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
もち米	いわき市平	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
もち米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	3.9	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
もち米(玄米)	耶麻郡 猪苗代町	2011年10月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
米(五分づき)	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	6.7	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	10.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
炒飯米	宮城県角田市 豊宝	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
炒飯米	宮城県角田市 豊宝	2011年10月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
炒飯米	宮城県角田市 稻置	2011年10月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
炒飯米	いわき市四倉町 下柳生	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平白土	2011年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 北白土	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 下大越	2011年8月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 赤井	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 鎌田	2011年7月	Cs137	5.2	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平中塩	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平石森	2011年6月	Cs137	4.1	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	7.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 中神谷	2011年8月	Cs137	4.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市好間町 下好間	2011年7月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 1.4	Bq/Kg生	3.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.2	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市内郷 御厩町	2011年7月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	6.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市内郷 宮町	2011年8月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市常磐 三沢町	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜 島	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜 岡小名	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市泉町 下川	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市渡辺町 上釜戸	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市遠野町 深山田	2011年8月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.7	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市勿来町 酒井	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
さつまいも	茨城県	不明	Cs137	7.5	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	10.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市沼部町 鳴天	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
にんにく	いわき市小川町 柴原	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
にんにく	いわき市好間町 大利	2011年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	7.7	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.7	Bq/Kg生	± 5.4	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
長芋	いわき市鹿島町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
山芋	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
こんにゃく芋	いわき市田人町 黒田	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.3	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アピオス	いわき市上好間 大堰	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ヤーコン	いわき市平 豊間	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ごぼう	いわき市泉 玉露	2012年4月	Cs137	2.0	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	10.4	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.4	Bq/Kg生	± 6.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
大根	いわき市 もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市泉 もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市玉川町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市内郷 御厩町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平 赤井	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市中央台 飯野	2012年3月	Cs137	2.6	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市小名浜 玉川	2012年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ・大根 じゃがいもミックス	いわき市小名浜 住吉	不明	Cs137	7.1	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生	7.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
切干大根	いわき市勿来町 大高	2012年1月	Cs137	18.9	Bq/Kg生	± 9.8	Bq/Kg生	35.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	16.8	Bq/Kg生	± 8.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根葉	いわき市永崎	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
人参	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.4	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
人参	いわき市内郷 御厩町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
らっきょう	いわき市永崎 地切	2012年4月	Cs137	8.9	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生	15.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.9	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玉ねぎ	北海道	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 北白土	2011年7月	Cs137	5.6	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生	5.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市好間町 大利	2011年6月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生	7.0	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
葉たまねぎ	いわき市平 沼の内	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
葉たまねぎ	いわき市平 下大越	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
葉たまねぎ	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
葉たまねぎ	いわき市常磐 上湯長谷	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
葉たまねぎ	いわき市 泉玉露	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
葉たまねぎ	いわき市 泉玉露	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.6	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 4.8	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平 鎌田	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.4	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平 上山口	2012年4月	Cs137	5.5	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	5.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平 下大越	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.5	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平下 神谷	2012年4月	Cs137	6.4	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	12.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.4	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市小川町 高萩	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市小川町 柴原	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市内郷 高野町	2012年4月	Cs137	5.9	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生	5.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市内郷 宮町	2012年4月	Cs137	5.6	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	5.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市永崎	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市小名浜 島	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市常磐 上矢田	2012年4月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	3.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ネギ	いわき市泉 もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市遠野町 上遠野	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市渡辺町 田部	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市沼部町	2012年4月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	6.5	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	0.3	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.0	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.7	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市平藤間	2012年4月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生	8.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市平 下荒川	2012年4月	Cs137	4.9	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生	4.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市平 下大越	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.5	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ニラ	いわき市平 下山口	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市鹿島町 飯田	2012年4月	Cs137	25.8	Bq/Kg生	± 8.1	Bq/Kg生	41.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	15.5	Bq/Kg生	± 5.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市小名浜 住吉	2012年4月	Cs137	7.4	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生	18.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.2	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.8	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
わけぎ	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
葉ねぎ	いわき市平 下荒川	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
あさつき	いわき市 中央台鹿島	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	6.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.6	Bq/Kg生	± 6.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
エシャレット	いわき市鹿島町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.7	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
エシャレット	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小豆	北海道帯広市	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
黒豆	いわき市田人町 荷路夫	2011年12月	Cs137	4.4	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	4.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市内郷 御厩町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.1	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市洋向台	2012年4月	Cs137	5.7	Bq/Kg生	± 4.8	Bq/Kg生	10.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 3.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	5.5	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	5.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市平 上山口	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市泉 もえぎ台	2012年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市小名浜 住吉	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市三和町	2011年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	愛知県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市平中塩	2012年4月	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生	3.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市常磐 水ノ谷	2012年4月	Cs137	7.0	Bq/Kg生	± 6.5	Bq/Kg生	7.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	6.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.6	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	7.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.4	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市泉 もえぎ台	2012年4月	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	3.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
キャベツ	いわき市山田町 大谷	2012年4月	Cs137	3.6	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市渡辺町 塙	2012年4月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市平夏井	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.9	Bq/Kg生	± 3.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市 平下神谷	2012年4月	Cs137	4.9	Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生	8.1	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 8.2	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市平 絹谷	2012年4月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	8.7	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市小名浜 吹松	2012年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市泉 もえぎ台	2012年4月	Cs137	6.3	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市泉町 下川	2012年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市渡辺町 塙	2012年4月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市三沢町	2012年4月	Cs137	8.4	Bq/Kg生	± 7.5	Bq/Kg生	16.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	8.5	Bq/Kg生	± 6.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
グリーンアスパ ラ	いわき市川前町 下桶売	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
あぶら菜	いわき市桜ヶ丘	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
あぶら菜	いわき市桜ヶ丘	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
あぶら菜	いわき市上好間 大榎	2012年4月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
あぶら菜	いわき市 もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市平 上山口	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市平 沼の内	2012年4月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	8.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市自由 が丘	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.6	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市好間町 下好間	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.8	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市好間町 下好間	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市内郷 高野町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.7	Bq/Kg生	± 6.6	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市鹿島町 飯田	2012年4月	Cs137	7.2	Bq/Kg生	± 5.3	Bq/Kg生	13.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.7	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市小名浜 大原	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ほうれん草	いわき市小名浜 玉川町	2012年4月	Cs137	5.1	Bq/Kg生	± 5.1	Bq/Kg生	5.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	6.5	Bq/Kg生	± 7.4	Bq/Kg生	11.4	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 5.9	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	5.3	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生	5.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	5.8	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生	5.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市泉 もえぎ台	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
越中菜花	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.7	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
菜の花	いわき市平下 神谷	2012年4月	Cs137	13.9	Bq/Kg生	± 6.5	Bq/Kg生	24.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.7	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
菜の花	いわき市四倉町 塩木	2012年4月	Cs137	11.7	Bq/Kg生	± 4.9	Bq/Kg生	16.6	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
菜の花	いわき市常磐 上湯長谷	2012年4月	Cs137	7.2	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生	7.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
菜の花	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	6.6	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
菜の花	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	7.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.5	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
菜の花	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	12.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	12.2	Bq/Kg生	± 6.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
水菜	いわき市遠野町 深山田	2012年4月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
からし菜	いわき市 平下神谷	2012年4月	Cs137	5.7	Bq/Kg生	± 14.5	Bq/Kg生	9.3	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
からし菜	いわき市 自由が丘	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
からし菜	いわき市好間町 北好間	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	7.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.6	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
からし菜	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	2.4	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
からし菜	いわき市遠野町 滝	2012年4月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	9.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.3	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
からし菜	いわき市勿来町 窪田	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
春菊	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	6.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.7	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
春菊	いわき市平 上神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	7.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.4	Bq/Kg生	± 5.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かき菜	いわき市高倉町 礼場	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
おいしい菜	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かぶ	いわき市内郷 高野町	2012年4月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生	8.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かぶ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.1	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かぶ葉	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
わさび菜	いわき市四倉町 塩木	2012年4月	Cs137	17.6	Bq/Kg生	± 11.6	Bq/Kg生	29.7	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	12.1	Bq/Kg生	± 7.1	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
のらぼう菜	いわき市平 中塩	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市永崎 地切	2012年4月	Cs137	7.4	Bq/Kg生	± 6.8	Bq/Kg生	18.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.2	Bq/Kg生	± 5.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市遠野町 滝	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市常磐 上矢田	2012年4月	Cs137	7.4	Bq/Kg生	± 4.7	Bq/Kg生	7.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
クレソン	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	8.6	Bq/Kg生	± 4.8	Bq/Kg生	16.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.2	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
せり	いわき市常磐 下船尾	2012年4月	Cs137	10.3	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生	22.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.8	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
せり	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	13.3	Bq/Kg生	± 5.7	Bq/Kg生	18.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
三つ葉	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
サラダ菜	いわき市好間町 北好間	2012年4月	Cs137	5.9	Bq/Kg生	± 4.7	Bq/Kg生	5.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
つぼみ菜	いわき市平 下大越	2011年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
つぼみ菜	いわき市内郷 高野町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	7.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.4	Bq/Kg生	± 5.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ふき	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	6.8	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	10.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ふき	いわき市平 下大越	2011年4月	Cs137	9.9	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生	15.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.9	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ふき	いわき市平 上神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	8.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.2	Bq/Kg生	± 4.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ふき	いわき市鹿島町 久保反町	2012年4月	Cs137	7.5	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生	13.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.1	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ふき	いわき市鹿島町 走熊	2012年4月	Cs137	6.2	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	13.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.5	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ふき	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生	7.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ふき	いわき市小名浜 金成	2012年4月	Cs137	6.0	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生	11.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.1	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
ふき	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	6.1	Bq/Kg生	± 4.9	Bq/Kg生	12.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市常磐 藤原町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市常磐 上矢田町	2012年4月	Cs137	12.2	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生	15.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市常磐 下湯長谷	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	5.3	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市添野町	2012年4月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふきのとう	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	12.4	Bq/Kg生	± 16.6	Bq/Kg生	24.9	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.5	Bq/Kg生	± 10.6	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
タラの芽	いわき市平 下神谷	2012年4月	Cs137	9.4	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生	19.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	10.4	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
タラの芽	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	155	Bq/Kg生	± 31.6	Bq/Kg生	245	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	90.3	Bq/Kg生	± 17.3	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
タラの芽	いわき市小名浜	2012年4月	Cs137	8.1	Bq/Kg生	± 8.9	Bq/Kg生	33.2	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	25.1	Bq/Kg生	± 9.0	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
タラの芽	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	8.3	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生	13.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.5	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
タラの芽	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	6.5	Bq/Kg生	± 4.1	Bq/Kg生	10.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
こごみ	北茨城市関本	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市小川町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.4	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.4	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市四倉町	2012年4月	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 8.1	Bq/Kg生	7.8	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 4.8	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市常磐 藤原町	2012年4月	Cs137	8.7	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生	23.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	14.3	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市遠野町 深山口	2012年4月	Cs137	5.0	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生	17.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.4	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	6.1	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生	12.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市添野町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市田人町 南大平	2012年4月	Cs137	54.9	Bq/Kg生	± 12.7	Bq/Kg生	92.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	37.5	Bq/Kg生	± 8.6	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
塩漬けわらび	石川郡古殿町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	茨城県高萩市	2012年4月	Cs137	151	Bq/Kg生	± 31.0	Bq/Kg生	272	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	121	Bq/Kg生	± 24.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	いわき市平 中塩	2012年4月	Cs137	14.8	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生	26.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	11.3	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
たけのこ	いわき市平下神谷	2012年4月	Cs137	39.1	Bq/Kg生	± 9.5	Bq/Kg生	61.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	22.8	Bq/Kg生	± 5.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	45.0	Bq/Kg生	± 10.7	Bq/Kg生	84.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	39.3	Bq/Kg生	± 8.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市鹿島町米田	2012年4月	Cs137	54.9	Bq/Kg生	± 12.8	Bq/Kg生	109	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	53.6	Bq/Kg生	± 11.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市鹿島町走熊	2012年4月	Cs137	41.9	Bq/Kg生	± 10.0	Bq/Kg生	77.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	36.0	Bq/Kg生	± 8.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	42.8	Bq/Kg生	± 9.9	Bq/Kg生	71.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	28.4	Bq/Kg生	± 6.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市常磐下湯長谷	2012年4月	Cs137	13.2	Bq/Kg生	± 4.8	Bq/Kg生	23.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.6	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市常磐湯長谷	2012年4月	Cs137	15.9	Bq/Kg生	± 5.2	Bq/Kg生	35.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.3	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市常磐下湯長谷	2012年4月	Cs137	39.1	Bq/Kg生	± 9.1	Bq/Kg生	62.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	23.7	Bq/Kg生	± 5.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市常磐藤原町	2012年4月	Cs137	18.1	Bq/Kg生	± 6.0	Bq/Kg生	34.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	16.7	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市常磐水ノ谷町	2012年4月	Cs137	50.7	Bq/Kg生	± 12.1	Bq/Kg生	89.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	39.1	Bq/Kg生	± 9.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市常磐下湯長谷	2012年4月	Cs137	32.7	Bq/Kg生	± 8.3	Bq/Kg生	58.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	26.1	Bq/Kg生	± 6.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市泉町	2012年4月	Cs137	68.7	Bq/Kg生	± 15.9	Bq/Kg生	118	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	49.2	Bq/Kg生	± 11.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平藤間	2012年4月	Cs137	340	Bq/Kg生	± 68	Bq/Kg生	607	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	267	Bq/Kg生	± 53	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市勿来町出蔵	2012年4月	Cs137	211	Bq/Kg生	± 42.0	Bq/Kg生	373	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	162	Bq/Kg生	± 32.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ水煮	いわき市常磐上湯長谷	2011年5月	Cs137	4.5	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	9.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	36.1	Bq/Kg生	± 17.0	Bq/Kg生	58.4	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	22.3	Bq/Kg生	± 8.2	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市江畠町	2012年4月	Cs137	16.1	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生	30.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	14.2	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市添野町	2012年4月	Cs137	16.0	Bq/Kg生	± 4.7	Bq/Kg生	33.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	17.0	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たけのこ	いわき市内	2012年4月	Cs137	78.4	Bq/Kg生	± 17.2	Bq/Kg生	139	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	60.1	Bq/Kg生	± 12.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
しいたけ	北茨城市関本	2012年4月	Cs137	58.0	Bq/Kg生	± 12.6	Bq/Kg生	100	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	41.8	Bq/Kg生	± 8.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
しいたけ	北茨城市高萩	2012年4月	Cs137	554	Bq/Kg生	± 111	Bq/Kg生	993	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	439	Bq/Kg生	± 88	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
しいたけ	いわき市大久町	2012年4月	Cs137	1900	Bq/Kg生	± 380	Bq/Kg生	3,350	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1450	Bq/Kg生	± 290	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
しいたけ	いわき市四倉町駒込	不明	Cs137	287	Bq/Kg生	± 57.0	Bq/Kg生	509	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	222	Bq/Kg生	± 44.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
しいたけ	いわき市四倉町	2012年4月	Cs137	646	Bq/Kg生	± 129	Bq/Kg生	1,158	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	512	Bq/Kg生	± 102	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
しいたけ	いわき市小川町 柴原	2012年3月	Cs137	94.8	Bq/Kg生	± 20.3	Bq/Kg生	176	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	81.6	Bq/Kg生	± 16.5	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 中神谷	2012年4月	Cs137	136	Bq/Kg生	± 28.0	Bq/Kg生	249	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	113	Bq/Kg生	± 23.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平	2012年4月	Cs137	286	Bq/Kg生	± 36.2	Bq/Kg生	466	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	180	Bq/Kg生	± 21.7	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	266	Bq/Kg生	± 55.0	Bq/Kg生	482	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	216	Bq/Kg生	± 43.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	623	Bq/Kg生	± 125	Bq/Kg生	1,100	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	477	Bq/Kg生	± 95.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市 平上大越	2012年4月	Cs137	614	Bq/Kg生	± 123	Bq/Kg生	1,100	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	486	Bq/Kg生	± 97.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 馬目	不明	Cs137	1820	Bq/Kg生	± 360	Bq/Kg生	3,240	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1420	Bq/Kg生	± 280	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 上片寄	2012年4月	Cs137	129	Bq/Kg生	± 26.0	Bq/Kg生	234	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	105	Bq/Kg生	± 21.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平小泉	2012年4月	Cs137	403	Bq/Kg生	± 81.0	Bq/Kg生	716	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	313	Bq/Kg生	± 63.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平夏井	2012年4月	Cs137	1130	Bq/Kg生	± 230	Bq/Kg生	1,972	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	842	Bq/Kg生	± 168	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市沼の内	不明	Cs137	547	Bq/Kg生	± 109	Bq/Kg生	966	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	419	Bq/Kg生	± 84.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市三和町	不明	Cs137	186	Bq/Kg生	± 37.0	Bq/Kg生	326	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	140	Bq/Kg生	± 28.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市好間町 北好間	2012年4月	Cs137	750	Bq/Kg生	± 83.8	Bq/Kg生	1,264	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	514	Bq/Kg生	± 52.8	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市 内郷宮町	2012年4月	Cs137	263	Bq/Kg生	± 53.0	Bq/Kg生	467	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	204	Bq/Kg生	± 41.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市内郷 御厩町	2012年4月	Cs137	823	Bq/Kg生	± 165	Bq/Kg生	1,479	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	656	Bq/Kg生	± 131	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 豊間	2012年4月	Cs137	1080	Bq/Kg生	± 222	Bq/Kg生	1,908	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	828	Bq/Kg生	± 166	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市常磐 下湯長谷	2012年4月	Cs137	107	Bq/Kg生	± 20.7	Bq/Kg生	177	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	69.6	Bq/Kg生	± 12.4	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	367	Bq/Kg生	± 73.0	Bq/Kg生	646	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	279	Bq/Kg生	± 56.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 下神白	2012年3月	Cs137	258	Bq/Kg生	± 55.0	Bq/Kg生	490	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	232	Bq/Kg生	± 46.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	178	Bq/Kg生	± 36.0	Bq/Kg生	323	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	145	Bq/Kg生	± 29.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 大原	2012年4月	Cs137	354	Bq/Kg生	± 71.0	Bq/Kg生	629	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	275	Bq/Kg生	± 55.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	190	Bq/Kg生	± 40.0	Bq/Kg生	324	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	134	Bq/Kg生	± 27.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	492	Bq/Kg生	± 98.0	Bq/Kg生	891	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	399	Bq/Kg生	± 80.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	918	Bq/Kg生	± 184	Bq/Kg生	1,621	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	703	Bq/Kg生	± 141	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
しいたけ	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	83.3	Bq/Kg生	± 17.3	Bq/Kg生	154	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	70.8	Bq/Kg生	± 14.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市泉ヶ丘	2012年4月	Cs137	788	Bq/Kg生	± 158	Bq/Kg生	1,382	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	594	Bq/Kg生	± 119	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市江畠町	2012年4月	Cs137	222	Bq/Kg生	± 44.0	Bq/Kg生	397	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	175	Bq/Kg生	± 35.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市勿来町 出蔵	2012年4月	Cs137	492	Bq/Kg生	± 98.0	Bq/Kg生	882	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	390	Bq/Kg生	± 78.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市泉町	2012年4月	Cs137	408	Bq/Kg生	± 82.0	Bq/Kg生	718	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	310	Bq/Kg生	± 62.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市渡辺町 田部	2012年4月	Cs137	57.4	Bq/Kg生	± 12.9	Bq/Kg生	98.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	40.7	Bq/Kg生	± 9.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市高倉町 礼場	2012年4月	Cs137	393	Bq/Kg生	± 48.6	Bq/Kg生	672	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	279	Bq/Kg生	± 31.3	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市田人町 黒田	2012年4月	Cs137	171	Bq/Kg生	± 35.0	Bq/Kg生	173	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 25.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市田人町	2012年4月	Cs137	130	Bq/Kg生	± 28.0	Bq/Kg生	243	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	113	Bq/Kg生	± 23.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	616	Bq/Kg生	± 123	Bq/Kg生	1,103	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	487	Bq/Kg生	± 97.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	121	Bq/Kg生	± 25.0	Bq/Kg生	216	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	95.4	Bq/Kg生	± 19.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	245	Bq/Kg生	± 50.0	Bq/Kg生	435	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	190	Bq/Kg生	± 38.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	198	Bq/Kg生	± 30.7	Bq/Kg生	336	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	138	Bq/Kg生	± 19.4	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
えのき茸	岩手県江刺	不明	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
干しシイタケ	いわき市田人町	2012年4月	Cs137	875	Bq/Kg生	± 177	Bq/Kg生	1,614	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	739	Bq/Kg生	± 148	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
干しシイタケ (戻し)	いわき市田人町	2012年4月	Cs137	19.1	Bq/Kg生	± 5.1	Bq/Kg生	40.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	21.6	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
乾燥しいたけ	いわき市田人町 南大平	2012年4月	Cs137	1680	Bq/Kg生	± 340	Bq/Kg生	3,010	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1330	Bq/Kg生	± 270	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市若葉台	2011年8月	Cs137	55.2	Bq/Kg生	± 12.0	Bq/Kg生	97.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	42.5	Bq/Kg生	± 8.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市鹿島町 米田	2011年8月	Cs137	66.3	Bq/Kg生	± 14.3	Bq/Kg生	113	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	46.7	Bq/Kg生	± 9.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市中央台 高久	2011年8月	Cs137	137	Bq/Kg生	± 28.0	Bq/Kg生	252	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	115	Bq/Kg生	± 23.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
りんご	伊達市保原町	2011年10月	Cs137	30.8	Bq/Kg生	± 7.2	Bq/Kg生	52.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	21.6	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
オレンジ	いわき市常磐 上湯長谷	2012年3月	Cs137	83.2	Bq/Kg生	± 18.3	Bq/Kg生	152	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	69.2	Bq/Kg生	± 14.5	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市桜ヶ丘	2012年2月	Cs137	11.9	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生	19.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.6	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市常磐 上矢田町	2012年2月	Cs137	179	Bq/Kg生	± 28.3	Bq/Kg生	282	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	103	Bq/Kg生	± 16.3	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
夏みかん	いわき市平中塩	2012年4月	Cs137	95.3	Bq/Kg生	± 19.6 Bq/Kg生	173	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	77.9	Bq/Kg生	± 15.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
夏みかん	いわき市桜ヶ丘	2012年2月	Cs137	12.5	Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	23.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	10.7	Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
夏みかん	いわき市湘南台	2012年4月	Cs137	28.9	Bq/Kg生	± 9.3 Bq/Kg生	51.8	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	22.9	Bq/Kg生	± 6.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
キウイ	いわき市好間町大利	2011年12月	Cs137	32.5	Bq/Kg生	± 7.7 Bq/Kg生	54.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	22.4	Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きんかん	いわき市平久保町	2012年1月	Cs137	7.7	Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	12.3	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
ゆず	いわき市泉もえぎ台	2011年12月	Cs137	70.0	Bq/Kg生	± 15.4 Bq/Kg生	128	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	57.9	Bq/Kg生	± 12.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ゆず	いわき市小名浜大原	2012年4月	Cs137	64.2	Bq/Kg生	± 14.4 Bq/Kg生	119	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	54.4	Bq/Kg生	± 11.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
柿	福島市上野寺	2011年11月	Cs137	14.8	Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	26.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	11.9	Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
柿	いわき市小川町下小川	2011年11月	Cs137	4.8	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	9.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.4	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
干し柿	いわき市泉もえぎ台	2011年11月	Cs137	15.7	Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	27.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	11.4	Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
干し柿	いわき市好間町下好間	2011年11月	Cs137	14.4	Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生	24.5	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	10.1	Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
干し柿	いわき市平赤井	2011年12月	Cs137	42.5	Bq/Kg生	± 9.6 Bq/Kg生	77.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	35.3	Bq/Kg生	± 7.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
梅	いわき市平久保町	2011年6月	Cs137	5.9	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
梅干し	和歌山県	不明	Cs137	2.0	Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
梅干し	いわき市小名浜岡小名	2011年6月	Cs137	64.2	Bq/Kg生	± 13.9 Bq/Kg生	117	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	52.4	Bq/Kg生	± 10.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	茨城県	不明	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	双葉郡楢葉町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	いわき市三和町	2011年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	いわき市平中山	2011年11月	Cs137	1.0	Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	2.0	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.0	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
みそ	いわき市田人町	2011年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	いわき市沼部町金山	2010年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	不明	不明	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	いわき市平中神谷	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みそ	いわき市平川部町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
卵	新潟県北区	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
卵	いわき市小川町 上小川	2012年3月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 0.9	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
卵	いわき市小川町 上小川	2012年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
卵	いわき市沼部町 金山	2012年4月	Cs137	2.3	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	5.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
いのしし	いわき市小川町	不明	Cs137	78.3	Bq/Kg生	± 16.5	Bq/Kg生	137	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	58.4	Bq/Kg生	± 12.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
いのしし	いわき市三和町 下市萱	2012年4月	Cs137	31.7	Bq/Kg生	± 7.4	Bq/Kg生	59.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	28.1	Bq/Kg生	± 6.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
いのしし	いわき市三和町 中寺	2012年4月	Cs137	41.6	Bq/Kg生	± 9.3	Bq/Kg生	72.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	30.9	Bq/Kg生	± 6.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
いのしし	いわき市三和町 中寺	2012年4月	Cs137	68.9	Bq/Kg生	± 14.6	Bq/Kg生	120	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	51.5	Bq/Kg生	± 10.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
豚挽肉	東白川郡 鮫川村	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
えごまメンチカツ	福島県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
和牛メンチカツ	福島県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
からあげ	福島県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
カレー(調理品)	不明	2012年4月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生	2.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
フ"ルーハリージヤム	いわき市鹿島町 米田	2011年8月	Cs137	57.6	Bq/Kg生	± 12.6	Bq/Kg生	108	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	50.0	Bq/Kg生	± 10.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
給食	いわき市内郷	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
給食	いわき市内郷	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
給食	いわき市常磐	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たくあん	いわき市小名浜 金成	2011年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
梅シロップ	いわき市泉町 下川	2011年6月	Cs137	12.2	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生	26.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	14.4	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かにかま フレーク	不明	2012年4月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かにかま スティック	不明	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
商品茶飲料	不明	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.1	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
牛乳	北海道	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
牛乳	北海道	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ヨーグルト	北海道	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
たら・なめた (ミックス)	いわき市	2012年4月	Cs137	4.1	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生	4.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
うなぎ	いわき市平 下大越	2012年4月	Cs137	287	Bq/Kg生	± 36.4	Bq/Kg生	464	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	177	Bq/Kg生	± 22.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もくずがに	いわき市夏井川	2012年4月	Cs137	34.0	Bq/Kg生	± 8.0	Bq/Kg生	69.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	35.7	Bq/Kg生	± 7.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
わかめ	いわき市小名浜	2012年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
わかめ	いわき市永崎	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
わかめ	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	11.1	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生	18.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.1	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
わかめ	いわき市小名浜	2012年4月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 0.2	Bq/Kg生	6.0	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 4.9	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
わかめ	いわき市小名浜	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
めかぶ	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
切り昆布	韓国	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
貝類 (ムラサキ貝・シウリ貝)	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	5.4	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生	11.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.4	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ひじき	いわき市豊間 会磯	2012年4月	Cs137	15.0	Bq/Kg生	± 4.9	Bq/Kg生	20.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.2	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アルカリイオン水	不明	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.1	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.1	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
ミネラル ウォーター	富山県砺波市	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
ミネラル ウォーター	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
ピュアウォーター	不明	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水	不明	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.6	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水	いわき市	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水	いわき市遠野町 滝	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水道水	北茨城市平潟市	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市 平上荒川	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.2	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市泉町 滝尻	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市四倉町 上仁井田	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
水道水	いわき市内郷 高野町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市内郷 高坂町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市内郷 小島町	2012年4月	Cs137	1.1	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生	1.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市内郷 宮町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.2	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.2	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市内郷	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
井戸水	双葉郡楢葉町	2012年4月	Cs137	1.4	Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生	2.8	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市四倉町 狐塚	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市平 上平窪	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.6	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
沢水	いわき市遠野町 入遠野	2011年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
湧水	東白川郡 鮫川村	2012年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.1	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.1	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
湧水	いわき市三和町 合戸	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
湧水	いわき市川部町	2012年4月	Cs137	1.2	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生	1.2	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
雨水(貯槽)	いわき市 湘南台	2012年4月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 1.5	Bq/Kg生	3.0	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.4	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
地下水	いわき市三和町 差塩	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
目ぐりの木	いわき市小名浜	2011年10月	Cs137	481	Bq/Kg生	± 107	Bq/Kg生	898	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	417	Bq/Kg生	± 87.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
カヤ	いわき市泉 もえぎ台	2012年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	15.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	15.5	Bq/Kg生	± 11.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
おがくず	不明	2012年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	13.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	13.5	Bq/Kg生	± 11.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
堆肥（牛糞）	須賀川市	2012年4月	Cs137	97.0	Bq/Kg生	± 23.0	Bq/Kg生	170	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	73.0	Bq/Kg生	± 14.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
堆肥	いわき市泉 もえぎ台	2012年3月	Cs137	501	Bq/Kg生	± 60.0	Bq/Kg生	842	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	341	Bq/Kg生	± 38.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
灰	いわき市平才槌 小路	2012年4月	Cs137	3659.5	Bq/Kg生	± 333.0	Bq/Kg生	9076	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	5416.4	Bq/Kg生	± 508.1	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
土壤	いわき市小川町 前原	2012年4月	Cs137	240	Bq/Kg乾	± 33.0	Bq/Kg乾	417	Cs137 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	177	Bq/Kg乾	± 23.0	Bq/Kg乾		Cs134 8.0 Bq/Kg乾
土壤	いわき市 下小川町前原	2012年4月	Cs137	371	Bq/Kg乾	± 46.0	Bq/Kg乾	583	Cs137 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	212	Bq/Kg乾	± 27.0	Bq/Kg乾		Cs134 8.0 Bq/Kg乾
土壤	いわき市平 下神谷	2012年4月	Cs137	408	Bq/Kg乾	± 48.0	Bq/Kg乾	692	Cs137 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	284	Bq/Kg乾	± 31.0	Bq/Kg乾		Cs134 8.0 Bq/Kg乾

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
土壤	いわき市平 自由ヶ丘	2012年4月	Cs137	111	Bq/Kg乾	± 18.0	Bq/Kg乾	191	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	80.0	Bq/Kg乾	± 13.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市平 谷川瀬	2012年4月	Cs137	161	Bq/Kg乾	± 27.0	Bq/Kg乾	270	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	109	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	60.0	Bq/Kg乾	± 14.0	Bq/Kg乾	105	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	45.0	Bq/Kg乾	± 9.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市平 下荒川	2012年4月	Cs137	379	Bq/Kg乾	± 47.0	Bq/Kg乾	644	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	265	Bq/Kg乾	± 30.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市中央台 鹿島	2012年4月	Cs137	180	Bq/Kg乾	± 26.0	Bq/Kg乾	304	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	124	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市中央台 高久	2012年4月	Cs137	808	Bq/Kg乾	± 87.0	Bq/Kg乾	1,355	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	547	Bq/Kg乾	± 56.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市内郷 高坂町	2012年4月	Cs137	101	Bq/Kg乾	± 18.0	Bq/Kg乾	163	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	62.0	Bq/Kg乾	± 11.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市内郷 綴町	2012年4月	Cs137	367	Bq/Kg乾	± 45.0	Bq/Kg乾	597	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	230	Bq/Kg乾	± 27.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市鹿島町 走熊	2012年4月	Cs137	108	Bq/Kg乾	± 19.0	Bq/Kg乾	190	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	82.0	Bq/Kg乾	± 13.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市常磐 上矢田町	2012年4月	Cs137	217	Bq/Kg乾	± 30.0	Bq/Kg乾	336	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	119	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市常磐 関船町	2012年4月	Cs137	216	Bq/Kg乾	± 30.0	Bq/Kg乾	370	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	154	Bq/Kg乾	± 20.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市泉 玉露	2012年4月	Cs137	157	Bq/Kg乾	± 27.0	Bq/Kg乾	272	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	115	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市泉 もえぎ台	2012年3月	Cs137	224	Bq/Kg乾	± 29.0	Bq/Kg乾	387	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	163	Bq/Kg乾	± 19.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市遠野町 深山田	2012年4月	Cs137	52.0	Bq/Kg乾	± 14.0	Bq/Kg乾	95.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	43.0	Bq/Kg乾	± 9.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壤	いわき市勿来町 窪田	2012年4月	Cs137	316	Bq/Kg乾	± 40.0	Bq/Kg乾	525	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	209	Bq/Kg乾	± 26.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市三和町 中寺	2012年4月	Cs137	148	Bq/Kg乾	± 23.0	Bq/Kg乾	232	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	84.0	Bq/Kg乾	± 14.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市好間町 北好間	2012年4月	Cs137	220	Bq/Kg乾	± 31.0	Bq/Kg乾	353	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	133	Bq/Kg乾	± 19.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平 赤井	2012年4月	Cs137	252	Bq/Kg乾	± 35.0	Bq/Kg乾	421	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	169	Bq/Kg乾	± 22.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平 赤井	2012年3月	Cs137	176	Bq/Kg乾	± 24.0	Bq/Kg乾	300	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	124	Bq/Kg乾	± 16.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平 赤井	2012年3月	Cs137	48.0	Bq/Kg乾	± 12.0	Bq/Kg乾	84.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	36.0	Bq/Kg乾	± 8.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	668	Bq/Kg乾	± 72.0	Bq/Kg乾	1,133	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	465	Bq/Kg乾	± 48.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	63.0	Bq/Kg乾	± 14.0	Bq/Kg乾	109	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	46.0	Bq/Kg乾	± 10.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平 下高久	2012年4月	Cs137	516	Bq/Kg乾	± 60.0	Bq/Kg乾	904	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	388	Bq/Kg乾	± 40.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平 下高久	2012年4月	Cs137	265	Bq/Kg乾	± 35.0	Bq/Kg乾	438	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	173	Bq/Kg乾	± 21.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
畳土	いわき市平下高久	2012年4月	Cs137	179	Bq/Kg乾	± 25.0	Bq/Kg乾	285	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	106	Bq/Kg乾	± 15.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平下高久	2012年4月	Cs137	212	Bq/Kg乾	± 31.0	Bq/Kg乾	382	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	170	Bq/Kg乾	± 21.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平北白土	2012年4月	Cs137	207	Bq/Kg乾	± 29.0	Bq/Kg乾	360	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	153	Bq/Kg乾	± 20.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平北白土	2012年4月	Cs137	218	Bq/Kg乾	± 30.0	Bq/Kg乾	380	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	162	Bq/Kg乾	± 21.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平藤間	2012年4月	Cs137	114	Bq/Kg乾	± 19.0	Bq/Kg乾	181	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	67.0	Bq/Kg乾	± 11.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平沼ノ内	2012年4月	Cs137	245	Bq/Kg乾	± 32.0	Bq/Kg乾	386	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	141	Bq/Kg乾	± 19.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市中央台高久	2012年4月	Cs137	40.0	Bq/Kg乾	± 10.0	Bq/Kg乾	67.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	27.0	Bq/Kg乾	± 8.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市中央台高久	2012年4月	Cs137	801	Bq/Kg乾	± 86.0	Bq/Kg乾	1,310	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	509	Bq/Kg乾	± 53.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市中央台飯野	2012年4月	Cs137	228	Bq/Kg乾	± 32.0	Bq/Kg乾	400	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	172	Bq/Kg乾	± 22.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市内郷高野町	2012年4月	Cs137	178	Bq/Kg乾	± 26.0	Bq/Kg乾	303	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	125	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市内郷宮町	2012年4月	Cs137	262	Bq/Kg乾	± 34.0	Bq/Kg乾	425	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	163	Bq/Kg乾	± 21.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜岡小名	2012年4月	Cs137	79.0	Bq/Kg乾	± 15.0	Bq/Kg乾	133	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	54.0	Bq/Kg乾	± 10.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜住吉	2012年4月	Cs137	100	Bq/Kg乾	± 18.0	Bq/Kg乾	155	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	55.0	Bq/Kg乾	± 11.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜住吉	2012年4月	Cs137	66.0	Bq/Kg乾	± 14.0	Bq/Kg乾	102	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	36.0	Bq/Kg乾	± 8.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	202	Bq/Kg乾	± 28.0	Bq/Kg乾	317	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	115	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	81.0	Bq/Kg乾	± 15.0	Bq/Kg乾	137	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	56.0	Bq/Kg乾	± 10.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市常磐西郷町	2012年4月	Cs137	82.0	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾	143	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	61.0	Bq/Kg乾	± 11.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市常磐三沢町	2012年3月	Cs137	201	Bq/Kg乾	± 28.0	Bq/Kg乾	330	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	129	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市泉もえぎ合	2012年3月	Cs137	105	Bq/Kg乾	± 17.0	Bq/Kg乾	177	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	72.0	Bq/Kg乾	± 11.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	128	Bq/Kg乾	± 21.0	Bq/Kg乾	220	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	92.0	Bq/Kg乾	± 14.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	190	Bq/Kg乾	± 42.0	Bq/Kg乾	306	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	116	Bq/Kg乾	± 26.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市勿来町白米	2012年4月	Cs137	328	Bq/Kg乾	± 42.0	Bq/Kg乾	543	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	215	Bq/Kg乾	± 26.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
水田	いわき市三和町中寺	2012年4月	Cs137	149	Bq/Kg乾	± 24.0	Bq/Kg乾	258	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	109	Bq/Kg乾	± 15.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
水田	いわき市平馬目	2012年4月	Cs137	395	Bq/Kg乾	± 49.0	Bq/Kg乾	654	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	259	Bq/Kg乾	± 30.0	Bq/Kg乾		Cs134	8.0	Bq/Kg乾