



2012年4月の放射能測定結果 522件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	宮崎県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	福島市	2010年	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	福島市前鳴沢	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	福島市松川町	2011年10月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	15.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.0 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	南会津郡	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	会津只見町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	東白川郡 棚倉町	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	伊達市伊達町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	白河市滑津中島	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	安達郡大玉村	不明	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	二本松市	不明	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	8.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	郡山市三穂町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	須賀川市	2011年10月	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	12.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	石川郡古殿町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	石川郡古殿町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	双葉郡浪江町 樋渡	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町 上小川	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 赤井	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市平赤井	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平上山口	2011年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平神谷	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市夏井	2011年10月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市夏井	2011年10月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	7.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市沼の内	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町長友	2011年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市錦町	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町入遠野	2011年10月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	9.5 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	19.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	不明	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	秋田県	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	4.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
白米	秋田県大仙市	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	秋田県大曲市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2001年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2011年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県白石市	2011年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県黒川郡	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県栗原市高瀬町	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県角田市高倉	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	千葉県香取市石納	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	千葉県香取市森戸	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県	不明	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	新潟県	2011年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県日立市 十王町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	大沼郡 会津三里町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津若松市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市田村町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市中田町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	安達郡大玉村	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	安達郡大玉村	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	田村市船引町	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	石川郡古殿町 田口	2011年10月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	石川郡石川町	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	石川郡石川町	2011年11月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	相馬市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町 差塩	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三和町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	8.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 細谷	2011年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 戸田	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生	5.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町 柳生	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市草野町	2011年10月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	5.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 赤井	2011年11月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 赤井	2011年9月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平字 絹谷	2012年11月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 吉野谷	2011年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 北白土	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平高久	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 下高久	2011年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 下平窪	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 下平窪	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平水品	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 下大越	2011年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	8.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平鯨岡	2011年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市内郷 高坂町	2011年10月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市鹿島町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市鹿島町	2011年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	5.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 住吉	2011年11月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市常磐西郷町	2011年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐西郷町	2011年11月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐藤原町	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐藤原町	2011年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐藤原町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市常磐白鳥町	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町上遠野	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三沢町	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市植田町江畑	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町田町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市	不明	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市平	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米(玄米)	耶麻郡猪苗代町	2011年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
米(五分づき)	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
炒飯米	宮城県角田市豊宝	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
炒飯米	宮城県角田市豊宝	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
炒飯米	宮城県角田市稲置	2011年10月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
炒飯米	いわき市四倉町 下柳生	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平白土	2011年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 北白土	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下大越	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 赤井	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 鎌田	2011年7月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平中塩	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平石森	2011年6月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 中神谷	2011年8月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	8.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町 下好間	2011年7月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	3.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市内郷 御殿町	2011年7月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市内郷 宮町	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市常磐 三沢町	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 島	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 岡小名	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市泉町 下川	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市渡辺町 上釜戸	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市遠野町 深山田	2011年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市勿来町 酒井	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	茨城県	不明	Cs137	7.5 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市沼部町 鳴天	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんにく	いわき市小川町 柴原	2011年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
にんにく	いわき市好間町 大利	2011年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.7	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.7 Bq/Kg生	± 5.4 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
長芋	いわき市鹿島町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
山芋	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
こんにゃく芋	いわき市田人町 黒田	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
アピオス	いわき市上好間 大堰	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ヤーコン	いわき市平 豊間	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ごぼう	いわき市泉 玉露	2012年4月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	10.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.4 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市 もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市泉 もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市玉川町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市内郷 御厩町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平 赤井	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市中央台 飯野	2012年3月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小名浜 玉川	2012年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ・大根 じゃがいもミックス	いわき市小名浜 住吉	不明	Cs137	7.1 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
切干大根	いわき市勿来町 大高	2012年1月	Cs137	18.9 Bq/Kg生	± 9.8 Bq/Kg生	35.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	16.8 Bq/Kg生	± 8.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根葉	いわき市永崎	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.4 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市内郷 御厩町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
らっきょう	いわき市永崎 地切	2012年4月	Cs137	8.9 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	15.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.9 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	北海道	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 北白土	2011年7月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市好間町 大利	2011年6月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	7.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
葉たまねぎ	いわき市平 沼の内	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
葉たまねぎ	いわき市平下大越	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
葉たまねぎ	いわき市小名浜下神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
葉たまねぎ	いわき市常磐上湯長谷	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
葉たまねぎ	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
葉たまねぎ	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市平鎌田	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市平上山口	2012年4月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市平下大越	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市平下神谷	2012年4月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	12.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市小川町高萩	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市小川町柴原	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市内郷高野町	2012年4月	Cs137	5.9 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市内郷宮町	2012年4月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市永崎	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市小名浜島	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市常磐上矢田	2012年4月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市泉もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市遠野町上遠野	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市渡辺町田部	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市沼部町	2012年4月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	6.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ねぎ	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	0.3 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市平藤間	2012年4月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	8.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市平下荒川	2012年4月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市平下大越	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.5 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ニラ	いわき市平 下山口	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市鹿島町 飯田	2012年4月	Cs137	25.8 Bq/Kg生	± 8.1 Bq/Kg生	41.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	15.5 Bq/Kg生	± 5.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市小名浜 住吉	2012年4月	Cs137	7.4 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	18.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.2 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わけぎ	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
葉ねぎ	いわき市平 下荒川	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あさつき	いわき市 中央台鹿島	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.6 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
エシャレット	いわき市鹿島町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.7 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
エシャレット	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小豆	北海道帯広市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
黒豆	いわき市田人町 荷路夫	2011年12月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市内郷 御殿町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市洋向台	2012年4月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	10.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平 上山口	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市泉 もえぎ台	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市小名浜 住吉	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市三和町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	愛知県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市平中塩	2012年4月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市常磐 水ノ谷	2012年4月	Cs137	7.0 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.6 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市泉 もえぎ台	2012年4月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
キャベツ	いわき市山田町 大谷	2012年4月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市渡辺町 塙	2012年4月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市平夏井	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市 平下神谷	2012年4月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 0.4 Bq/Kg生	8.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 8.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市平 絹谷	2012年4月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	8.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市小名浜 吹松	2012年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市泉 もえぎ台	2012年4月	Cs137	6.3 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市泉町 下川	2012年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市渡辺町 塙	2012年4月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市三沢町	2012年4月	Cs137	8.4 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生	16.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.5 Bq/Kg生	± 6.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
グリーンアスパ ラ	いわき市川前町 下桶売	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あぶら菜	いわき市桜ヶ丘	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あぶら菜	いわき市桜ヶ丘	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あぶら菜	いわき市上好間 大堰	2012年4月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あぶら菜	いわき市 もえぎ台	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市平 下平窪	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市平 上山口	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市平 沼の内	2012年4月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	8.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市 自由が丘	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.6 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市好間町 下好間	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市好間町 下好間	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市内郷 高野町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市鹿島町 飯田	2012年4月	Cs137	7.2 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生	13.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市小名浜 大原	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ほうれん草	いわき市小名浜 玉川町	2012年4月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生	5.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 7.4 Bq/Kg生	11.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 5.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市泉 もえぎ台	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ほうれん草	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
越中菜花	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.7 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
菜の花	いわき市平下 神谷	2012年4月	Cs137	13.9 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生	24.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.7 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
菜の花	いわき市四倉町 塩木	2012年4月	Cs137	11.7 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	16.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.9 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
菜の花	いわき市常磐 上湯長谷	2012年4月	Cs137	7.2 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
菜の花	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.6	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
菜の花	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.5 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
菜の花	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	12.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.2 Bq/Kg生	± 6.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
水菜	いわき市遠野町 深山田	2012年4月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
からし菜	いわき市平下 神谷	2012年4月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 14.5 Bq/Kg生	9.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
からし菜	いわき市自由が丘	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
からし菜	いわき市好間町 北好間	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.6 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
からし菜	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
からし菜	いわき市遠野町 滝	2012年4月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	9.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
からし菜	いわき市勿来町 窪田	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
春菊	いわき市平下 平窪	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
春菊	いわき市平上 神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.4 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かき菜	いわき市高倉町 礼場	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
おいしい菜	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぶ	いわき市内郷高野町	2012年4月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	8.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぶ	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぶ葉	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わさび菜	いわき市四倉町塩木	2012年4月	Cs137	17.6 Bq/Kg生	± 11.6 Bq/Kg生	29.7	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.1 Bq/Kg生	± 7.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
のらぼう菜	いわき市平中塩	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市永崎地切	2012年4月	Cs137	7.4 Bq/Kg生	± 6.8 Bq/Kg生	18.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.2 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市遠野町滝	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市泉町下川	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市常磐上矢田	2012年4月	Cs137	7.4 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
クレソン	いわき市小名浜下神白	2012年4月	Cs137	8.6 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	16.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.2 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
せり	いわき市常磐下船尾	2012年4月	Cs137	10.3 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	22.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.8 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
せり	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	13.3 Bq/Kg生	± 5.7 Bq/Kg生	18.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.0 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
三つ葉	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
サラダ菜	いわき市好間町北好間	2012年4月	Cs137	5.9 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
つぼみ菜	いわき市平下大越	2011年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
つぼみ菜	いわき市内郷高野町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.4 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	6.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	10.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平下大越	2011年4月	Cs137	9.9 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生	15.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平上神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.2 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市鹿島町久保反町	2012年4月	Cs137	7.5 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	13.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.1 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市鹿島町走熊	2012年4月	Cs137	6.2 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	13.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.5 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	7.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市小名浜金成	2012年4月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	11.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ふき	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	12.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.2 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市常磐 藤原町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市常磐 上矢田町	2012年4月	Cs137	12.2 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	15.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市常磐 下湯長谷	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市 泉玉露	2012年4月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市添野町	2012年4月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふきのとう	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	12.4 Bq/Kg生	± 16.6 Bq/Kg生	24.9	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.5 Bq/Kg生	± 10.6 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市平 下神谷	2012年4月	Cs137	9.4 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	19.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.4 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	155 Bq/Kg生	± 31.6 Bq/Kg生	245	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	90.3 Bq/Kg生	± 17.3 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市小名浜	2012年4月	Cs137	8.1 Bq/Kg生	± 8.9 Bq/Kg生	33.2	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	25.1 Bq/Kg生	± 9.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	8.3 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	13.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.5 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	10.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ごごみ	北茨城市関本	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市小川町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.4 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市四倉町	2012年4月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 8.1 Bq/Kg生	7.8	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市常磐 藤原町	2012年4月	Cs137	8.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	23.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	14.3 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市遠野町 深山口	2012年4月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	17.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.4 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	6.1 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	12.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市添野町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市田人町 南大平	2012年4月	Cs137	54.9 Bq/Kg生	± 12.7 Bq/Kg生	92.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	37.5 Bq/Kg生	± 8.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
塩漬けわらび	石川郡古殿町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	茨城県高萩市	2012年4月	Cs137	151 Bq/Kg生	± 31.0 Bq/Kg生	272	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	121 Bq/Kg生	± 24.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市平 中塩	2012年4月	Cs137	14.8 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生	26.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.3 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
たけのこ	いわき市平下神谷	2012年4月	Cs137	39.1 Bq/Kg生	± 9.5 Bq/Kg生	61.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	22.8 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	45.0 Bq/Kg生	± 10.7 Bq/Kg生	84.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	39.3 Bq/Kg生	± 8.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市鹿島町米田	2012年4月	Cs137	54.9 Bq/Kg生	± 12.8 Bq/Kg生	109	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	53.6 Bq/Kg生	± 11.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市鹿島町走熊	2012年4月	Cs137	41.9 Bq/Kg生	± 10.0 Bq/Kg生	77.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	36.0 Bq/Kg生	± 8.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	42.8 Bq/Kg生	± 9.9 Bq/Kg生	71.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	28.4 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市常磐下湯長谷	2012年4月	Cs137	13.2 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	23.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.6 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市常磐湯長谷	2012年4月	Cs137	15.9 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生	35.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	19.3 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市常磐下湯長谷	2012年4月	Cs137	39.1 Bq/Kg生	± 9.1 Bq/Kg生	62.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	23.7 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市常磐藤原町	2012年4月	Cs137	18.1 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生	34.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	16.7 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市常磐水ノ谷町	2012年4月	Cs137	50.7 Bq/Kg生	± 12.1 Bq/Kg生	89.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	39.1 Bq/Kg生	± 9.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市常磐下湯長谷	2012年4月	Cs137	32.7 Bq/Kg生	± 8.3 Bq/Kg生	58.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	26.1 Bq/Kg生	± 6.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市泉町	2012年4月	Cs137	68.7 Bq/Kg生	± 15.9 Bq/Kg生	118	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	49.2 Bq/Kg生	± 11.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しいたけ	いわき市平藤間	2012年4月	Cs137	340 Bq/Kg生	± 68 Bq/Kg生	607	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	267 Bq/Kg生	± 53 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市勿来町出蔵	2012年4月	Cs137	211 Bq/Kg生	± 42.0 Bq/Kg生	373	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	162 Bq/Kg生	± 32.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ水煮	いわき市常磐上湯長谷	2011年5月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	9.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	36.1 Bq/Kg生	± 17.0 Bq/Kg生	58.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	22.3 Bq/Kg生	± 8.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市江畑町	2012年4月	Cs137	16.1 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	30.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	14.2 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市添野町	2012年4月	Cs137	16.0 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生	33.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	17.0 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ	いわき市内	2012年4月	Cs137	78.4 Bq/Kg生	± 17.2 Bq/Kg生	139	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	60.1 Bq/Kg生	± 12.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しいたけ	北茨城市関本	2012年4月	Cs137	58.0 Bq/Kg生	± 12.6 Bq/Kg生	100	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	41.8 Bq/Kg生	± 8.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しいたけ	北茨城市高萩	2012年4月	Cs137	554 Bq/Kg生	± 111 Bq/Kg生	993	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	439 Bq/Kg生	± 88 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しいたけ	いわき市大久町	2012年4月	Cs137	1900 Bq/Kg生	± 380 Bq/Kg生	3,350	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1450 Bq/Kg生	± 290 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しいたけ	いわき市四倉町駒込	不明	Cs137	287 Bq/Kg生	± 57.0 Bq/Kg生	509	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	222 Bq/Kg生	± 44.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しいたけ	いわき市四倉町	2012年4月	Cs137	646 Bq/Kg生	± 129 Bq/Kg生	1,158	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	512 Bq/Kg生	± 102 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
しいたけ	いわき市小川町 柴原	2012年3月	Cs137	94.8	Bq/Kg生	± 20.3	176	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	81.6	Bq/Kg生	± 16.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 中神谷	2012年4月	Cs137	136	Bq/Kg生	± 28.0	249	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	113	Bq/Kg生	± 23.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平	2012年4月	Cs137	286	Bq/Kg生	± 36.2	466	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	180	Bq/Kg生	± 21.7		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	266	Bq/Kg生	± 55.0	482	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	216	Bq/Kg生	± 43.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	623	Bq/Kg生	± 125	1,100	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	477	Bq/Kg生	± 95.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市 平上大越	2012年4月	Cs137	614	Bq/Kg生	± 123	1,100	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	486	Bq/Kg生	± 97.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 馬目	不明	Cs137	1820	Bq/Kg生	± 360	3,240	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1420	Bq/Kg生	± 280		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 上片寄	2012年4月	Cs137	129	Bq/Kg生	± 26.0	234	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	105	Bq/Kg生	± 21.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平小泉	2012年4月	Cs137	403	Bq/Kg生	± 81.0	716	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	313	Bq/Kg生	± 63.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平夏井	2012年4月	Cs137	1130	Bq/Kg生	± 230	1,972	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	842	Bq/Kg生	± 168		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市沼の内	不明	Cs137	547	Bq/Kg生	± 109	966	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	419	Bq/Kg生	± 84.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市三和町	不明	Cs137	186	Bq/Kg生	± 37.0	326	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	140	Bq/Kg生	± 28.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市好間町 北好間	2012年4月	Cs137	750	Bq/Kg生	± 83.8	1,264	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	514	Bq/Kg生	± 52.8		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市 内郷宮町	2012年4月	Cs137	263	Bq/Kg生	± 53.0	467	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	204	Bq/Kg生	± 41.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市内郷 御厩町	2012年4月	Cs137	823	Bq/Kg生	± 165	1,479	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	656	Bq/Kg生	± 131		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市平 豊間	2012年4月	Cs137	1080	Bq/Kg生	± 222	1,908	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	828	Bq/Kg生	± 166		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市常磐 下湯長谷	2012年4月	Cs137	107	Bq/Kg生	± 20.7	177	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	69.6	Bq/Kg生	± 12.4		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	367	Bq/Kg生	± 73.0	646	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	279	Bq/Kg生	± 56.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 下神白	2012年3月	Cs137	258	Bq/Kg生	± 55.0	490	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	232	Bq/Kg生	± 46.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 岡小名	2012年4月	Cs137	178	Bq/Kg生	± 36.0	323	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	145	Bq/Kg生	± 29.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 大原	2012年4月	Cs137	354	Bq/Kg生	± 71.0	629	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	275	Bq/Kg生	± 55.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 玉川	2012年4月	Cs137	190	Bq/Kg生	± 40.0	324	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	134	Bq/Kg生	± 27.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	492	Bq/Kg生	± 98.0	891	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	399	Bq/Kg生	± 80.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市小名浜 上神白	2012年4月	Cs137	918	Bq/Kg生	± 184	1,621	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	703	Bq/Kg生	± 141		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
しいたけ	いわき市泉町 下川	2012年4月	Cs137	83.3	Bq/Kg生	± 17.3	154	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	70.8	Bq/Kg生	± 14.2		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市泉ヶ丘	2012年4月	Cs137	788	Bq/Kg生	± 158	1,382	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	594	Bq/Kg生	± 119		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市江畑町	2012年4月	Cs137	222	Bq/Kg生	± 44.0	397	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	175	Bq/Kg生	± 35.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市勿来町 出蔵	2012年4月	Cs137	492	Bq/Kg生	± 98.0	882	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	390	Bq/Kg生	± 78.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市泉町	2012年4月	Cs137	408	Bq/Kg生	± 82.0	718	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	310	Bq/Kg生	± 62.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市渡辺町 田部	2012年4月	Cs137	57.4	Bq/Kg生	± 12.9	98.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	40.7	Bq/Kg生	± 9.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市高倉町 礼場	2012年4月	Cs137	393	Bq/Kg生	± 48.6	672	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	279	Bq/Kg生	± 31.3		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市田人町 黒田	2012年4月	Cs137	171	Bq/Kg生	± 35.0	173	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 25.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市田人町	2012年4月	Cs137	130	Bq/Kg生	± 28.0	243	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	113	Bq/Kg生	± 23.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市金山町	2012年4月	Cs137	616	Bq/Kg生	± 123	1,103	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	487	Bq/Kg生	± 97.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	121	Bq/Kg生	± 25.0	216	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	95.4	Bq/Kg生	± 19.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	245	Bq/Kg生	± 50.0	435	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	190	Bq/Kg生	± 38.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しいたけ	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	198	Bq/Kg生	± 30.7	336	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	138	Bq/Kg生	± 19.4		Cs134	8.0	Bq/Kg生
えのき茸	岩手県江刺	不明	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 3.0	4.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
干しシイタケ	いわき市田人町	2012年4月	Cs137	875	Bq/Kg生	± 177	1,614	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	739	Bq/Kg生	± 148		Cs134	6.0	Bq/Kg生
干しシイタケ (戻し)	いわき市田人町	2012年4月	Cs137	19.1	Bq/Kg生	± 5.1	40.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	21.6	Bq/Kg生	± 5.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
乾燥しいたけ	いわき市田人町 南大平	2012年4月	Cs137	1680	Bq/Kg生	± 340	3,010	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1330	Bq/Kg生	± 270		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市若葉台	2011年8月	Cs137	55.2	Bq/Kg生	± 12.0	97.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	42.5	Bq/Kg生	± 8.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市鹿島町 米田	2011年8月	Cs137	66.3	Bq/Kg生	± 14.3	113	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	46.7	Bq/Kg生	± 9.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市中央台 高久	2011年8月	Cs137	137	Bq/Kg生	± 28.0	252	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	115	Bq/Kg生	± 23.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
りんご	伊達市保原町	2011年10月	Cs137	30.8	Bq/Kg生	± 7.2	52.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	21.6	Bq/Kg生	± 5.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
オレンジ	いわき市常磐 上湯長谷	2012年3月	Cs137	83.2	Bq/Kg生	± 18.3	152	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	69.2	Bq/Kg生	± 14.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市桜ヶ丘	2012年2月	Cs137	11.9	Bq/Kg生	± 3.5	19.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.6	Bq/Kg生	± 2.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市常磐 上矢田町	2012年2月	Cs137	179	Bq/Kg生	± 28.3	282	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	103	Bq/Kg生	± 16.3		Cs134	8.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
夏みかん	いわき市平中塩	2012年4月	Cs137	95.3 Bq/Kg生	± 19.6 Bq/Kg生	173	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	77.9 Bq/Kg生	± 15.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
夏みかん	いわき市桜ヶ丘	2012年2月	Cs137	12.5 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	23.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.7 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
夏みかん	いわき市湘南台	2012年4月	Cs137	28.9 Bq/Kg生	± 9.3 Bq/Kg生	51.8	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	22.9 Bq/Kg生	± 6.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
キウイ	いわき市好間町大利	2011年12月	Cs137	32.5 Bq/Kg生	± 7.7 Bq/Kg生	54.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	22.4 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きんかん	いわき市平久保町	2012年1月	Cs137	7.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	12.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市泉もえぎ台	2011年12月	Cs137	70.0 Bq/Kg生	± 15.4 Bq/Kg生	128	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	57.9 Bq/Kg生	± 12.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市小名浜大原	2012年4月	Cs137	64.2 Bq/Kg生	± 14.4 Bq/Kg生	119	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	54.4 Bq/Kg生	± 11.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	福島市上野寺	2011年11月	Cs137	14.8 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	26.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.9 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市小川町下小川	2011年11月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	9.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
干し柿	いわき市泉もえぎ台	2011年11月	Cs137	15.7 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	27.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.4 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
干し柿	いわき市好間町下好間	2011年11月	Cs137	14.4 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生	24.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.1 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
干し柿	いわき市平赤井	2011年12月	Cs137	42.5 Bq/Kg生	± 9.6 Bq/Kg生	77.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	35.3 Bq/Kg生	± 7.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅	いわき市平久保町	2011年6月	Cs137	5.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅干し	和歌山県	不明	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅干し	いわき市小名浜岡小名	2011年6月	Cs137	64.2 Bq/Kg生	± 13.9 Bq/Kg生	117	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	52.4 Bq/Kg生	± 10.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	茨城県	不明	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	双葉郡檜葉町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	いわき市三和町	2011年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	いわき市平中山	2011年11月	Cs137	1.0 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	2.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
みそ	いわき市田人町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	いわき市沼部町金山	2010年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	不明	不明	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	いわき市平中神谷	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みそ	いわき市平川部町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
卵	新潟県北区	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
卵	いわき市小川町 上小川	2012年3月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 0.9 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
卵	いわき市小川町 上小川	2012年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
卵	いわき市沼部町 金山	2012年4月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いのしし	いわき市小川町	不明	Cs137	78.3 Bq/Kg生	± 16.5 Bq/Kg生	137	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	58.4 Bq/Kg生	± 12.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いのしし	いわき市三和町 下市萱	2012年4月	Cs137	31.7 Bq/Kg生	± 7.4 Bq/Kg生	59.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	28.1 Bq/Kg生	± 6.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いのしし	いわき市三和町 中寺	2012年4月	Cs137	41.6 Bq/Kg生	± 9.3 Bq/Kg生	72.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	30.9 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いのしし	いわき市三和町 中寺	2012年4月	Cs137	68.9 Bq/Kg生	± 14.6 Bq/Kg生	120	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	51.5 Bq/Kg生	± 10.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
豚挽肉	東白川郡 鮫川村	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
えごまメンチカツ	福島県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
和牛メンチカツ	福島県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
からあげ	福島県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
カレー(調理品)	不明	2012年4月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリージャム	いわき市鹿島町 米田	2011年8月	Cs137	57.6 Bq/Kg生	± 12.6 Bq/Kg生	108	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	50.0 Bq/Kg生	± 10.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市常磐	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たくあん	いわき市小名浜 金成	2011年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅シロップ	いわき市泉町 下川	2011年6月	Cs137	12.2 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	26.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	14.4 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かにかま フレーク	不明	2012年4月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かにかま スティック	不明	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
商品茶飲料	不明	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
牛乳	北海道	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
牛乳	北海道	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ヨーグルト	北海道	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たら・なめた (ミックス)	いわき市	2012年4月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
うなぎ	いわき市平 下大越	2012年4月	Cs137	287 Bq/Kg生	± 36.4 Bq/Kg生	464	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	177 Bq/Kg生	± 22.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もくずがに	いわき市夏井川	2012年4月	Cs137	34.0 Bq/Kg生	± 8.0 Bq/Kg生	69.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	35.7 Bq/Kg生	± 7.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市小名浜	2012年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市永崎	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	11.1 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	18.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市小名浜	2012年4月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 0.2 Bq/Kg生	6.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市小名浜	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
めかぶ	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
切り昆布	韓国	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
貝類 (ムサシ貝・シロ貝)	いわき市小名浜 下神白	2012年4月	Cs137	5.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	11.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ひじき	いわき市豊間 会磯	2012年4月	Cs137	15.0 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	20.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.2 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
アルカリイオン水	不明	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.1	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ミネラル ウォーター	富山県砺波市	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ミネラル ウォーター	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ピュアウォーター	不明	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水	不明	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水	いわき市	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水	いわき市遠野町 滝	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	北茨城市平潟市	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市 平上荒川	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市泉町 滝尻	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市四倉町 上仁井田	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
水道水	いわき市内郷 高野町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市内郷 高坂町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市内郷 小島町	2012年4月	Cs137	1.1 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生	1.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市内郷 宮町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市内郷	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市錦町	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	双葉郡楢葉町	2012年4月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生	2.8	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市四倉町 狐塚	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市平 上平窪	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
沢水	いわき市遠野町 入遠野	2011年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
湧水	東白川郡 鮫川村	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.1	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
湧水	いわき市三和町 合戸	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
湧水	いわき市川部町	2012年4月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生	1.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
雨水(貯槽)	いわき市 湘南台	2012年4月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	3.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
地下水	いわき市三和町 差塩	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
目ぐすりの木	いわき市小名浜	2011年10月	Cs137	481 Bq/Kg生	± 107 Bq/Kg生	898	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	417 Bq/Kg生	± 87.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
カヤ	いわき市泉 もえぎ台	2012年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	15.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	15.5 Bq/Kg生	± 11.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
おがくず	不明	2012年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	13.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	13.5 Bq/Kg生	± 11.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
堆肥(牛糞)	須賀川市	2012年4月	Cs137	97.0 Bq/Kg生	± 23.0 Bq/Kg生	170	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	73.0 Bq/Kg生	± 14.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
堆肥	いわき市泉 もえぎ台	2012年3月	Cs137	501 Bq/Kg生	± 60.0 Bq/Kg生	842	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	341 Bq/Kg生	± 38.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
灰	いわき市平才樋 小路	2012年4月	Cs137	3659.5 Bq/Kg生	± 333.0 Bq/Kg生	9076	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5416.4 Bq/Kg生	± 508.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
土壌	いわき市小川町 前原	2012年4月	Cs137	240 Bq/Kg乾	± 33.0 Bq/Kg乾	417	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	177 Bq/Kg乾	± 23.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
土壌	いわき市 下小川町前原	2012年4月	Cs137	371 Bq/Kg乾	± 46.0 Bq/Kg乾	583	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	212 Bq/Kg乾	± 27.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
土壌	いわき市平 下神谷	2012年4月	Cs137	408 Bq/Kg乾	± 48.0 Bq/Kg乾	692	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	284 Bq/Kg乾	± 31.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
土壌	いわき市平自由ヶ丘	2012年4月	Cs137	111	Bq/Kg乾	± 18.0	191	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	80.0	Bq/Kg乾	± 13.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市平谷川瀬	2012年4月	Cs137	161	Bq/Kg乾	± 27.0	270	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	109	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市平下平窪	2012年4月	Cs137	60.0	Bq/Kg乾	± 14.0	105	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	45.0	Bq/Kg乾	± 9.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市平下荒川	2012年4月	Cs137	379	Bq/Kg乾	± 47.0	644	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	265	Bq/Kg乾	± 30.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市中央台鹿島	2012年4月	Cs137	180	Bq/Kg乾	± 26.0	304	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	124	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市中央台高久	2012年4月	Cs137	808	Bq/Kg乾	± 87.0	1,355	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	547	Bq/Kg乾	± 56.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市内郷高坂町	2012年4月	Cs137	101	Bq/Kg乾	± 18.0	163	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	62.0	Bq/Kg乾	± 11.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市内郷綴町	2012年4月	Cs137	367	Bq/Kg乾	± 45.0	597	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	230	Bq/Kg乾	± 27.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市鹿島町走熊	2012年4月	Cs137	108	Bq/Kg乾	± 19.0	190	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	82.0	Bq/Kg乾	± 13.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市常磐上矢田町	2012年4月	Cs137	217	Bq/Kg乾	± 30.0	336	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	119	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市常磐関船町	2012年4月	Cs137	216	Bq/Kg乾	± 30.0	370	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	154	Bq/Kg乾	± 20.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	157	Bq/Kg乾	± 27.0	272	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	115	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉もえぎ台	2012年3月	Cs137	224	Bq/Kg乾	± 29.0	387	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	163	Bq/Kg乾	± 19.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市遠野町深山田	2012年4月	Cs137	52.0	Bq/Kg乾	± 14.0	95.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	43.0	Bq/Kg乾	± 9.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市勿来町窪田	2012年4月	Cs137	316	Bq/Kg乾	± 40.0	525	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	209	Bq/Kg乾	± 26.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市三和町中寺	2012年4月	Cs137	148	Bq/Kg乾	± 23.0	232	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	84.0	Bq/Kg乾	± 14.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市好間町北好間	2012年4月	Cs137	220	Bq/Kg乾	± 31.0	353	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	133	Bq/Kg乾	± 19.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平赤井	2012年4月	Cs137	252	Bq/Kg乾	± 35.0	421	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	169	Bq/Kg乾	± 22.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平赤井	2012年3月	Cs137	176	Bq/Kg乾	± 24.0	300	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	124	Bq/Kg乾	± 16.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平赤井	2012年3月	Cs137	48.0	Bq/Kg乾	± 12.0	84.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	36.0	Bq/Kg乾	± 8.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平下平窪	2012年4月	Cs137	668	Bq/Kg乾	± 72.0	1,133	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	465	Bq/Kg乾	± 48.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平下平窪	2012年4月	Cs137	63.0	Bq/Kg乾	± 14.0	109	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	46.0	Bq/Kg乾	± 10.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平下高久	2012年4月	Cs137	516	Bq/Kg乾	± 60.0	904	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	388	Bq/Kg乾	± 40.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平下高久	2012年4月	Cs137	265	Bq/Kg乾	± 35.0	438	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	173	Bq/Kg乾	± 21.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
畑土	いわき市平下高久	2012年4月	Cs137	179	Bq/Kg乾	± 25.0	285	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	106	Bq/Kg乾	± 15.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平下高久	2012年4月	Cs137	212	Bq/Kg乾	± 31.0	382	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	170	Bq/Kg乾	± 21.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平北白土	2012年4月	Cs137	207	Bq/Kg乾	± 29.0	360	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	153	Bq/Kg乾	± 20.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平北白土	2012年4月	Cs137	218	Bq/Kg乾	± 30.0	380	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	162	Bq/Kg乾	± 21.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平藤間	2012年4月	Cs137	114	Bq/Kg乾	± 19.0	181	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	67.0	Bq/Kg乾	± 11.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平沼ノ内	2012年4月	Cs137	245	Bq/Kg乾	± 32.0	386	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	141	Bq/Kg乾	± 19.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市中央台高久	2012年4月	Cs137	40.0	Bq/Kg乾	± 10.0	67.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	27.0	Bq/Kg乾	± 8.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市中央台高久	2012年4月	Cs137	801	Bq/Kg乾	± 86.0	1,310	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	509	Bq/Kg乾	± 53.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市中央台飯野	2012年4月	Cs137	228	Bq/Kg乾	± 32.0	400	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	172	Bq/Kg乾	± 22.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市内郷高野町	2012年4月	Cs137	178	Bq/Kg乾	± 26.0	303	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	125	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市内郷宮町	2012年4月	Cs137	262	Bq/Kg乾	± 34.0	425	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	163	Bq/Kg乾	± 21.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市小名浜岡小名	2012年4月	Cs137	79.0	Bq/Kg乾	± 15.0	133	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	54.0	Bq/Kg乾	± 10.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市小名浜住吉	2012年4月	Cs137	100	Bq/Kg乾	± 18.0	155	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	55.0	Bq/Kg乾	± 11.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市小名浜住吉	2012年4月	Cs137	66.0	Bq/Kg乾	± 14.0	102	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	36.0	Bq/Kg乾	± 8.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	202	Bq/Kg乾	± 28.0	317	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	115	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市小名浜上神白	2012年4月	Cs137	81.0	Bq/Kg乾	± 15.0	137	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	56.0	Bq/Kg乾	± 10.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市常磐西郷町	2012年4月	Cs137	82.0	Bq/Kg乾	± 17.0	143	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	61.0	Bq/Kg乾	± 11.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市常磐三沢町	2012年3月	Cs137	201	Bq/Kg乾	± 28.0	330	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	129	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市泉もえぎ台	2012年3月	Cs137	105	Bq/Kg乾	± 17.0	177	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	72.0	Bq/Kg乾	± 11.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市泉玉露	2012年4月	Cs137	128	Bq/Kg乾	± 21.0	220	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	92.0	Bq/Kg乾	± 14.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市山田町	2012年4月	Cs137	190	Bq/Kg乾	± 42.0	306	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	116	Bq/Kg乾	± 26.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市勿来町白米	2012年4月	Cs137	328	Bq/Kg乾	± 42.0	543	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	215	Bq/Kg乾	± 26.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
水田	いわき市三和町中寺	2012年4月	Cs137	149	Bq/Kg乾	± 24.0	258	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	109	Bq/Kg乾	± 15.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
水田	いわき市平馬目	2012年4月	Cs137	395	Bq/Kg乾	± 49.0	654	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	259	Bq/Kg乾	± 30.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾