



2012年5月の放射能測定結果 302件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|------|--------------|----------|-------|------------|--------------|-----|--------|------------|--|
| 玄米 | 宮城県栗原市 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | 宮城県東松島市 | 2011年10月 | Cs137 | 2.2 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 4.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.0 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | 福井県 | 2011年10月 | Cs137 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | 3.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | 福島市 | 2011年10月 | Cs137 | 2.8 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | 6.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.0 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | 双葉郡楢葉町 | 2010年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | 石川郡石川町 | 2011年10月 | Cs137 | 5.6 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 5.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | いわき市平 今新田 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | いわき市鹿島町 | 2011年10月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | 5.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.1 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | いわき市鹿島町 | 2011年10月 | Cs137 | 3.1 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 3.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | いわき市 | 2011年10月 | Cs137 | 5.7 Bq/Kg生 | ± 2.6 Bq/Kg生 | 8.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.9 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | いわき市 | 2011年10月 | Cs137 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 6.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 玄米 | 不明 | 2011年10月 | Cs137 | 4.2 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 6.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 北海道 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.4 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 北海道 | 2012年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.0 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 北海道 | 2012年10月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 2.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 秋田県 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.9 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 秋田県 | 2011年10月 | Cs137 | 3.0 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | 3.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 山形県 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|------|-----------|----------|-------|------------|--------------|-----|--------|------------|--|
| 白米 | 宮城県伊具郡丸森町 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 新潟県 | 2011年11月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 三重県 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 栃木県 | 2011年10月 | Cs137 | 2.9 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 5.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.2 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 茨城県 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 茨城県 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 茨城県 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 茨城県那珂郡那珂町 | 2011年10月 | Cs137 | 2.3 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | 5.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 福島県 | 2010年10月 | Cs137 | 2.1 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 2.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 福島市 | 2011年10月 | Cs137 | 2.9 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 5.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.3 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 南会津郡只見町 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 会津 | 不明 | Cs137 | 2.8 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 2.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 会津 | 不明 | Cs137 | 2.8 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 2.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 須賀川市 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 田村郡小野町 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 石川郡石川町 | 2011年10月 | Cs137 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | 2.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市三和町合戸 | 2011年10月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 5.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.4 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市小川町 | 2011年11月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市平上平窪 | 2011年10月 | Cs137 | 3.4 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 5.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.3 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市平絹谷 | 2011年10月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | 2.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市平中塩 | 2011年10月 | Cs137 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 3.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市四倉町細谷 | 2011年11月 | Cs137 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | 5.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.3 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市好間町 | 2011年10月 | Cs137 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 3.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市鹿島町 | 2011年10月 | Cs137 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 6.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|-------|------------|----------|-------|------------|--------------|------|--------|------------|--|
| 白米 | いわき市鹿島町 | 2011年11月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.9 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市常磐水野谷町 | 2011年10月 | Cs137 | 5.5 Bq/Kg生 | ± 2.7 Bq/Kg生 | 8.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.1 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市高倉町礼場 | 2011年11月 | Cs137 | 6.4 Bq/Kg生 | ± 2.8 Bq/Kg生 | 13.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 6.9 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市泉町 | 2011年10月 | Cs137 | 2.2 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 4.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.0 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市泉町本谷 | 2011年10月 | Cs137 | 1.8 Bq/Kg生 | ± 1.5 Bq/Kg生 | 3.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.0 Bq/Kg生 | ± 1.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市沼部町 | 2011年10月 | Cs137 | 3.8 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 3.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市遠野町 | 2011年10月 | Cs137 | 4.3 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 4.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市山田町 | 2011年10月 | Cs137 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 3.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市山田町 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市山田町 | 2011年11月 | Cs137 | 4.4 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | 8.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.8 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市 | 不明 | Cs137 | 3.0 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 6.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市 | 2011年10月 | Cs137 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 3.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 不明 | 2011年10月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 2.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | 不明 | 不明 | Cs137 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 3.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市泉町本谷 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 白米 | いわき市山田町 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 洗白米 | いわき市三沢町 | 2011年10月 | Cs137 | 2.2 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 2.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 洗白米 | いわき市三沢町 | 2011年10月 | Cs137 | 2.2 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 2.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| もち米 | 田村郡小野町 | 2011年10月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 1.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.8 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| もち米 | いわき市平赤井 | 2011年10月 | Cs137 | 4.6 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 8.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| もち米 | 秋田県 | 2011年10月 | Cs137 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 6.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 炒飯米 | 宮城県角田市 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| じゃがいも | いわき市好間町上好間 | 2011年7月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|-------|----------------|----------|-------|------------|--------------|------|--------|------------|--|
| じゃがいも | いわき市四倉町 狐塚 | 2011年7月 | Cs137 | 7.8 Bq/Kg生 | ± 2.9 Bq/Kg生 | 11.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市好間町 上好間 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市平 幕の内 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市平 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.6 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市平 赤井 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市平 下大越 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市平 下荒川 | 2012年5月 | Cs137 | 3.1 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | 3.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市小名浜 下神白 | 2011年5月 | Cs137 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 2.8 Bq/Kg生 | 3.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市小名浜 下神白 | 2011年5月 | Cs137 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 2.8 Bq/Kg生 | 3.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たまねぎ | いわき市山田町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 葉たまねぎ | いわき市四倉町 狐塚 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 4.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.3 Bq/Kg生 | ± 3.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ねぎ | いわき市大久町 大久保 | 2012年5月 | Cs137 | 4.5 Bq/Kg生 | ± 3.9 Bq/Kg生 | 4.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ねぎ | いわき市平 中塩 | 2011年10月 | Cs137 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 2.6 Bq/Kg生 | 3.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ねぎ | いわき市平菅波 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ねぎ | いわき市鹿島町 | 2012年5月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | 2.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ねぎ | いわき市小名浜 岡小名 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ねぎ | いわき市遠野町 深山田 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| らっきょう | いわき市大久町 陣場 | 2012年5月 | Cs137 | 4.3 Bq/Kg生 | ± 2.7 Bq/Kg生 | 7.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.3 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| みょうが | いわき市沼部町 | 2012年5月 | Cs137 | 7.1 Bq/Kg生 | ± 3.9 Bq/Kg生 | 11.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.0 Bq/Kg生 | ± 3.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| みょうが | いわき市大久町 大久 | 2012年5月 | Cs137 | 5.8 Bq/Kg生 | ± 4.1 Bq/Kg生 | 9.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.8 Bq/Kg生 | ± 3.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 大根 | いわき市平 下荒川 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 大根 | いわき市小名浜 下神白 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 大根 | いわき市小名浜 岡小名 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 大根 | いわき市小名浜 上神白 | 2012年5月 | Cs137 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | 3.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|--------------|----------------|---------|-------|------------|--------------|------|--------|------------|------------|
| 大根 | いわき市常磐 上矢田町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| かぶ | いわき市平 下荒川 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| かぶ | いわき市鹿島町 上蔵持 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| かぶ | いわき市泉町 下川 | 2012年5月 | Cs137 | 5.6 Bq/Kg生 | ± 3.5 Bq/Kg生 | 5.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| 赤カブ | いわき市小名浜 島 | 2012年5月 | Cs137 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 2.9 Bq/Kg生 | 3.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市好間町 下好間 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市平 下大越 | 2012年5月 | Cs137 | 5.6 Bq/Kg生 | ± 4.7 Bq/Kg生 | 5.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市平 自由が丘 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市平菅波 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市平 下荒川 | 2012年5月 | Cs137 | 5.5 Bq/Kg生 | ± 5.3 Bq/Kg生 | 5.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市小名浜 下神白 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市小名浜 岡小名 | 2012年5月 | Cs137 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 3.1 Bq/Kg生 | 3.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | いわき市渡辺町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ | 不明 | 不明 | Cs137 | 2.1 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | 4.5 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 4.7 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg生 |
| キャベツ(茹 で) | 不明 | 不明 | Cs137 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 4.4 Bq/Kg生 | 5.0 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.6 Bq/Kg生 | ± 4.4 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg生 |
| アスパラ | いわき市川前町 | 2012年5月 | Cs137 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 2.5 Bq/Kg生 | 7.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| アスパラ | いわき市好間町 上好間 | 2012年5月 | Cs137 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 2.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| ブロッコリー | いわき市小名浜 上神白 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| ブロッコリー | 不明 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| にら | 福島県大久町 大久保 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 4.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.4 Bq/Kg生 | ± 4.3 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| にら | いわき市渡辺町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| にら | いわき市小名浜 大原 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |
| にら | いわき市三和町 下永井 | 2012年5月 | Cs137 | 5.3 Bq/Kg生 | ± 3.6 Bq/Kg生 | 14.1 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 8.8 Bq/Kg生 | ± 7.8 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg生 |
| にら | いわき市平 下大越 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|----------|----------------|---------|-------|-------------|---------------|------|--------|------------|--|
| にら | いわき市山田町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| にら | いわき市小名浜 岡小名 | 2012年5月 | Cs137 | 2.0 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | 2.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ビタミン菜 | いわき市四倉 狐塚 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.8 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | いわき市四倉町 狐塚 | 2012年5月 | Cs137 | 3.8 Bq/Kg生 | ± 3.2 Bq/Kg生 | 6.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 2.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | いわき市常磐 水野谷町 | 2012年5月 | Cs137 | 5.8 Bq/Kg生 | ± 3.5 Bq/Kg生 | 5.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | いわき市常磐 上矢田町 | 2012年5月 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | ± 4.9 Bq/Kg生 | 5.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | いわき市鹿島町 | 2012年5月 | Cs137 | 4.0 Bq/Kg生 | ± 3.0 Bq/Kg生 | 8.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.8 Bq/Kg生 | ± 2.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | いわき市小名浜 島 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | いわき市泉町 下川 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | 不明 | 不明 | Cs137 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 2.9 Bq/Kg生 | 6.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.6 Bq/Kg生 | ± 2.5 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 小松菜 | 不明 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 4.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.0 Bq/Kg生 | ± 3.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ほうれん草 | いわき市四倉 狐塚 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ほうれん草 | いわき市小名浜 島 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ほうれん草 | いわき市小名浜 岡小名 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ほうれん草 | 不明 | 不明 | Cs137 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 6.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.4 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 明日葉 | 郡山市柏山 | 2012年4月 | Cs137 | 3.8 Bq/Kg生 | ± 2.5 Bq/Kg生 | 7.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 三つ葉 | いわき市小名浜 下神白 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 青唐辛子 | いわき市泉町 下川 | 2011年9月 | Cs137 | 3.1 Bq/Kg生 | ± 2.3 Bq/Kg生 | 5.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.1 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| アップルミント | いわき市小名浜 下神白 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 5.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 5.6 Bq/Kg生 | ± 4.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| スナップエンドウ | いわき市好間町 小谷作 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 3.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| スナップエンドウ | いわき市小名浜 上神白 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| スナップエンドウ | いわき市山田町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 5.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 5.5 Bq/Kg生 | ± 3.5 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | 双葉郡檜葉町 | 2012年5月 | Cs137 | 99.5 Bq/Kg生 | ± 21.6 Bq/Kg生 | 164 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 64.1 Bq/Kg生 | ± 13.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | いわき市川前町 | 2012年5月 | Cs137 | 33.6 Bq/Kg生 | ± 9.3 Bq/Kg生 | 70.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 37.0 Bq/Kg生 | ± 8.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|--------|----------------|---------|-------|-------------|---------------|------|--------|------------|--|
| ふき | いわき市好間町 小谷作 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 2.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | いわき市平 北白土 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | いわき市内郷 御台境町 | 不明 | Cs137 | 7.2 Bq/Kg生 | ± 4.7 Bq/Kg生 | 11.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.6 Bq/Kg生 | ± 3.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | いわき市山田町 | 2012年5月 | Cs137 | 5.5 Bq/Kg生 | ± 3.9 Bq/Kg生 | 5.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | いわき市田人町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | いわき市田人町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 5.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 5.1 Bq/Kg生 | ± 3.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき | いわき市勿来町 白米 | 2012年5月 | Cs137 | 10.1 Bq/Kg生 | ± 5.9 Bq/Kg生 | 26.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 16.1 Bq/Kg生 | ± 5.5 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき(茹で) | いわき市小川町 柴原 | 2012年5月 | Cs137 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 2.7 Bq/Kg生 | 3.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき(茹で) | いわき市平 下山口 | 2012年5月 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | ± 2.6 Bq/Kg生 | 12.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 5.7 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき(茹で) | いわき市小名浜 元屋敷 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.6 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき(茹で) | いわき市小名浜 金成 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.9 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふき(茹で) | いわき市田人町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.9 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ふきのとう | 岩瀬郡天栄村 | 2012年4月 | Cs137 | 14.1 Bq/Kg生 | ± 6.7 Bq/Kg生 | 32.0 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 17.9 Bq/Kg生 | ± 9.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| うど | いわき市川前町 志田名 | 2012年5月 | Cs137 | 73.5 Bq/Kg生 | ± 16.4 Bq/Kg生 | 121 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 47.8 Bq/Kg生 | ± 10.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| うど | いわき市四倉町 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| うど | いわき市四倉町 狐塚 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 5.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 5.7 Bq/Kg生 | ± 5.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| うど | いわき市三和町 合戸 | 2012年5月 | Cs137 | 5.2 Bq/Kg生 | ± 2.8 Bq/Kg生 | 5.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| うど | いわき市泉町 下川 | 2012年5月 | Cs137 | 3.0 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 5.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.2 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | 北茨城市関本町 | 2012年5月 | Cs137 | 4.7 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 7.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | 東白河郡 鮫川村 | 2012年5月 | Cs137 | 67.3 Bq/Kg生 | ± 16.3 Bq/Kg生 | 139 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 71.6 Bq/Kg生 | ± 15.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | 東白河郡 鮫川村越虫 | 2012年5月 | Cs137 | 45.4 Bq/Kg生 | ± 10.2 Bq/Kg生 | 78.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 33.1 Bq/Kg生 | ± 7.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | 双葉郡楡葉町 井出 | 2015年5月 | Cs137 | 105 Bq/Kg生 | ± 7.0 Bq/Kg生 | 181 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 75.6 Bq/Kg生 | ± 6.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | いわき市三和町 合戸 | 2012年5月 | Cs137 | 5.6 Bq/Kg生 | ± 3.8 Bq/Kg生 | 9.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 3.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | いわき市三和町 | 2012年5月 | Cs137 | 184 Bq/Kg生 | ± 38.0 Bq/Kg生 | 322 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 138 Bq/Kg生 | ± 28.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|--------------|-------------------|---------|-------|-------------|---------------|------|--------|------------|--|
| タラの芽 | いわき市小名浜島 | 2012年5月 | Cs137 | 8.7 Bq/Kg生 | ± 5.3 Bq/Kg生 | 14.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 6.2 Bq/Kg生 | ± 4.5 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | いわき市小名浜島 | 2012年5月 | Cs137 | 8.7 Bq/Kg生 | ± 5.3 Bq/Kg生 | 14.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 6.2 Bq/Kg生 | ± 4.5 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | いわき市遠野町 | 2012年5月 | Cs137 | 7.7 Bq/Kg生 | ± 4.0 Bq/Kg生 | 14.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 6.3 Bq/Kg生 | ± 3.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | いわき市遠野町 | 2012年4月 | Cs137 | 58.5 Bq/Kg生 | ± 14.0 Bq/Kg生 | 116 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 57.2 Bq/Kg生 | ± 12.5 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | いわき市田人町 | 2012年4月 | Cs137 | 138 Bq/Kg生 | ± 30.0 Bq/Kg生 | 247 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 109 Bq/Kg生 | ± 23.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| タラの芽 | いわき市勿来町 | 2012年4月 | Cs137 | 61.7 Bq/Kg生 | ± 13.4 Bq/Kg生 | 107 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 45.5 Bq/Kg生 | ± 9.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | 東白川郡 鮫川村越虫 | 2012年5月 | Cs137 | 3.9 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | 7.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | 東白川郡 鮫川村 | 2012年5月 | Cs137 | 24.4 Bq/Kg生 | ± 6.7 Bq/Kg生 | 44.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 19.6 Bq/Kg生 | ± 5.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市三和町 | 2012年5月 | Cs137 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 2.5 Bq/Kg生 | 6.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市三和町 | 2012年5月 | Cs137 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 2.5 Bq/Kg生 | 6.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市川前町 志田名 | 2012年5月 | Cs137 | 126 Bq/Kg生 | ± 27.0 Bq/Kg生 | 231 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 105 Bq/Kg生 | ± 21.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市好間町 北好間 | 2012年4月 | Cs137 | 10.6 Bq/Kg生 | ± 4.5 Bq/Kg生 | 20.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 10.2 Bq/Kg生 | ± 3.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市泉町 下川 | 2012年5月 | Cs137 | 12.6 Bq/Kg生 | ± 4.0 Bq/Kg生 | 21.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 9.2 Bq/Kg生 | ± 3.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市植田町 | 2012年4月 | Cs137 | 9.5 Bq/Kg生 | ± 3.3 Bq/Kg生 | 15.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市山田町 | 2012年5月 | Cs137 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 3.5 Bq/Kg生 | 3.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市遠野町 | 2012年4月 | Cs137 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 6.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市遠野町 | 2012年4月 | Cs137 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | 6.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび | いわき市田人町 旅人 | 2012年5月 | Cs137 | 58.6 Bq/Kg生 | ± 13.8 Bq/Kg生 | 104 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 45.0 Bq/Kg生 | ± 10.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび(茹で) | いわき市三和町 下永井(上) | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.6 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび(茹で) | いわき市三和町 下永井(下) | 2012年5月 | Cs137 | 4.1 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 4.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび(茹で) | いわき市永崎 | 2012年5月 | Cs137 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | 5.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| わらび (塩漬け) | いわき市 | 2008年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 2.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 2.7 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| しどき | いわき市遠野町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| コゴミ | 南会津郡 只見町 | 2012年5月 | Cs137 | 59.0 Bq/Kg生 | ± 14.1 Bq/Kg生 | 63.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 51.0 Bq/Kg生 | ± 11.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|-------|----------------|---------|-------|-------------|---------------|-------|--------|------------|--|
| こしあぶら | いわき市三和町 差塩 | 2012年5月 | Cs137 | 105 Bq/Kg生 | ± 23.0 Bq/Kg生 | 190 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 84.6 Bq/Kg生 | ± 17.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | 双葉郡富岡町 | 2012年5月 | Cs137 | 31.2 Bq/Kg生 | ± 7.9 Bq/Kg生 | 56.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 25.1 Bq/Kg生 | ± 6.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | 双葉郡楢葉町 井出 | 2012年5月 | Cs137 | 190 Bq/Kg生 | ± 38.0 Bq/Kg生 | 331 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 141 Bq/Kg生 | ± 28.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市小川町 柴原 | 2012年5月 | Cs137 | 4.5 Bq/Kg生 | ± 2.5 Bq/Kg生 | 7.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.4 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市好間町 川中子 | 2012年5月 | Cs137 | 11.4 Bq/Kg生 | ± 4.5 Bq/Kg生 | 23.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 11.6 Bq/Kg生 | ± 3.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市四倉町 駒込 | 2012年4月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 2.5 Bq/Kg生 | 6.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 2.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市平 下山口 | 2012年5月 | Cs137 | 74.6 Bq/Kg生 | ± 16.4 Bq/Kg生 | 135.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 60.7 Bq/Kg生 | ± 12.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市平 菅波 | 2012年5月 | Cs137 | 94.5 Bq/Kg生 | ± 20.3 Bq/Kg生 | 163 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 68.7 Bq/Kg生 | ± 14.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市平 幕の内 | 2012年5月 | Cs137 | 28.9 Bq/Kg生 | ± 7.4 Bq/Kg生 | 49.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 20.7 Bq/Kg生 | ± 5.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市平 六人町 | 2012年5月 | Cs137 | 22.3 Bq/Kg生 | ± 6.2 Bq/Kg生 | 37.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 14.8 Bq/Kg生 | ± 4.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市平谷川瀬 | 2012年4月 | Cs137 | 42.5 Bq/Kg生 | ± 10.9 Bq/Kg生 | 75.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 32.8 Bq/Kg生 | ± 7.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市常磐 | 2012年5月 | Cs137 | 47.2 Bq/Kg生 | ± 11.0 Bq/Kg生 | 87.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 40.4 Bq/Kg生 | ± 8.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市常磐 湯本町 | 2012年5月 | Cs137 | 15.3 Bq/Kg生 | ± 4.5 Bq/Kg生 | 31.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 16.4 Bq/Kg生 | ± 4.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市常磐 上湯長谷 | 2012年5月 | Cs137 | 14.0 Bq/Kg生 | ± 4.3 Bq/Kg生 | 25.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 11.0 Bq/Kg生 | ± 3.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市鹿島町 御代 | 2012年4月 | Cs137 | 4.3 Bq/Kg生 | ± 9.5 Bq/Kg生 | 8.8 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 4.5 Bq/Kg生 | ± 5.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市鹿島町 御代 | 2012年4月 | Cs137 | 15.9 Bq/Kg生 | ± 4.2 Bq/Kg生 | 24.7 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 8.8 Bq/Kg生 | ± 5.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市小名浜 野田 | 2012年4月 | Cs137 | 112 Bq/Kg生 | ± 24.0 Bq/Kg生 | 196 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 83.7 Bq/Kg生 | ± 17.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市小名浜 岡小名 | 2012年5月 | Cs137 | 21.0 Bq/Kg生 | ± 6.3 Bq/Kg生 | 41.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 20.6 Bq/Kg生 | ± 5.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市小名浜 下神白 | 2012年5月 | Cs137 | 107 Bq/Kg生 | ± 22.0 Bq/Kg生 | 196 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 89.1 Bq/Kg生 | ± 17.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市沼部町 金山 | 2012年5月 | Cs137 | 54.5 Bq/Kg生 | ± 12.3 Bq/Kg生 | 91.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 36.5 Bq/Kg生 | ± 8.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市高倉町 礼場 | 2012年4月 | Cs137 | 6.6 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 9.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.2 Bq/Kg生 | ± 1.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市小浜町 | 2012年5月 | Cs137 | 69.3 Bq/Kg生 | ± 15.4 Bq/Kg生 | 125 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 55.7 Bq/Kg生 | ± 11.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市泉町 下川 | 2012年5月 | Cs137 | 41.9 Bq/Kg生 | ± 9.5 Bq/Kg生 | 69.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 27.7 Bq/Kg生 | ± 6.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市泉町 本谷 | 2012年4月 | Cs137 | 17.8 Bq/Kg生 | ± 4.6 Bq/Kg生 | 30.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 12.6 Bq/Kg生 | ± 3.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|--------------|----------------|----------|-------|-------------|---------------|------|--------|------------|--|
| たけのこ | いわき市山玉町 | 2012年4月 | Cs137 | 45.1 Bq/Kg生 | ± 10.4 Bq/Kg生 | 83.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 38.6 Bq/Kg生 | ± 8.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市渡辺町 | 2012年5月 | Cs137 | 40.1 Bq/Kg生 | ± 9.6 Bq/Kg生 | 70.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 30.2 Bq/Kg生 | ± 7.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市渡辺町 釜戸 | 2012年5月 | Cs137 | 30.0 Bq/Kg生 | ± 7.5 Bq/Kg生 | 54.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 24.4 Bq/Kg生 | ± 5.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市山田町 | 2012年5月 | Cs137 | 22.3 Bq/Kg生 | ± 6.6 Bq/Kg生 | 44.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 21.9 Bq/Kg生 | ± 5.5 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市勿来町 出蔵 | 2012年5月 | Cs137 | 57.7 Bq/Kg生 | ± 12.6 Bq/Kg生 | 99.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 42.2 Bq/Kg生 | ± 9.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ | いわき市勿来町 白米 | 2012年5月 | Cs137 | 54.7 Bq/Kg生 | ± 12.5 Bq/Kg生 | 99.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 44.5 Bq/Kg生 | ± 9.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | 茨城県 | 2012年5月 | Cs137 | 19.5 Bq/Kg生 | ± 5.1 Bq/Kg生 | 32.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 12.5 Bq/Kg生 | ± 3.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | 茨城県 | 2012年5月 | Cs137 | 19.5 Bq/Kg生 | ± 5.1 Bq/Kg生 | 32.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 12.5 Bq/Kg生 | ± 3.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | 田村郡大越町 | 2012年5月 | Cs137 | 13.8 Bq/Kg生 | ± 4.1 Bq/Kg生 | 17.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市平 六人町 | 2012年5月 | Cs137 | 13.4 Bq/Kg生 | ± 3.9 Bq/Kg生 | 24.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 11.4 Bq/Kg生 | ± 3.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市平 下山口 | 2012年5月 | Cs137 | 41.2 Bq/Kg生 | ± 9.3 Bq/Kg生 | 73.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 32.0 Bq/Kg生 | ± 6.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市内郷 高野町 | 2012年5月 | Cs137 | 72.7 Bq/Kg生 | ± 15.6 Bq/Kg生 | 134 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 60.9 Bq/Kg生 | ± 12.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市常磐 | 2012年4月 | Cs137 | 16.0 Bq/Kg生 | ± 4.3 Bq/Kg生 | 26.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 10.2 Bq/Kg生 | ± 2.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市常磐 上湯長谷 | 2012年5月 | Cs137 | 4.2 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | 11.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 7.3 Bq/Kg生 | ± 2.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市永崎 | 2012年5月 | Cs137 | 36.5 Bq/Kg生 | ± 8.6 Bq/Kg生 | 60.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 24.4 Bq/Kg生 | ± 5.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市小名浜 金成 | 2012年5月 | Cs137 | 59.3 Bq/Kg生 | ± 13.0 Bq/Kg生 | 112 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 52.5 Bq/Kg生 | ± 10.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市添野町 | 不明 | Cs137 | 11.6 Bq/Kg生 | ± 3.6 Bq/Kg生 | 15.3 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.7 Bq/Kg生 | ± 2.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市沼部町 金山 | 2012年5月 | Cs137 | 12.5 Bq/Kg生 | ± 3.7 Bq/Kg生 | 24.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 11.9 Bq/Kg生 | ± 3.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たけのこ (茹で) | いわき市山玉町 | 2012年4月 | Cs137 | 22.2 Bq/Kg生 | ± 5.5 Bq/Kg生 | 38.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 15.8 Bq/Kg生 | ± 3.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| あずき | いわき市内郷 高坂町 | 2011年8月 | Cs137 | 6.4 Bq/Kg生 | ± 3.3 Bq/Kg生 | 10.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.6 Bq/Kg生 | ± 2.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 黒大豆 | いわき市田人町 | 2011年12月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| しいたけ | 東白川郡 鮫川村 | 2012年4月 | Cs137 | 108 Bq/Kg生 | ± 23.0 Bq/Kg生 | 195 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 87.2 Bq/Kg生 | ± 17.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| しいたけ | いわき市三和町 合戸 | 2012年5月 | Cs137 | 81.9 Bq/Kg生 | ± 17.2 Bq/Kg生 | 141 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 58.9 Bq/Kg生 | ± 12.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| しいたけ | いわき市鹿島町 下矢田 | 2012年5月 | Cs137 | 205 Bq/Kg生 | ± 42.0 Bq/Kg生 | 354 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 149 Bq/Kg生 | ± 30.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|-----------------|------------------|----------|-------|-------------|---------------|-------|--------|------------|--|
| しいたけ | いわき市小名浜 | 2012年4月 | Cs137 | 477 Bq/Kg生 | ± 95.0 Bq/Kg生 | 844 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 367 Bq/Kg生 | ± 73.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| しいたけ | いわき市山田町 | 2012年4月 | Cs137 | 46.4 Bq/Kg生 | ± 10.5 Bq/Kg生 | 83.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 36.8 Bq/Kg生 | ± 8.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| しいたけ | いわき市田人町 荷路夫花戸 | 2012年4月 | Cs137 | 88.7 Bq/Kg生 | ± 18.4 Bq/Kg生 | 155 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 66.4 Bq/Kg生 | ± 13.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 干しいたけ | いわき市常磐 白鳥町 | 2012年3月 | Cs137 | 1150 Bq/Kg生 | ± 230 Bq/Kg生 | 2,052 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 902 Bq/Kg生 | ± 180 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ゆず | いわき市沼部町 | 2012年4月 | Cs137 | 183 Bq/Kg生 | ± 37.0 Bq/Kg生 | 323 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 140 Bq/Kg生 | ± 28.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 干し柿 | 双葉郡榎葉町 井出 | 2011年10月 | Cs137 | 360 Bq/Kg生 | ± 72.0 Bq/Kg生 | 638 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 278 Bq/Kg生 | ± 56.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| イチゴ | いわきさくらんぼ 保育園 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 3.5 | Cs137 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 3.5 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | | Cs134 | 4.0 Bq/Kg生 | |
| たなご | いわき市 永崎 | 2012年5月 | Cs137 | 34.5 Bq/Kg生 | ± 8.5 Bq/Kg生 | 64.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 30.4 Bq/Kg生 | ± 7.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たなご | いわき市 小名浜 | 2012年5月 | Cs137 | 39.3 Bq/Kg生 | ± 9.0 Bq/Kg生 | 67.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 28.5 Bq/Kg生 | ± 6.4 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| たなご (骨・内臓あり) | いわき市 小名浜 | 2012年5月 | Cs137 | 30.9 Bq/Kg生 | ± 7.4 Bq/Kg生 | 53.4 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 22.5 Bq/Kg生 | ± 5.2 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 生ひじき | いわき市豊間 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| ひじき(茹で) | いわき市豊間 | 2012年4月 | Cs137 | 15.0 Bq/Kg生 | ± 4.9 Bq/Kg生 | 20.2 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 5.2 Bq/Kg生 | ± 3.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 鶏卵 | 双葉郡 川内村 | 不明 | Cs137 | 2.3 Bq/Kg生 | ± 2.1 Bq/Kg生 | 4.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.8 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 母乳 | いわき市小名浜 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 梅干し | いわき市山田町 | 2011年6月 | Cs137 | 49.5 Bq/Kg生 | ± 10.9 Bq/Kg生 | 96.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 47.2 Bq/Kg生 | ± 9.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 唐辛子味噌 | いわき市泉町 下川 | 2011年9月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| はちみつ | 福島県大久町 大久 | 2011年11月 | Cs137 | 9.3 Bq/Kg生 | ± 3.5 Bq/Kg生 | 23.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 13.8 Bq/Kg生 | ± 3.6 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| はちみつ | いわき市四倉町 | 2012年5月 | Cs137 | 15.1 Bq/Kg生 | ± 4.0 Bq/Kg生 | 25.1 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 10.0 Bq/Kg生 | ± 2.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| はちみつ | いわき市平 赤井 | 2012年5月 | Cs137 | 3.4 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | 4.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.5 Bq/Kg生 | ± 1.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| みそ | 南相馬市 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| みそ | 双葉郡 川内村 | 2011年12月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 1.8 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.8 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| みそ | いわき市平 中山 | 2012年1月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 給食 | いわき市内郷 | 2012年5月 | Cs137 | 1.9 Bq/Kg生 | ± 1.8 Bq/Kg生 | 1.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 給食 | いわき市内郷 | 2012年5月 | Cs137 | 2.5 Bq/Kg生 | ± 1.9 Bq/Kg生 | 2.5 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|-------|---------------|---------|-------|-------------|---------------|-------|--------|------------|--|
| 給食 | いわき市常磐 | 2012年5月 | Cs137 | 1.7 Bq/Kg生 | ± 1.6 Bq/Kg生 | 1.7 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 菊芋茶 | 不明 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 伏流水 | いわき市田人町 旅人 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 湧水 | 双葉郡楢葉町 井出 | 2012年4月 | Cs137 | 1.1 Bq/Kg生 | ± 1.0 Bq/Kg生 | 1.1 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 湧水 | 石川郡 古殿町 | 2012年4月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 1.7 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.7 Bq/Kg生 | ± 1.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 商品水 | 大分県日田 天領水 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 1.0 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.0 Bq/Kg生 | ± 0.9 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 商品水 | 鹿児島県 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 商品水 | 鹿児島県 屋久島 | 不明 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 水道水 | いわき市常磐 西郷町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 1.2 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.2 Bq/Kg生 | ± 1.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 簡易水道水 | いわき市田人町 黒田 | 2012年5月 | Cs137 | 0.9 Bq/Kg生 | ± 0.9 Bq/Kg生 | 0.9 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 井戸水 | いわき市平 赤井 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 1.9 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 1.9 Bq/Kg生 | ± 1.7 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 井戸水 | いわき市常磐 白鳥町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 沢水 | いわき市山田町 | 2012年5月 | Cs137 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | 0.0 | Cs137 | 5.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 0.0 Bq/Kg生 | ± 0.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.0 Bq/Kg生 | |
| 椎茸原木 | いわき市山田町 船板 | 2012年5月 | Cs137 | 52.0 Bq/Kg生 | ± 13.0 Bq/Kg生 | 76.0 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 24.0 Bq/Kg生 | ± 8.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| エゾウコギ | いわき市金山町 | 2012年5月 | Cs137 | 5.6 Bq/Kg生 | ± 4.6 Bq/Kg生 | 10.9 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 5.3 Bq/Kg生 | ± 4.1 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| もみがら | いわき市富津町 | 2012年5月 | Cs137 | 697 Bq/Kg生 | ± 87.0 Bq/Kg生 | 1,154 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 457 Bq/Kg生 | ± 54.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg生 | |
| もみがら | いわき市沼部町 | 2012年5月 | Cs137 | 34.0 Bq/Kg生 | ± 17.9 Bq/Kg生 | 50.6 | Cs137 | 7.0 Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 16.6 Bq/Kg生 | ± 14.3 Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.0 Bq/Kg生 | |
| 堆肥土 | 栃木県鹿沼市 | 不明 | Cs137 | 46.0 Bq/Kg乾 | ± 16.0 Bq/Kg乾 | 81.0 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| | | | Cs134 | 35.0 Bq/Kg乾 | ± 10.0 Bq/Kg乾 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| 腐葉土 | いわき市 自由ヶ丘 | 2012年5月 | Cs137 | 2639 Bq/Kg乾 | ± 254 Bq/Kg乾 | 4,433 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| | | | Cs134 | 1794 Bq/Kg乾 | ± 166 Bq/Kg乾 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| 畑土 | いわき市小川町 柴原 | 2012年5月 | Cs137 | 111 Bq/Kg乾 | ± 19.0 Bq/Kg乾 | 190 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| | | | Cs134 | 79.0 Bq/Kg乾 | ± 12.0 Bq/Kg乾 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| 畑土 | いわき市平 下大越 | 2012年5月 | Cs137 | 338 Bq/Kg乾 | ± 43.0 Bq/Kg乾 | 508 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| | | | Cs134 | 170 Bq/Kg乾 | ± 23.0 Bq/Kg乾 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| 畑土 | いわき市平 下大越 | 2012年5月 | Cs137 | 224 Bq/Kg乾 | ± 33.0 Bq/Kg乾 | 382 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| | | | Cs134 | 158 Bq/Kg乾 | ± 21.0 Bq/Kg乾 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| 畑土 | いわき市平 | 2012年5月 | Cs137 | 176 Bq/Kg生 | ± 24.0 Bq/Kg生 | 287 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| | | | Cs134 | 111 Bq/Kg生 | ± 15.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| 畑土 | いわき市平 | 2012年5月 | Cs137 | 161 Bq/Kg生 | ± 24.0 Bq/Kg生 | 268 | Cs137 | 8.0 Bq/Kg乾 | |
| | | | Cs134 | 107 Bq/Kg生 | ± 15.0 Bq/Kg生 | | Cs134 | 8.0 Bq/Kg乾 | |

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | | |
|------|------------|---------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-----|--------|
| 畑土 | いわき市鹿島町 | 2012年5月 | Cs137 | 227 | Bq/Kg乾 | ± 32.0 | 393 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 166 | Bq/Kg乾 | ± 21.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 畑土 | いわき市小名浜大原 | 2012年5月 | Cs137 | 406 | Bq/Kg乾 | ± 50.0 | 684 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 278 | Bq/Kg乾 | ± 32.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 畑土 | いわき市小名浜島 | 2012年5月 | Cs137 | 103 | Bq/Kg乾 | ± 18.0 | 174 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 71.0 | Bq/Kg乾 | ± 12.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 畑土 | いわき市泉町滝尻 | 2012年5月 | Cs137 | 335 | Bq/Kg乾 | ± 42.0 | 554 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 219 | Bq/Kg乾 | ± 26.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 畑土 | いわき市沼部町 | 2012年5月 | Cs137 | 148 | Bq/Kg乾 | ± 23.0 | 259 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 111 | Bq/Kg乾 | ± 15.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市三和町中寺 | 2012年5月 | Cs137 | 192 | Bq/Kg乾 | ± 29.0 | 316 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 124 | Bq/Kg乾 | ± 18.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町小谷作 | 2012年5月 | Cs137 | 163 | Bq/Kg乾 | ± 25.0 | 272 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 109 | Bq/Kg乾 | ± 16.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市大久町 | 2012年5月 | Cs137 | 72.0 | Bq/Kg乾 | ± 15.0 | 121 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 49.0 | Bq/Kg乾 | ± 10.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市大久町 | 2012年5月 | Cs137 | 158 | Bq/Kg乾 | ± 24.0 | 264 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 106 | Bq/Kg乾 | ± 15.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市大久町大久 | 2012年5月 | Cs137 | 54.0 | Bq/Kg乾 | ± 15.0 | 92.0 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 38.0 | Bq/Kg乾 | ± 10.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市大久町大久 | 2012年5月 | Cs137 | 387 | Bq/Kg乾 | ± 48.0 | 661 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 274 | Bq/Kg乾 | ± 31.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市平平窪 | 2012年4月 | Cs137 | 94.0 | Bq/Kg生 | ± 17.0 | 143 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 49.0 | Bq/Kg生 | ± 11.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg生 |
| 土壌 | いわき市平北白土 | 2012年5月 | Cs137 | 44.0 | Bq/Kg乾 | ± 12.0 | 67.0 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 23.0 | Bq/Kg乾 | ± 7.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市平北白土 | 2012年5月 | Cs137 | 439 | Bq/Kg乾 | ± 52.0 | 757 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 318 | Bq/Kg乾 | ± 34.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市小名浜君ヶ塚 | 2012年5月 | Cs137 | 123 | Bq/Kg乾 | ± 20.0 | 205 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 82.0 | Bq/Kg乾 | ± 13.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市常磐水野谷町 | 2012年5月 | Cs137 | 225 | Bq/Kg乾 | ± 32.0 | 361 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 136 | Bq/Kg乾 | ± 19.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市江名 | 2012年5月 | Cs137 | 119 | Bq/Kg乾 | ± 20.0 | 216 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 97.0 | Bq/Kg乾 | ± 44.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市錦町花ノ井 | 2012年5月 | Cs137 | 116 | Bq/Kg乾 | ± 21.0 | 201 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 85.0 | Bq/Kg乾 | ± 14.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 土壌 | いわき市勿来町白米 | 2012年4月 | Cs137 | 318 | Bq/Kg乾 | ± 42.0 | 536 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 218 | Bq/Kg乾 | ± 27.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| 雑地 | いわき市小名浜住吉 | 2012年5月 | Cs137 | 701 | Bq/Kg乾 | ± 76.0 | 1,182 | Cs137 | 8.0 | Bq/Kg乾 |
| | | | Cs134 | 481 | Bq/Kg乾 | ± 49.0 | | Cs134 | 8.0 | Bq/Kg乾 |