



2012年10月の放射能測定結果 386件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	北海道	不明	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	熊本県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	富山県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	新潟県上越市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	新潟県魚沼市	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	新潟県魚沼市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	茨城県高萩市	2011年9月	Cs137	9.2 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	17.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	茨城県北茨城市	2012年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	茨城県水戸市 内原	2011年10月	Cs137	10.3 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	16.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	二本松市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町	2012年9月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下神谷	2012年10月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下神谷	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平赤井	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平高久	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市鹿島町 米田	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市鹿島町 米田	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市鹿島町 上蔵持	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市鹿島町 下蔵持	2012年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 金成	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	11.2 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	23.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.2 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 上神白	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 下神白	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	20.2 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生	31.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 藤原町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町 上遠野	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	9.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき遠野町	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき遠野町 深山田	2012年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町 深山田	2012年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町 滝	2012年10月	Cs137	5.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町 滝	2012年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町 大平	2012年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市沼部町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2010年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2011年9月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	9.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2012年9月	Cs137	8.9 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	18.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.1 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市錦町 綾の内	2012年10月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市錦町 曲田	2012年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	2012年9月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市 添野町大沢	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市添野町	2012年9月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市添野町	2012年9月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山玉町	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山玉町	2012年9月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市瀬戸町	2012年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市瀬戸町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	北海道	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	北海道	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	北海道	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	高知県	2011年10月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	熊本県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	栃木県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	栃木県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.9 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2011年10月	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2012年9月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県魚沼市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県長岡市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	千葉県	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	滋賀県米原市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	秋田県	2012年10月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県亘理郡亘理町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県高萩市	2012年9月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県水戸市内原	2011年10月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県日立市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	栃木県那須郡那須町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津若松市	2011年10月	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津若松市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	会津若松市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	石川郡平田村	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市	2012年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	田村郡	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2012年9月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町駒込	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平上大越	2010年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市平上大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平上大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平下大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平沼ノ内	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平下高久	2011年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	4.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生			Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平下神谷	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平高久	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	12.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	7.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 大原	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 三沢町	2012年9月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 三沢町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 白鳥町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 藤原町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市渡辺町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市渡辺町	不明	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生	1.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市渡辺町 松小屋	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき遠野町	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき遠野町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき遠野町	2012年9月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町 大平	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町 滝	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町 滝	2012年9月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町 滝	2012年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき遠野町 深山田	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市中岡町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市川部町	2009年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市川部町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市川部町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市添野町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市添野町	2012年9月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市添野町 大沢	2012年10月	Cs137	1.0 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.8 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山玉町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山玉町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市米田	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.8 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町 窪田	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市錦町	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	不明	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	不明	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち玄米	いわき市鹿島町 下蔵持	2012年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち玄米	いわき市小名浜 下神白	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち玄米	いわき市沼部町	不明	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち玄米	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	13.2 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	23.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	富山県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市常磐	2011年10月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
もち米	いわき市川部町 赤坂	2012年8月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	7.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
黒米	伊達市	2011年10月	Cs137	12.4 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	23.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.7 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
炊飯米	いわき市平 赤井	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
米ぬか	不明	不明	Cs137	7.0 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	13.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも (皮付)	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市平	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市平 郷ヶ丘	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市鹿島町 米田	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市川部町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市川部町	2012年10月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	4.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市植田町 後田	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ヤーコン	いわき市平 下平窪	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
山芋	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
長芋	いわき市好間町	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市沼部町	2012年7月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市植田町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市四倉町 狐塚	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市平 下高久	不明	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市平 下大越	2012年9月	Cs137	6.2 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	6.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市四倉町 狐塚	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市内郷 御台境	2012年9月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市勿来町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	山形県長井市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市植田町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根葉	いわき市江名町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぶ	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市錦町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	10.7 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生	16.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.1 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
しその実・葉	いわき市桜ヶ丘	2012年9月	Cs137	15.1 Bq/Kg生	± 8.0 Bq/Kg生	20.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.4 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
レタス	いわき市平下高久	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	山形県長井市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
カリフラワー	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
空心菜	いわき市常磐 西郷町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市好間町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ナス	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ピーマン	いわき市平下高久	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
らっきょう	いわき市常磐 上湯長谷町	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
落花生	いわき市平下高久	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
落花生	いわき市平下平窪	2012年10月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
落花生	いわき市平平窪	2012年10月	Cs137	0.3 Bq/Kg生	± 0.1 Bq/Kg生	0.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.1 Bq/Kg生	± 0.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
茶葉	茨城県	2012年6月	Cs137	83.4 Bq/Kg生	± 19.1 Bq/Kg生	138	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	54.2 Bq/Kg生	± 12.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
茶葉	静岡県	2011年5月	Cs137	171 Bq/Kg生	± 36.0 Bq/Kg生	292	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	121 Bq/Kg生	± 25.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
茶葉	鹿児島県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
月桂樹	いわき市桜ヶ丘	2012年9月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生	5.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
そばの実	いわき市平下山口	2012年10月	Cs137	10.1 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	17.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.3 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ナツハゼの実	いわき市若葉台	2012年10月	Cs137	17.2 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生	27.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.9 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
銀杏	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	10.6 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	21.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.3 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市平菅波	2012年10月	Cs137	21.6 Bq/Kg生	± 5.7 Bq/Kg生	39.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	18.2 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき市鹿島町 米田	2012年10月	Cs137	43.4 Bq/Kg生	± 9.7 Bq/Kg生	69.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	25.8 Bq/Kg生	± 5.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ゆず	いわき遠野町	2012年10月	Cs137	30.2 Bq/Kg生	± 7.4 Bq/Kg生	64.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	33.8 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
あけび (果肉)	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	千葉県野田市	2012年10月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	11.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	双葉郡楢葉町	2012年10月	Cs137	398 Bq/Kg生	± 80.0 Bq/Kg生	670	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	272 Bq/Kg生	± 54.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市平赤井	2012年10月	Cs137	10.8 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	18.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.0 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市平下神谷	2012年10月	Cs137	11.3 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	21.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.0 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	11.1 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	20.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.0 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	72.9 Bq/Kg生	± 15.7 Bq/Kg生	101	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	28.5 Bq/Kg生	± 8.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市田人町	2012年9月	Cs137	94.9 Bq/Kg生	± 17.7 Bq/Kg生	143	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	48.5 Bq/Kg生	± 10.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市常磐	2012年10月	Cs137	11.1 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生	22.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市泉町	2012年10月	Cs137	7.6 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	11.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市泉町	2012年10月	Cs137	14.3 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生	27.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	13.5 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗(茹で)	いわき市沼部町	2012年9月	Cs137	19.8 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生	35.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	15.9 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗(茹で)	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	14.5 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生	25.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.6 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
りんご	いわき市小名浜大原	2012年10月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 11.7 Bq/Kg生	9.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 5.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
柿	伊達市保原町	2012年10月	Cs137	11.0 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	22.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.4 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市平赤井	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市鹿島町走熊	2012年10月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市鹿島町走熊	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市常磐西郷町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市小名浜岡小名	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市小名浜上神白	2012年10月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	9.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市小名浜下神白	2012年10月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市小名浜林ノ上	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市沼部町	2012年10月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
柿	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いちじく	いわき市平下神谷	2012年10月	Cs137	7.9 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	13.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キウイ	いわき市小名浜大原	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.3 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
キウイ	いわき市鹿島町米田	2012年10月	Cs137	6.3 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	13.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キウイ	いわき市川部町	2012年10月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市好間町下好間	2012年9月	Cs137	8.7 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生	8.8	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.1 Bq/Kg生	± 0.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市平中央台	2012年8月	Cs137	9.7 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	14.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市小名浜岡小名	2012年9月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市泉ヶ丘	2012年10月	Cs137	10.0 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	14.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
イチジク	いわき市平下平窪	2012年10月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
イチジク(皮付)	いわき市錦町	2012年10月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
シメジ	いわき市平赤井	2012年10月	Cs137	19.3 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生	31.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	11.9 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ハタケシメジ	いわき市三和町	2012年10月	Cs137	161 Bq/Kg生	± 25.6 Bq/Kg生	232	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	70.9 Bq/Kg生	± 12.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
イッポンシメジ	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	136 Bq/Kg生	± 28.0 Bq/Kg生	218	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	81.5 Bq/Kg生	± 16.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
イッポンシメジ	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	3708 Bq/Kg生	± 338 Bq/Kg生	5,529	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1821 Bq/Kg生	± 169 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
イッポンシメジ	いわき市小浜町	2012年10月	Cs137	33.0 Bq/Kg生	± 10.4 Bq/Kg生	43.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.4 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
シャカシメジ	いわき市鬼ヶ城	2012年10月	Cs137	106 Bq/Kg生	± 22.0 Bq/Kg生	179	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	72.9 Bq/Kg生	± 14.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
シャカシメジ(茹)	いわき市鬼ヶ城	2012年10月	Cs137	11.8 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	21.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.1 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
サクラシメジ	いわき市平	2012年10月	Cs137	74.5 Bq/Kg生	± 15.7 Bq/Kg生	128	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	53.8 Bq/Kg生	± 11.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
サクラシメジ	いわき市鬼ヶ城	2012年10月	Cs137	481 Bq/Kg生	± 55.2 Bq/Kg生	715	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	234 Bq/Kg生	± 28.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ムラサキシメジ	双葉郡川内村	2012年10月	Cs137	2,340 Bq/Kg生	± 470 Bq/Kg生	3,950	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1,610 Bq/Kg生	± 320 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ホンシメジ	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	15.5 Bq/Kg生	± 6.1 Bq/Kg生	22.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.3 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ホテイシメジ	いわき市鬼ヶ城	2012年10月	Cs137	29.0 Bq/Kg生	± 8.0 Bq/Kg生	62.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	33.7 Bq/Kg生	± 7.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ウラベニホテイシメジ(茹)	いわき市内郷町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ウラベニホテイシメジ	いわき市内郷町	2012年10月	Cs137	7.0 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生	7.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ウラベニホテイシメジ	いわき市内郷町	2012年10月	Cs137	61.7 Bq/Kg生	± 13.6 Bq/Kg生	101	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	39.6 Bq/Kg生	± 8.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ウラベニホテイシメジ	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	15.9 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	25.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ウラベニホテイシメジ	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	1510 Bq/Kg生	± 300 Bq/Kg生	3,110	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1600 Bq/Kg生	± 320 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
舞茸	双葉郡川内村	2012年10月	Cs137	62.1 Bq/Kg生	± 13.6 Bq/Kg生	109	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	46.8 Bq/Kg生	± 9.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
舞茸	いわき市小川町	不明	Cs137	13.7 Bq/Kg生	± 6.4 Bq/Kg生	19.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 5.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
舞茸	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	10.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.4 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
舞茸	いわき市山玉町	2012年10月	Cs137	42.2 Bq/Kg生	± 13.7 Bq/Kg生	47.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
舞茸	いわき市田人町 横川	2012年10月	Cs137	9.7 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生	16.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
松茸	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	63.4 Bq/Kg生	± 11.9 Bq/Kg生	80.2	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	16.8 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
松茸	いわき市川内村	2012年10月	Cs137	75.4 Bq/Kg生	± 15.8 Bq/Kg生	118	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	42.7 Bq/Kg生	± 9.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
椎茸	双葉郡檜葉町	2012年10月	Cs137	2,495 Bq/Kg生	± 239 Bq/Kg生	3,693	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1,198 Bq/Kg生	± 118 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市平高久	不明	Cs137	73.9 Bq/Kg生	± 22.0 Bq/Kg生	105	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	30.9 Bq/Kg生	± 13.7 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市鹿島町 走熊	2012年10月	Cs137	153 Bq/Kg生	± 31.0 Bq/Kg生	255	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	102 Bq/Kg生	± 20.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市遠野町 入定	2012年10月	Cs137	125 Bq/Kg生	± 30.0 Bq/Kg生	233	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	108 Bq/Kg生	± 24.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市遠野町 滝	2012年10月	Cs137	249 Bq/Kg生	± 31.6 Bq/Kg生	373	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	124 Bq/Kg生	± 16.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	84.7 Bq/Kg生	± 17.8 Bq/Kg生	145	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	60.5 Bq/Kg生	± 12.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	64.2 Bq/Kg生	± 14.6 Bq/Kg生	104	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	40.0 Bq/Kg生	± 9.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
原木(しいたけ)	いわき市鹿島町 米田	2012年11月	Cs137	346.0 Bq/Kg乾	± 69.0 Bq/Kg乾	572	Cs137	7.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	226.0 Bq/Kg乾	± 45.0 Bq/Kg乾		Cs134	6.0 Bq/Kg乾	
アマタケ(水洗い)	東白川郡鮫川村	2012年10月	Cs137	231 Bq/Kg生	± 46.0 Bq/Kg生	474	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	243 Bq/Kg生	± 49.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
アマタケ	東白川郡塙町	2012年10月	Cs137	41.4 Bq/Kg生	± 9.5 Bq/Kg生	70.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	29.5 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
アマタケ	東白川郡鮫川村	2012年10月	Cs137	622 Bq/Kg生	± 124 Bq/Kg生	1,259	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	637 Bq/Kg生	± 127 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
アマタケ	いわき市鬼ヶ城	2012年10月	Cs137	388 Bq/Kg生	± 78.0 Bq/Kg生	790	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	402 Bq/Kg生	± 80.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
アミタケ	いわき市三和町 三坂	2012年10月	Cs137	210	Bq/Kg生	± 42.0	358	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	148	Bq/Kg生	± 30.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
アミタケ	いわき市内郷 高野町	2012年10月	Cs137	139	Bq/Kg生	± 28.0	275	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	136	Bq/Kg生	± 27.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
アミタケ (茹)	いわき市鬼ヶ城	2012年10月	Cs137	26.0	Bq/Kg生	± 6.4	48.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	22.7	Bq/Kg生	± 5.3		Cs134	6.0	Bq/Kg生
クリタケ	いわき市小名浜 岩出	2012年10月	Cs137	149	Bq/Kg生	± 30.0	253	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	104	Bq/Kg生	± 21.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
シシタケ	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	140	Bq/Kg生	± 21.3	180	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	40.1	Bq/Kg生	± 9.0		Cs134	8.0	Bq/Kg生
コガネタケ	いわき市田人町 南大平	2012年10月	Cs137	5.6	Bq/Kg生	± 2.9	7.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 2.4		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ハツタケ	いわき市内郷 高野町	2012年10月	Cs137	460	Bq/Kg生	± 92.0	760	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	300	Bq/Kg生	± 60.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ヤマトリタケ モドキ	いわき市平 中央台	2012年10月	Cs137	39.9	Bq/Kg生	± 9.8	77.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	37.6	Bq/Kg生	± 8.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
コウタケ	いわき市三和町	2012年10月	Cs137	172	Bq/Kg生	± 35.0	245	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	73.4	Bq/Kg生	± 16.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
コウタケ(茹)	いわき市鬼ヶ城	2012年10月	Cs137	7.4	Bq/Kg生	± 30.6	9.1	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 3.7		Cs134	8.0	Bq/Kg生
コウタケ(茹)	いわき市三和町	2012年10月	Cs137	17.5	Bq/Kg生	± 4.7	29.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	11.9	Bq/Kg生	± 3.3		Cs134	6.0	Bq/Kg生
コウタケ(茹)	不明	不明	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 3.5	3.6	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.3	Bq/Kg生	± 3.6		Cs134	8.0	Bq/Kg生
コウタケ (塩茹2回)	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
クリフウセンタケ	いわき市三和町	2012年10月	Cs137	109	Bq/Kg生	± 23.0	173	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	63.7	Bq/Kg生	± 13.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
クサウラベニタケ	いわき市三和町	2012年10月	Cs137	4570	Bq/Kg生	± 910	7,660	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3090	Bq/Kg生	± 620		Cs134	6.0	Bq/Kg生
なめこ	いわき市小名浜 岩井	2012年10月	Cs137	528	Bq/Kg生	± 106	878	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	350	Bq/Kg生	± 70.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
なめこ	いわき市田人町	不明	Cs137	205	Bq/Kg生	± 29.0	303	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	98.0	Bq/Kg生	± 15.6		Cs134	8.0	Bq/Kg生
はちみつ	いわき市大久町	2012年10月	Cs137	86.4	Bq/Kg生	± 18.7	186	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	100	Bq/Kg生	± 20.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
はちみつ	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	54.2	Bq/Kg生	± 11.8	94.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	40.2	Bq/Kg生	± 8.4		Cs134	6.0	Bq/Kg生
はちみつ	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	130	Bq/Kg生	± 26.0	221	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	90.7	Bq/Kg生	± 18.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
味噌	栃木県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
味噌	栃木県	2012年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	1.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.3	Bq/Kg生	± 2.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
味噌	いわき市	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
給食	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	1.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 1.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
給食	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
鮭	双葉郡富岡町	2012年10月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	8.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かじきまぐろ	いわき市江名沖	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
メジマグロ	いわき市小名浜	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
シーラ	いわき市小名浜	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
しゅうり貝	いわき市小名浜	2012年10月	Cs137	1.0 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	3.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
へちま水	いわき市平下平窪	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ミネラルウォーター	長野県北安曇郡	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
商品水	北海道	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市常磐湯本町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.5	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.5 Bq/Kg生	± 0.8 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市平神谷	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
カヤ	いわき市泉町本谷	2012年10月	Cs137	12.0 Bq/Kg乾	± 10.0 Bq/Kg乾	42	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	30.0 Bq/Kg乾	± 10.0 Bq/Kg乾		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
灰	いわき市泉町本谷	2012年11月	Cs137	972.0 Bq/Kg乾	± 194.0 Bq/Kg乾	1,643	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	671.0 Bq/Kg乾	± 134.0 Bq/Kg乾		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
竹	いわき市泉町本町	2012年10月	Cs137	43.0 Bq/Kg乾	± 12.0 Bq/Kg乾	67	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	24.0 Bq/Kg乾	± 8.0 Bq/Kg乾		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
焼物	いわき市大久町	2012年7月	Cs137	27.0 Bq/Kg乾	± 8.0 Bq/Kg乾	89	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	62.0 Bq/Kg乾	± 13.0 Bq/Kg乾		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
焼物	いわき市大久町	2012年7月	Cs137	47.0 Bq/Kg乾	± 13.0 Bq/Kg乾	57	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.0 Bq/Kg乾	± 7.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
腐葉土	いわき市小名浜西君ヶ塚	2012年10月	Cs137	20.0 Bq/Kg乾	± 9.0 Bq/Kg乾	23.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	3.0 Bq/Kg乾	± 6.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
畑土	広島県三原市	2012年10月	Cs137	30.0 Bq/Kg乾	± 10.0 Bq/Kg乾	32.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	2.0 Bq/Kg乾	± 5.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
畑土	広島県三原市	2012年10月	Cs137	28.0 Bq/Kg乾	± 9.0 Bq/Kg乾	28.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	0.0 Bq/Kg乾	± 0.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
畑土	いわき市泉町下川	2012年10月	Cs137	501 Bq/Kg乾	± 57.0 Bq/Kg乾	766	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	265 Bq/Kg乾	± 31.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
畑土	いわき市泉町下川	2012年10月	Cs137	664 Bq/Kg乾	± 72.0 Bq/Kg乾	1,005	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	341 Bq/Kg乾	± 38.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
土壌	いわき市中央台鹿島	不明	Cs137	708 Bq/Kg乾	± 76.0 Bq/Kg乾	1,080	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	372 Bq/Kg乾	± 41.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
土壌	いわき市泉町	2012年10月	Cs137	682	Bq/Kg乾	± 74.0	1,032	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	350	Bq/Kg乾	± 40.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉町	2012年10月	Cs137	707	Bq/Kg乾	± 77.0	1,086	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	379	Bq/Kg乾	± 42.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉町 下川	2012年10月	Cs137	312	Bq/Kg乾	± 39.0	484	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	172	Bq/Kg乾	± 22.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉町 下川	2012年10月	Cs137	1098	Bq/Kg乾	± 112	1,671	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	573	Bq/Kg乾	± 60.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉町 下川	2012年10月	Cs137	1290	Bq/Kg乾	± 134	1,969	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	679	Bq/Kg乾	± 71.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉町 下川	2012年10月	Cs137	661	Bq/Kg乾	± 72.0	1,018	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	357	Bq/Kg乾	± 40.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市泉町 本谷	2012年10月	Cs137	237.0	Bq/Kg乾	± 29.0	358	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	121.0	Bq/Kg乾	± 16.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市勿来町 窪田	2012年10月	Cs137	706	Bq/Kg乾	± 74.0	1,099	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	393	Bq/Kg乾	± 41.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾