



# 2012年11月の放射能測定結果 233件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。  
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にはばらつきがありますが、  
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

## ★ガ"ンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
玄米	会津若松市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	会津若松市	2012年10月	Cs137	1.8	Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	会津若松市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	耶麻郡猪苗代町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市田村市 船引町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	6.2	Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	12.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.1	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 上平窪	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 下神白	2012年10月	Cs137	7.3	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	12.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.2	Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	1.3	Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	秋田県	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	山形県	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	宮城県石巻市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	宮城県	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	宮城県白石市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	山形県南陽市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	二本松市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	耶麻郡猪苗代町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市内	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小川町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小川町 上小川	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小川町 福岡	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小川町 上平	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町	2012年11月	Cs137	1.5	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.3	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	5.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町 長友	2012年10月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市好間町 下好間	2012年10月	Cs137	5.4	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	10.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.8	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市好間町 下好間	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 赤井	2012年10月	Cs137	2.0	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	2.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 中塩	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下高久	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 上大越	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 豊間	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下山口	2012年10月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 北神谷	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市鹿島町 蔵持	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 上神白	2012年10月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市小名浜 金成	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 住吉	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 三沢町	2012年10月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	1.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 三沢町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市泉町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町 上遠野	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町 上遠野	2012年10月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市植田町	2011年10月	Cs137	1.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	1.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市沼部町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市川部町	2012年10月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 1.4	Bq/Kg生	5.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 1.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市川部町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	1.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	不明	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
洗白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	6.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
炊飯米	いわき市平 下神谷	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
もち玄米	茨城県笠間市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もち玄米	いわき市平 中平窪	2012年10月	Cs137	2.0	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	2.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もち玄米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もち玄米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もち玄米	不明	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もち米	新潟県新潟市 西浦区	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
もち米	いわき市小川町	不明	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	3.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もち米	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
もち米	いわき市添野町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
米ぬか	不明	不明	Cs137	7.0	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生	13.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.0	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	山形県長井市	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市平中塩	2012年11月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市平中平窪	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.4	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.4	Bq/Kg生	± 6.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市平沼ノ内	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	不明	不明	Cs137	1.5	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	1.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市遠野町入遠野	2012年11月	Cs137	1.4	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	1.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市渡辺町	2012年11月	Cs137	2.0	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
菊芋	いわき市平	2012年11月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	5.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
芋がら	いわき市平中平窪	2012年11月	Cs137	0.5	Bq/Kg生	± 13.3	Bq/Kg生	2.9	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 6.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
大根	いわき市三和町	2012年11月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市小川町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市四倉町狐塚	2012年10月	Cs137	5.2	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	8.1	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
大根	いわき市四倉町細谷	2012年11月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	1.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市四倉町細谷	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平菅波	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平赤井	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平中塩	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市鹿島町上蔵持	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市中央台高久	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市小名浜大原	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
大根	いわき市小名浜 岡小名	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市渡辺町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市遠野町 滝	2012年11月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
紫大根	いわき市渡辺町	2012年11月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	4.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かぶ	いわき市小川町	2012年11月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かぶの葉	いわき市小川町	2012年11月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生	2.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市三和町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市四倉町 駒込	2012年11月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	6.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市平 赤井	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市中央台 高久	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市鹿島町 上蔵持	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市小名浜 岡小名	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市小名浜 大原	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市遠野町 入遠野	2012年11月	Cs137	1.5	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	1.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市遠野町 滝	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市渡辺町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市四倉町	2012年11月	Cs137	20.0	Bq/Kg生	± 5.9	Bq/Kg生	28.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.4	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市平 中塩	2012年10月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	2.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
さつまいも (皮付)	茨城県北茨城市	2012年10月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	5.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
かぼちゃ	長野県 安曇野市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
人参	いわき市四倉町 狐塚	2012年10月	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	4.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
人参	いわき市内郷 御台境町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
人参	いわき市鹿島町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市四倉町 駒込	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平 赤井	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市小川町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平高久	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	山形県長井市	2012年11月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平 赤井	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市小名浜 大原	2012年11月	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	3.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市平 沼ノ内	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	± 5.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ニラ	いわき市平 下大越	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市平菅波	2012年11月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	4.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市小川町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市小名浜 岡小名	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市小名浜 岡小名	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
春菊	いわき市若葉台	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
チンゲン菜	いわき市平 赤井	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
京水菜	いわき市平 赤井	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市平 赤井	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市鹿島町 上蔵持	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市遠野町 入遠野	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
エゴマ	いわき市平 藤間町	2012年10月	Cs137	25.3	Bq/Kg生	± 7.5	Bq/Kg生	42.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	17.6	Bq/Kg生	± 5.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ヤーコン	いわき市四倉町 細谷	2012年11月	Cs137	1.4	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	3.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
青唐辛子	いわき市泉町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
青大豆	新潟県	2011年11月	Cs137	14.4	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生	20.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.8	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市遠野町	2012年11月	Cs137	139	Bq/Kg生	± 28.0	Bq/Kg生	232	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	92.6	Bq/Kg生	± 18.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市泉町	2012年11月	Cs137	147	Bq/Kg生	± 24.6	Bq/Kg生	232	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	84.5	Bq/Kg生	± 13.4	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	241	Bq/Kg生	± 48.0	Bq/Kg生	403	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	162	Bq/Kg生	± 32.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市泉町 下川	2012年11月	Cs137	83.6	Bq/Kg生	± 14.5	Bq/Kg生	120	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	36.8	Bq/Kg生	± 7.7	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市泉町 下川	2012年11月	Cs137	83.6	Bq/Kg生	± 14.5	Bq/Kg生	120	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	36.8	Bq/Kg生	± 7.7	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	99.0	Bq/Kg生	± 21.7	Bq/Kg生	179	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	80.1	Bq/Kg生	± 16.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市鹿島町	2012年11月	Cs137	266.0	Bq/Kg生	± 53.0	Bq/Kg生	443	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	177.0	Bq/Kg生	± 35.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市平	2012年11月	Cs137	224	Bq/Kg生	± 46.0	Bq/Kg生	383	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	159	Bq/Kg生	± 32.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ヒメサクラ シメジ	いわき市平 赤井	2012年11月	Cs137	456	Bq/Kg生	± 52.1	Bq/Kg生	689	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	233	Bq/Kg生	± 27.6	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ハタケシメジ	いわき市石森	2012年11月	Cs137	10.2	Bq/Kg生	± 5.8	Bq/Kg生	13.3	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 5.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ウラベニ ホテイシメジ	いわき市石森	2012年10月	Cs137	598	Bq/Kg生	± 66.5	Bq/Kg生	874	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	276	Bq/Kg生	± 32.9	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
シモフリシメジ	いわき市田人町	2012年11月	Cs137	41.7	Bq/Kg生	± 12.1	Bq/Kg生	61.1	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.4	Bq/Kg生	± 6.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
シャカシメジ (茹)	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	8.8	Bq/Kg生	± 5.1	Bq/Kg生	8.8	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
コウタケ	いわき市三和町	2012年11月	Cs137	351	Bq/Kg生	± 70.0	Bq/Kg生	523	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	172	Bq/Kg生	± 35.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
コウタケ	いわき市小川町	2012年10月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	2.9	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
コウタケ (茹)	いわき市三和町	2012年11月	Cs137	0.3	Bq/Kg生	± 5.6	Bq/Kg生	2.8	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
コウタケ (茹)	いわき市平	2012年10月	Cs137	9.5	Bq/Kg生	± 9.0	Bq/Kg生	20.1	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.6	Bq/Kg生	± 9.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
コガネタケ	いわき市石森	2012年11月	Cs137	16.9	Bq/Kg生	± 12.2	Bq/Kg生	26.5	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.6	Bq/Kg生	± 7.5	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
シシタケ	双葉郡楢葉町	2012年11月	Cs137	1570	Bq/Kg生	± 153	Bq/Kg生	2,299	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	729	Bq/Kg生	± 73.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
シシタケ	いわき市川前町	2012年11月	Cs137	1.5	Bq/Kg生	± 0.1	Bq/Kg生	2.5	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.0	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
アカモミタケ	いわき市内郷	2012年11月	Cs137	452	Bq/Kg生	± 52.2	Bq/Kg生	680	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	228	Bq/Kg生	± 27.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
キハツタケ	いわき市水石山	2012年11月	Cs137	1200	Bq/Kg生	± 240	Bq/Kg生	2,004	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	804	Bq/Kg生	± 161	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
クリタケ(茹)	いわき市田人町	2012年11月	Cs137	56.8 Bq/Kg生	± 12.5 Bq/Kg生	94.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	Cs134	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	37.3 Bq/Kg生	± 8.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
ハナイグチ(茹)	いわき市常磐 西郷町	2012年10月	Cs137	43.8 Bq/Kg生	± 9.9 Bq/Kg生	75.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	32.1 Bq/Kg生	± 7.1 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
みかん	いわき市平 下神谷	2012年11月	Cs137	13.9 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	23.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.2 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
みかん	いわき市平 郷ヶ丘	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
みかん	いわき市平 下山口	2012年11月	Cs137	12.4 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	21.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.4 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
みかん	いわき市内郷 御台境町	2012年11月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	9.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
みかん	いわき市洋向台	2012年11月	Cs137	15.1 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	22.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
みかん	いわき市添野町	2012年11月	Cs137	11.0 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生	11.9	Cs137	8.0 Bq/Kg生	Cs134	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.9 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
ゆず	茨城県北茨城市	2012年11月	Cs137	26.1 Bq/Kg生	± 6.3 Bq/Kg生	41.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	15.5 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	83.5 Bq/Kg生	± 17.6 Bq/Kg生	144	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	60.3 Bq/Kg生	± 12.4 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市平 中平窪	2012年11月	Cs137	36.4 Bq/Kg生	± 12.6 Bq/Kg生	55.9	Cs137	8.0 Bq/Kg生	Cs134	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.5 Bq/Kg生	± 6.2 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市平 中神谷	2012年11月	Cs137	19.7 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	34.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	14.5 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市小名浜 上神白	2012年11月	Cs137	35.2 Bq/Kg生	± 8.2 Bq/Kg生	57.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	22.6 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市小名浜 小出	2012年11月	Cs137	26.0 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生	49.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	23.3 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市遠野町	2012年11月	Cs137	23.0 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生	42.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.2 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市渡辺町	2012年11月	Cs137	10.8 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	16.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.6 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市沼部町	2012年11月	Cs137	22.9 Bq/Kg生	± 6.1 Bq/Kg生	40.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	17.1 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
ゆず	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	14.8 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	21.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.8 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
銀杏	いわき市錦町 鳥居西	2012年11月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	6.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	Cs134	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
柿	福島市鎌田	2012年11月	Cs137	13.3 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	27.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	14.5 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
柿	安達郡大玉村	2012年11月	Cs137	8.9 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	11.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
柿	いわき市楢葉町	2012年11月	Cs137	26.2 Bq/Kg生	± 6.8 Bq/Kg生	47.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	20.9 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
柿	いわき市小川町 下小川	2012年10月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
柿	いわき市平 下大越	2012年11月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
柿	いわき市平北神谷	2012年11月	Cs137	6.6	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生	9.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市平下山口	2012年11月	Cs137	7.6	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	11.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市下神谷	2012年11月	Cs137	8.0	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生	10.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市鹿島町上蔵持	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市平泉崎	2012年11月	Cs137	10.4	Bq/Kg生	± 3.9	Bq/Kg生	14.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.3	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市泉町下川	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	不明	不明	Cs137	1.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市渡辺町	2012年11月	Cs137	3.7	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	6.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市四倉町細谷	2012年10月	Cs137	7.8	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	12.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.1	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市小川町下小川	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市小川町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市下神谷	2012年11月	Cs137	13.0	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生	25.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	12.7	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市鹿島町	2012年10月	Cs137	12.6	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生	19.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.2	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市鹿島町久保	2012年11月	Cs137	12.1	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生	19.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.3	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市鹿島町米田	2012年11月	Cs137	14.9	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生	17.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市鹿島町上蔵持	2012年11月	Cs137	9.6	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	15.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.8	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゴールドキウイ	いわき市鹿島町	2012年11月	Cs137	1.3	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	3.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アップルキウイ	いわき市小川町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
栗	いわき市沼ノ内	2012年10月	Cs137	22.6	Bq/Kg生	± 5.6	Bq/Kg生	36.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	13.5	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
栗	いわき市田人町	2012年10月	Cs137	32.8	Bq/Kg生	± 9.7	Bq/Kg生	44.4	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.6	Bq/Kg生	± 5.5	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
りんご	福島市	2012年11月	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	8.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
梨	新潟県新潟市	2012年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
いちじく	いわき市平北白土	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.1	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
なまこ	いわき市小名浜	2012年11月	Cs137	1.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	1.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
鮭	双葉郡富岡町	2012年11月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
うなぎ（煮）	不明	不明	Cs137	162	Bq/Kg生	± 32.0	Bq/Kg生	269	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	107	Bq/Kg生	± 21.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キジ肉	いわき市三和町	2012年11月	Cs137	19.1	Bq/Kg生	± 5.2	Bq/Kg生	34.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	15.7	Bq/Kg生	± 4.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
イナゴ（乾燥）	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	6.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.7	Bq/Kg生	± 8.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
イナゴ（煮）	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
山鳥	いわき市三和町	2012年11月	Cs137	43.2	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生	73.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	30.2	Bq/Kg生	± 6.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
牛乳	北海道	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
牛乳	兵庫県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
給食	不明	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
給食	不明	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
給食	不明	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
いちじくジャム	いわき市小川町下小川	2012年10月	Cs137	1.4	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.2	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
トマトジャム	いわき市小川町下小川	2012年9月	Cs137	2.3	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	2.3	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ハチミツ	いわき市平上高久	不明	Cs137	108	Bq/Kg生	± 22.0	Bq/Kg生	185	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	76.5	Bq/Kg生	± 15.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市四倉町狐塚	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ハチミツの巣	いわき市平上高久	不明	Cs137	176.0	Bq/Kg生	± 35.0	Bq/Kg生	293	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	117.0	Bq/Kg生	± 23.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
原木（しいたけ）	いわき市鹿島町米田	2012年11月	Cs137	346	Bq/Kg生	± 69.0	Bq/Kg生	572	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	226	Bq/Kg生	± 45.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
焼物	いわき市大久町	2012年7月	Cs137	27.0	Bq/Kg生	± 8.0	Bq/Kg生	89.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	62.0	Bq/Kg生	± 13.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
焼物	いわき市大久町	2012年7月	Cs137	47.0	Bq/Kg生	± 13.0	Bq/Kg生	57.0	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.0	Bq/Kg生	± 7.0	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
カヤ	いわき市泉町本谷	2012年10月	Cs137	12.0	Bq/Kg生	± 10.0	Bq/Kg生	42.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	30.0	Bq/Kg生	± 10.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
竹	いわき市泉町本町	2012年10月	Cs137	43.0	Bq/Kg生	± 12.0	Bq/Kg生	67.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	24.0	Bq/Kg生	± 8.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
灰（竹、カヤ）	いわき市泉町本谷	2012年11月	Cs137	972	Bq/Kg生	± 194	Bq/Kg生	1,643	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	671	Bq/Kg生	± 134	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
田土	いわき市泉町本谷	2012年10月	Cs137	237	Bq/Kg乾	± 29.0	Bq/Kg乾	358	Cs137 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	121	Bq/Kg乾	± 16.0	Bq/Kg乾		Cs134 8.0 Bq/Kg乾