



2013年1月の放射能測定結果 74件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	宮城県栗原市	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平馬目	2012年10月	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町洞	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町洞	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町井上	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県南魚沼	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県大崎市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	三重県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	長野県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮城県栗原市	2010年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県土浦市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	二本松市	2012年10月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	二本松市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	双葉郡浪江町	2012年10月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平北白土	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市平豊間	2012年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	5.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平赤井	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市鹿島町走熊	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	11.7 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	15.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町井上	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米(玄米)	南相馬市	2010年10月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち精米	いわき市鹿島町米田	2012年9月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市四倉町	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市鹿島町久保	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市渡辺町	2013年1月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根酢漬け	いわき市川前町下桶売	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
カブ	いわき市鹿島町久保	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市渡辺町	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大豆	いわき市四倉町狐塚	2012年12月	Cs137	14.8 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	18.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
カリフラワー	いわき市鹿島町久保	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市四倉町	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市桜ヶ丘	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市鹿島町久保	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市渡辺町	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	北茨城市	2012年12月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平赤井	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
白菜	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
白菜 (多種混合)	いわき市四倉町 柳生	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
水菜	いわき市桜ヶ丘	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	5.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 5.9		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ネギ	いわき市四倉町 狐塚	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 3.5		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ほうれん草	いわき市渡辺町	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
アマタケ	東白川郡塙町	2012年10月	Cs137	249	Bq/Kg生	± 50.0	409	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	160	Bq/Kg生	± 32.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ゆず	いわき市 自由が丘	2013年1月	Cs137	19.4	Bq/Kg生	± 5.0	29.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	10.1	Bq/Kg生	± 3.1		Bq/Kg生	Cs134	6.0
ゆず	いわき市小名浜 下神白	2013年1月	Cs137	22.4	Bq/Kg生	± 7.0	36.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	14.5	Bq/Kg生	± 5.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
キウイ	双葉郡檜葉町	2013年1月	Cs137	47.6	Bq/Kg生	± 10.8	80.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	32.6	Bq/Kg生	± 7.4		Bq/Kg生	Cs134	6.0
干柿 (室内干し)	いわき市小名浜 下神白	2012年10月	Cs137	15.5	Bq/Kg生	± 5.1	23.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	8.1	Bq/Kg生	± 3.6		Bq/Kg生	Cs134	6.0
給食	不明	2013年1月	Cs137	1.2	Bq/Kg生	± 1.9	1.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
給食	不明	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
給食	不明	2013年1月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 2.0	1.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
マツモ	いわき市小名浜	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	4.0
わかめ	いわき市小名浜	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
井戸水	いわき市内郷 高野町	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
井戸水	いわき市平 赤井	2013年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.9	Bq/Kg生	± 1.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
沢庵	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Bq/Kg生	Cs134	6.0
竹(おがくず)	いわき市平 赤井	2013年1月	Cs137	27.0	Bq/Kg生	± 8.0	41.0	Cs131	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	14.0	Bq/Kg生	± 5.0		Bq/Kg生	Cs128	6.0
竹(おがくず)	いわき市平 赤井	2013年1月	Cs137	236	Bq/Kg生	± 50.0	384	Cs125	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	148	Bq/Kg生	± 31.0		Bq/Kg生	Cs122	6.0
竹(おがくず)	いわき市平 赤井	2013年1月	Cs137	8.0	Bq/Kg生	± 4.0	17.0	Cs119	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	9.0	Bq/Kg生	± 3.0		Bq/Kg生	Cs116	6.0
竹(おがくず)	いわき市平 赤井	2013年1月	Cs137	20.0	Bq/Kg生	± 7.0	21.0	Cs113	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.0	Bq/Kg生	± 5.0		Bq/Kg生	Cs110	5.0
ヤマザクラ の木	いわき市小川町 上平	2013年1月	Cs137	155	Bq/Kg生	± 37.0	265	Cs107	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	110	Bq/Kg生	± 26.0		Bq/Kg生	Cs104	6.0
ナラの木	いわき市小川町 上平	2013年1月	Cs137	205	Bq/Kg生	± 44.0	343	Cs101	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	138	Bq/Kg生	± 29.0		Bq/Kg生	Cs98	6.0

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
落葉	双葉郡川内村	2013年1月	Cs137	407	Bq/Kg生	± 88.0	693	Cs95	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	286	Bq/Kg生	± 60.0		Cs92	6.0	Bq/Kg生
腐葉土	いわき市平上片寄	2012年12月	Cs137	139	Bq/Kg乾	± 38.0	193	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	54.0	Bq/Kg乾	± 20.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
腐葉土	いわき市常磐三沢町	2013年1月	Cs137	674	Bq/Kg乾	± 84.0	1,008	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	334	Bq/Kg乾	± 44.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市小川町	2013年1月	Cs137	155	Bq/Kg乾	± 5.0	215	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	60.0	Bq/Kg乾	± 5.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市川前町小白井	2012年12月	Cs137	9963	Bq/Kg乾	± 863	14,526	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	4563	Bq/Kg乾	± 402		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市川前町小白井	2012年12月	Cs137	7460	Bq/Kg乾	± 1490	12,280	Cs137	7.0	Bq/Kg乾
			Cs134	4820	Bq/Kg乾	± 960		Cs134	6.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平上片寄	2013年1月	Cs137	199	Bq/Kg乾	± 28.0	292	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	93.0	Bq/Kg乾	± 14.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平赤井	2013年1月	Cs137	250	Bq/Kg乾	± 33.0	362	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	112	Bq/Kg乾	± 18.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾

