



# 2013年2月の放射能測定結果 34件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。  
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、  
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定  
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.3	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	2.9 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町 入遠野	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	栃木県	2012年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
白米	いわき市平	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市三沢町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町 松小屋	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市平 赤井	2013年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市三沢町	2013年2月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
煎り大豆	秋田県	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ふきのとう	双葉郡楢葉町	2013年2月	Cs137	109 Bq/Kg生	± 28.4 Bq/Kg生	163	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	53.6 Bq/Kg生	± 16.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
原木椎茸	北茨城市関本町	2013年2月	Cs137	382.0 Bq/Kg生	± 76.0 Bq/Kg生	617	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	235.0 Bq/Kg生	± 47.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みかん	いわき市平 赤井	2012年12月	Cs137	16.6 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	25.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
シュウリ貝(生)	いわき市小名浜	2013年2月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
シュウリ貝(茹)	いわき市小名浜	2013年2月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市小名浜 潮見台下	2013年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市勿来町	2012年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
松藻	いわき市小名浜 潮見台下	2013年2月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	±	4.3 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
ナメタカレイ	いわき市小名浜	2013年2月	Cs137	70.5 Bq/Kg生	±	15.0 Bq/Kg生	113	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	42.3 Bq/Kg生	±	9.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
伊勢エビ	いわき市小名浜	2013年2月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	±	2.8 Bq/Kg生	9.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.8 Bq/Kg生	±	2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
鶏卵	いわき市三沢町	2013年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
給食	不明	2013年2月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	±	2.3 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
給食	不明	2013年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
給食	不明	2013年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	0.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	0.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 上三阪	2013年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
温泉水	いわき市草木台	2013年2月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.1 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.9 Bq/Kg生
池の水 (底池土)	いわき市小川町 上平	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs89	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs86	3.0 Bq/Kg生
池の水 (底池コンクリート)	いわき市小川町 上平	2013年1月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs83	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs80	3.0 Bq/Kg生
庭木・葉チップ	いわき市平 上片寄	2013年2月	Cs137	234 Bq/Kg生	±	50.0 Bq/Kg生	377	Cs77	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	143 Bq/Kg生	±	31.0 Bq/Kg生		Cs74	6.0 Bq/Kg生
竹炭	いわき市小川町 上平	2013年2月	Cs137	495 Bq/Kg生	±	99.0 Bq/Kg生	779	Cs53	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	284 Bq/Kg生	±	57.0 Bq/Kg生		Cs50	6.0 Bq/Kg生
腐葉土	いわき市平 赤井	2013年2月	Cs137	4450 Bq/Kg乾	±	890 Bq/Kg乾	7,280	Cs59	7.0 Bq/Kg乾
			Cs134	2830 Bq/Kg乾	±	570 Bq/Kg乾		Cs56	6.0 Bq/Kg乾
田土	双葉郡楢葉町	2013年2月	Cs137	995 Bq/Kg乾	±	102 Bq/Kg乾	1,435	Cs71	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	440 Bq/Kg乾	±	48.0 Bq/Kg乾		Cs68	8.0 Bq/Kg乾
田土	双葉郡楢葉町	2013年2月	Cs137	1517 Bq/Kg乾	±	148 Bq/Kg乾	2,217	Cs65	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	700 Bq/Kg乾	±	71.0 Bq/Kg乾		Cs62	8.0 Bq/Kg乾