



# 2013年3月の放射能測定結果 57件

※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。  
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にはばらつきがありますが、  
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

## ★ ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
玄米	双葉郡楢葉町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	3.4	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
玄米	双葉郡楢葉町	2011年10月	Cs137	1.5	Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	1.5	Cs137	3.9	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.6	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 下神谷	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	3.9	Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.4	Bq/Kg生
玄米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	2.8	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	2.4	Bq/Kg生
玄米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	6.9	Cs137	2.6	Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	2.3	Bq/Kg生
玄米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.0	Cs137	3.9	Bq/Kg生
			Cs134	2.5	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	3.5	Bq/Kg生
玄米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.3	Cs137	3.9	Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	3.7	Bq/Kg生
白米	福島県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	3.5	Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	3.2	Bq/Kg生
白米	双葉郡広野町	2010年秋	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.6	Cs137	3.9	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.7	Bq/Kg生
白米	いわき市平	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.4	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
白米	いわき市平 下神谷	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.7	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3	Bq/Kg生
白米	いわき市平 赤井	2012年10月	Cs137	4.8	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	4.8	Cs137	3.2	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0	Bq/Kg生
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.5	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
もち米	いわき市平 赤井	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	3.3	Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	2.9	Bq/Kg生
炊飯米	いわき市川前町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.5	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3	Bq/Kg生
じやがいも (皮付)	いわき市平 豊間	2012年6月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	1.6	Cs137	4.1	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.9	Bq/Kg生
ごぼう	いわき市川前町 上桶売	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	2.8	Bq/Kg生
			Cs134	1.2	Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	2.5	Bq/Kg生
とろろ芋	いわき市川前町	2013年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.2	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0	Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
からし菜	いわき市平赤井	2013年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 5.8 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 5.0 Bq/Kg生
小松菜(茹)	いわき市小川町前原	2013年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 3.4 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.2 Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市平上大越	2013年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.3	Cs137 3.1 Bq/Kg生
			Cs134	1.3	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 2.7 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市渡辺町	2013年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 6.7 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
つぼみ菜	いわき市平藤間	2013年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.5 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市平藤間	2013年3月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生	3.8	Cs137 7.1 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.2 Bq/Kg生
ふきのとう	いわき市平	2013年3月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	4.4	Cs137 5.2 Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134 4.8 Bq/Kg生
ふきのとう	いわき市泉町	2013年3月	Cs137	19.1	Bq/Kg生	± 6.9	Bq/Kg生	28.0	Cs137 7.6 Bq/Kg生
			Cs134	8.9	Bq/Kg生	± 4.9	Bq/Kg生		Cs134 7.1 Bq/Kg生
ふきのとう	いわき市江名	2013年3月	Cs137	21.1	Bq/Kg生	± 11.8	Bq/Kg生	21.3	Cs137 10.7 Bq/Kg生
			Cs134	0.2	Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生		Cs134 1.4 Bq/Kg生
鰯卵 (ウコツケイ)	いわき市平北白土	2013年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アワビ	北茨城市	2013年2月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 223.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
給食(保育室)	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 3.4 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 3.2 Bq/Kg生
給食	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 3.1 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 2.8 Bq/Kg生
給食	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.5	Cs137 3.4 Bq/Kg生
			Cs134	1.5	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 3.0 Bq/Kg生
小麦粉	東北	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
水道水	双葉郡楢葉町	2013年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.0	Cs137 1.8 Bq/Kg生
			Cs134	1.0	Bq/Kg生	± 1.0	Bq/Kg生		Cs134 1.7 Bq/Kg生
湧水	いわき市田人町	2013年3月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 2.1 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 1.9 Bq/Kg生
肥料	いわき市	2013年3月	Cs137	31.0	Bq/Kg生	± 8.0	Bq/Kg生	54.0	Cs47 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	23.0	Bq/Kg生	± 6.0	Bq/Kg生		Cs44 6.0 Bq/Kg生
木灰	山形県西川町	2013年3月	Cs137	120	Bq/Kg生	± 27.0	Bq/Kg生	199	Cs31 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	79.0	Bq/Kg生	± 18.0	Bq/Kg生		Cs34 6.0 Bq/Kg生
暖炉の灰	いわき市鹿島町米田	2013年3月	Cs137	9460	Bq/Kg生	± 840	Bq/Kg生	13,692	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	4232	Bq/Kg生	± 385	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
腐葉土	いわき市好間町下好間	2013年3月	Cs137	327	Bq/Kg乾	± 44.0	Bq/Kg乾	473	Cs1 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	146	Bq/Kg乾	± 23.0	Bq/Kg乾		Cs4 8.0 Bq/Kg乾
腐葉土	いわき市好間町下好間	2013年3月	Cs137	38.0	Bq/Kg乾	± 14.0	Bq/Kg乾	71.0	Cs7 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	33.0	Bq/Kg乾	± 10.0	Bq/Kg乾		Cs10 8.0 Bq/Kg乾
園庭土	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	61.0	Bq/Kg乾	± 13.0	Bq/Kg乾	86.0	Cs41 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	25.0	Bq/Kg乾	± 7.0	Bq/Kg乾		Cs38 8.0 Bq/Kg乾
園庭土	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	75.0	Bq/Kg乾	± 13.0	Bq/Kg乾	107	Cs35 8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	32.0	Bq/Kg乾	± 8.0	Bq/Kg乾		Cs32 8.0 Bq/Kg乾

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
園庭土	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	66.0 Bq/Kg乾	± 13.0 Bq/Kg乾	88.0	Cs29	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	22.0 Bq/Kg乾	± 7.0 Bq/Kg乾		Cs26	8.0 Bq/Kg乾	
園庭土	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	19.0 Bq/Kg乾	± 7.0 Bq/Kg乾	27.0	Cs23	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	8.0 Bq/Kg乾	± 5.0 Bq/Kg乾		Cs20	8.0 Bq/Kg乾	
園庭土	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	70.0 Bq/Kg乾	± 13.0 Bq/Kg乾	100	Cs17	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	30.0 Bq/Kg乾	± 8.0 Bq/Kg乾		Cs14	8.0 Bq/Kg乾	
園庭土	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	132 Bq/Kg乾	± 19.0 Bq/Kg乾	186	Cs11	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	54.0 Bq/Kg乾	± 10.0 Bq/Kg乾		Cs8	8.0 Bq/Kg乾	
園庭土	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	59.0 Bq/Kg乾	± 12.0 Bq/Kg乾	91.0	Cs5	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	32.0 Bq/Kg乾	± 8.0 Bq/Kg乾		Cs2	8.0 Bq/Kg乾	
土壤	双葉郡広野町 桜田	2013年3月	Cs137	450 Bq/Kg乾	± 50.0 Bq/Kg乾	644	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	194 Bq/Kg乾	± 24.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
土壤	いわき市遠野町 深山田	2013年3月	Cs137	1585 Bq/Kg乾	± 153 Bq/Kg乾	2,306	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	721 Bq/Kg乾	± 72.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
畳土	双葉郡広野町 上浅見川	2013年3月	Cs137	281 Bq/Kg乾	± 56.0 Bq/Kg乾	468	Cs13	7.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	187 Bq/Kg乾	± 37.0 Bq/Kg乾		Cs16	6.0 Bq/Kg乾	
畳土	双葉郡広野町 上浅見川	2013年3月	Cs137	223 Bq/Kg乾	± 45.0 Bq/Kg乾	370	Cs19	7.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	147 Bq/Kg乾	± 29.0 Bq/Kg乾		Cs22	6.0 Bq/Kg乾	
畳土	いわき市好間町	2013年3月	Cs137	128 Bq/Kg乾	± 19.0 Bq/Kg乾	184	Cs37	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	56.0 Bq/Kg乾	± 10.0 Bq/Kg乾		Cs40	8.0 Bq/Kg乾	
畳土	いわき市好間町	2013年3月	Cs137	157 Bq/Kg乾	± 25.0 Bq/Kg乾	232	Cs43	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	75.0 Bq/Kg乾	± 14.0 Bq/Kg乾		Cs46	8.0 Bq/Kg乾	
畳土	いわき市平 中平窪	2013年3月	Cs137	557 Bq/Kg乾	± 61.0 Bq/Kg乾	790	Cs49	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	233 Bq/Kg乾	± 28.0 Bq/Kg乾		Cs52	8.0 Bq/Kg乾	
畳土	いわき市常磐 上矢田	2013年3月	Cs137	48.0 Bq/Kg乾	± 11.0 Bq/Kg乾	87.0	Cs25	7.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	39.0 Bq/Kg乾	± 9.0 Bq/Kg乾		Cs28	6.0 Bq/Kg乾	
畳土	いわき市小名浜 大原	2013年3月	Cs137	159 Bq/Kg乾	± 23.0 Bq/Kg乾	237	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	78.0 Bq/Kg乾	± 12.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
畳土	いわき市遠野町 深山田	2013年3月	Cs137	173 Bq/Kg乾	± 24.0 Bq/Kg乾	246	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	73.0 Bq/Kg乾	± 12.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	

