



2013年4月の放射能測定結果 90件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	1.5	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2013年4月	Cs137	7.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	9.8	Cs137	2.8 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	2.6 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	7.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	9.0	Cs137	3.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	2.8 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市四倉町	2013年4月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	7.3 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市小名浜 上神白	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	5.4 Bq/Kg生	
カブ	いわき市小名浜 上神白	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.7 Bq/Kg生	
チンゲン菜	いわき市鹿島町 下矢田	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
長ネギ	いわき市錦町	2013年4月	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.3	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
大根葉	いわき市錦町	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
あぶら菜	いわき市常磐 西郷町	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.2 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市平 上大越	2013年3月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生	1.5	Cs137	2.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	2.5 Bq/Kg生	
長芋	いわき市鹿島町	2013年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	3.8 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市好間町 下好間	2013年4月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	7.0	Cs137	6.6 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.1 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市小名浜 岡小名	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市泉町 下川	2013年4月	Cs137	16.7 Bq/Kg生	± 6.1 Bq/Kg生	27.5	Cs137	6.6 Bq/Kg生	
			Cs134	10.8 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生		Cs134	6.2 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市泉町 下川	2013年4月	Cs137	30.2 Bq/Kg生	± 8.4 Bq/Kg生	52.1	Cs137	6.4 Bq/Kg生	
			Cs134	21.9 Bq/Kg生	± 6.2 Bq/Kg生		Cs134	5.8 Bq/Kg生	

タラの芽	いわき市田人町	2013年4月	Cs137	6.7	Bq/Kg生	±	2.7	Bq/Kg生	12.7	Cs137	3.1	Bq/Kg生
			Cs134	6.0	Bq/Kg生	±	2.3	Bq/Kg生		Cs134	2.8	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市大久町	2013年4月	Cs137	23.3	Bq/Kg生	±	5.7	Bq/Kg生	35.7	Cs137	3.3	Bq/Kg生
			Cs134	12.4	Bq/Kg生	±	3.5	Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市大久町	2013年4月	Cs137	15.0	Bq/Kg生	±	4.1	Bq/Kg生	23.2	Cs137	3.3	Bq/Kg生
			Cs134	8.2	Bq/Kg生	±	2.8	Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市大久町	2013年4月	Cs137	11.6	Bq/Kg生	±	3.4	Bq/Kg生	14.8	Cs137	3.3	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	±	2.2	Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市大久町	2013年4月	Cs137	20.6	Bq/Kg生	±	5.2	Bq/Kg生	30.1	Cs137	3.4	Bq/Kg生
			Cs134	9.5	Bq/Kg生	±	3.1	Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市好間町	2013年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.2	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	Bq/Kg生		Cs134	9.0	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市平桜町	2013年4月	Cs137	10.3	Bq/Kg生	±	3.7	Bq/Kg生	19.2	Cs137	3.8	Bq/Kg生
			Cs134	8.9	Bq/Kg生	±	3.0	Bq/Kg生		Cs134	3.3	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市平赤井	2013年4月	Cs137	18.7	Bq/Kg生	±	5.0	Bq/Kg生	29.9	Cs137	3.7	Bq/Kg生
			Cs134	11.2	Bq/Kg生	±	3.4	Bq/Kg生		Cs134	3.3	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市平赤井	2013年4月	Cs137	11.9	Bq/Kg生	±	3.8	Bq/Kg生	19.2	Cs137	3.8	Bq/Kg生
			Cs134	7.3	Bq/Kg生	±	2.8	Bq/Kg生		Cs134	3.4	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市平赤井	2013年4月	Cs137	7.2	Bq/Kg生	±	5.2	Bq/Kg生	7.2	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	Bq/Kg生		Cs134	7.3	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市渡辺町	2013年4月	Cs137	19.6	Bq/Kg生	±	5.3	Bq/Kg生	31.3	Cs137	4.1	Bq/Kg生
			Cs134	11.7	Bq/Kg生	±	3.6	Bq/Kg生		Cs134	3.9	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市鹿島町走熊	2013年4月	Cs137	104	Bq/Kg生	±	21.0	Bq/Kg生	163	Cs137	3.5	Bq/Kg生
			Cs134	58.5	Bq/Kg生	±	12.0	Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市山玉町	2013年4月	Cs137	11.9	Bq/Kg生	±	3.9	Bq/Kg生	20.5	Cs137	3.7	Bq/Kg生
			Cs134	8.6	Bq/Kg生	±	3.0	Bq/Kg生		Cs134	3.5	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市鹿島町御代	2013年4月	Cs137	8.7	Bq/Kg生	±	3.5	Bq/Kg生	15.6	Cs137	3.9	Bq/Kg生
			Cs134	6.9	Bq/Kg生	±	2.8	Bq/Kg生		Cs134	3.4	Bq/Kg生
タケノコ	いわき市小名浜	2013年4月	Cs137	21.5	Bq/Kg生	±	7.3	Bq/Kg生	28.5	Cs137	4.2	Bq/Kg生
			Cs134	7.0	Bq/Kg生	±	5.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0	Bq/Kg生
タケノコ(茹)	いわき市小川町柴原	2013年4月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	±	2.2	Bq/Kg生	2.9	Cs137	3.3	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	Bq/Kg生		Cs134	2.9	Bq/Kg生
タケノコ(茹)	いわき市平中塩	2013年4月	Cs137	14.9	Bq/Kg生	±	4.3	Bq/Kg生	25.6	Cs137	3.5	Bq/Kg生
			Cs134	10.7	Bq/Kg生	±	3.2	Bq/Kg生		Cs134	3.3	Bq/Kg生
タケノコ(茹)	いわき市平下高久	2013年4月	Cs137	100	Bq/Kg生	±	21.0	Bq/Kg生	160	Cs137	3.5	Bq/Kg生
			Cs134	60.1	Bq/Kg生	±	12.3	Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
タケノコ(茹)	いわき市鹿島町御代	2013年4月	Cs137	7.0	Bq/Kg生	±	2.4	Bq/Kg生	9.9	Cs137	2.6	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	±	1.7	Bq/Kg生		Cs134	2.5	Bq/Kg生
タケノコ(茹)	いわき市小名浜下川	2013年4月	Cs137	12.9	Bq/Kg生	±	4.1	Bq/Kg生	17.6	Cs137	4.3	Bq/Kg生
			Cs134	4.7	Bq/Kg生	±	2.8	Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
タケノコ(茹)	いわき市小名浜金成	2013年4月	Cs137	9.5	Bq/Kg生	±	3.3	Bq/Kg生	16.6	Cs137	3.4	Bq/Kg生
			Cs134	7.1	Bq/Kg生	±	2.6	Bq/Kg生		Cs134	3.1	Bq/Kg生
わらび	いわき市四倉町駒込	2013年4月	Cs137	35.5	Bq/Kg生	±	8.2	Bq/Kg生	59.5	Cs137	3.2	Bq/Kg生
			Cs134	24.0	Bq/Kg生	±	5.5	Bq/Kg生		Cs134	2.9	Bq/Kg生
わらび	いわき市鹿島町	2013年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137	4.8	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	±	2.8	Bq/Kg生		Cs134	4.2	Bq/Kg生
わらび(茹)	いわき市内郷町	2013年4月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.8	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	±	0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.5	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
わらび(茹)	いわき市泉町	2013年4月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.5	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
ゼンマイ	いわき市大久町	2013年4月	Cs137	58.8 Bq/Kg生	± 12.7 Bq/Kg生	92.9	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	34.1 Bq/Kg生	± 7.5 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
ごごみ	いわき市小名浜 金成	2013年4月	Cs137	9.5 Bq/Kg生	± 6.3 Bq/Kg生	9.5	Cs137	10.3 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	9.2 Bq/Kg生	
うど	いわき市泉町 下川	2013年4月	Cs137	25.2 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生	34.0	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	8.8 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
こしあぶら	いわき市遠野町 上遠野	2013年4月	Cs137	639 Bq/Kg生	± 128 Bq/Kg生	1,015	Cs137	6.2 Bq/Kg生	
			Cs134	376 Bq/Kg生	± 75.0 Bq/Kg生		Cs134	5.4 Bq/Kg生	
ふき	いわき市好間町	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平 幕ノ内	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.6 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平 下高久	2013年4月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	9.4	Cs137	5.8 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	5.1 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平菅波	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	9.3 Bq/Kg生	
ふき	いわき市渡辺町	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.5	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	6.5 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
茹ふき	いわき市小名浜	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
ふき(皮無)	いわき市小名浜 上神白	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	3.2 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	2.9 Bq/Kg生	
ふき(皮無)	いわき市平 赤井	2013年4月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	2.1	Cs137	5.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.2 Bq/Kg生	
アミガサタケ	いわき市小名浜	2013年4月	Cs137	13.8 Bq/Kg生	± 9.3 Bq/Kg生	18.5	Cs137	5.4 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	5.4 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市小川町 柴原	2013年4月	Cs137	52.0 Bq/Kg生	± 11.4 Bq/Kg生	81.7	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	29.7 Bq/Kg生	± 6.7 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市平菅波	2013年4月	Cs137	385 Bq/Kg生	± 77.0 Bq/Kg生	599	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	214 Bq/Kg生	± 43.0 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市平 沼ノ内	2013年4月	Cs137	1014 Bq/Kg生	± 108 Bq/Kg生	1,444	Cs137	10.2 Bq/Kg生	
			Cs134	430 Bq/Kg生	± 50.5 Bq/Kg生		Cs134	9.0 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市泉町	2013年4月	Cs137	81.5 Bq/Kg生	± 18.3 Bq/Kg生	114	Cs137	7.5 Bq/Kg生	
			Cs134	32.6 Bq/Kg生	± 8.4 Bq/Kg生		Cs134	7.0 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市小名浜	2013年4月	Cs137	122 Bq/Kg生	± 21.2 Bq/Kg生	162	Cs137	8.1 Bq/Kg生	
			Cs134	39.6 Bq/Kg生	± 10.2 Bq/Kg生		Cs134	7.2 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市小浜町	2013年4月	Cs137	10.5 Bq/Kg生	± 5.4 Bq/Kg生	15.3	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生		Cs134	6.3 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市小浜町	2013年4月	Cs137	143 Bq/Kg生	± 29.0 Bq/Kg生	215	Cs137	4.7 Bq/Kg生	
			Cs134	72.1 Bq/Kg生	± 15.0 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市遠野町 根岸	2013年4月	Cs137	93.3 Bq/Kg生	± 19.2 Bq/Kg生	148	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	54.6 Bq/Kg生	± 11.3 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市田人町	2013年4月	Cs137	130 Bq/Kg生	± 26.0 Bq/Kg生	201	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	70.7 Bq/Kg生	± 14.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市平 下山口	2013年4月	Cs137	297 Bq/Kg生	± 35.4 Bq/Kg生	416	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	119 Bq/Kg生	± 16.5 Bq/Kg生		Cs134	5.6 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
椎茸	いわき市内郷 御厩町	2013年4月	Cs137	356 Bq/Kg生	± 71.0 Bq/Kg生	569	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	213 Bq/Kg生	± 43.0 Bq/Kg生		Cs134	4.6 Bq/Kg生	
椎茸	いわき市川部町	2013年4月	Cs137	259 Bq/Kg生	± 52.0 Bq/Kg生	405	Cs137	4.8 Bq/Kg生	
			Cs134	146 Bq/Kg生	± 29.0 Bq/Kg生		Cs134	4.5 Bq/Kg生	
甘夏	いわき市泉町	2013年4月	Cs137	12.2 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生	20.5	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	8.3 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
甘夏柑 マーマレード	いわき市内郷	2013年2月	Cs137	11.2 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	16.0	Cs137	2.7 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	2.5 Bq/Kg生	
牡蠣(茹)	いわき市小名浜	2013年3月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	24.3	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	24.3 Bq/Kg生	± 5.7 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
イワナ	いわき市 四時川上流	2013年4月	Cs137	151 Bq/Kg生	± 21.9 Bq/Kg生	222	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	71.4 Bq/Kg生	± 11.3 Bq/Kg生		Cs134	5.2 Bq/Kg生	
イワナ	いわき市 四時川上流	2013年4月	Cs137	142 Bq/Kg生	± 20.6 Bq/Kg生	200	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	57.7 Bq/Kg生	± 10.0 Bq/Kg生		Cs134	5.3 Bq/Kg生	
わかめ(茹)	いわき市平 薄磯	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
給食	不明	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
給食	不明	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
給食	不明	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	2.9 Bq/Kg生	
ぬか床	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
ぬか床	不明	2013年4月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	5.8	Cs137	2.9 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	2.6 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市平 赤井	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.8	Cs137	1.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.8 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	1.7 Bq/Kg生	
木のチップ	いわき市鹿島町	2013年4月	Cs137	2118 Bq/Kg生	± 224 Bq/Kg生	2,995	Cs107	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	877 Bq/Kg生	± 102 Bq/Kg生		Cs104	8.0 Bq/Kg生	
木炭	いわき市田人町	2011年11月	Cs137	6030 Bq/Kg生	± 1240 Bq/Kg生	9,590	Cs89	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3560 Bq/Kg生	± 710 Bq/Kg生		Cs86	6.0 Bq/Kg生	
砂浜(表層)	不明	不明	Cs137	9.0 Bq/Kg乾	± 4.0 Bq/Kg乾	9.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	0.0 Bq/Kg乾	± 0.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
砂浜(15cm)	不明	不明	Cs137	4.0 Bq/Kg乾	± 5.0 Bq/Kg乾	7.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	3.0 Bq/Kg乾	± 4.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
砂浜(30cm)	不明	不明	Cs137	11.0 Bq/Kg乾	± 5.0 Bq/Kg乾	11.0	Cs131	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	0.0 Bq/Kg乾	± 2.0 Bq/Kg乾		Cs128	8.0 Bq/Kg乾	
砂浜(50cm)	不明	不明	Cs137	11.0 Bq/Kg乾	± 5.0 Bq/Kg乾	11.0	Cs125	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	0.0 Bq/Kg乾	± 2.0 Bq/Kg乾		Cs122	8.0 Bq/Kg乾	
畑土	いわき市平 赤井	2013年4月	Cs137	253 Bq/Kg乾	± 33.0 Bq/Kg乾	351	Cs101	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	98.0 Bq/Kg乾	± 16.0 Bq/Kg乾		Cs98	8.0 Bq/Kg乾	
畑土	いわき市中央台 飯野	2013年4月	Cs137	78.0 Bq/Kg乾	± 16.0 Bq/Kg乾	114	Cs119	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	36.0 Bq/Kg乾	± 9.0 Bq/Kg乾		Cs116	8.0 Bq/Kg乾	
畑土	いわき市錦町	2013年4月	Cs137	170 Bq/Kg乾	± 24.0 Bq/Kg乾	232	Cs113	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	62.0 Bq/Kg乾	± 12.0 Bq/Kg乾		Cs110	8.0 Bq/Kg乾	
公園の土	いわき市中央台 高久	2013年4月	Cs137	240 Bq/Kg乾	± 31.0 Bq/Kg乾	333	Cs95	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	93.0 Bq/Kg乾	± 15.0 Bq/Kg乾		Cs92	8.0 Bq/Kg乾	