



2018年11月の放射能測定結果 171件



測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市小浜町	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	0.8 Bq/kg生
玄米	いわき市平小泉	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.1 Bq/kg生
玄米	山形県	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	0.8 Bq/kg生
白米	いわき市平中神谷	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	0.8 Bq/kg生
白米	いわき市常磐	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	0.7 Bq/kg生
白米	石川郡石川町	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	0.8 Bq/kg生
じゃがいも	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.0 Bq/kg生
じゃがいも(皮付き)	いわき市常磐	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.4 Bq/kg生
里芋(皮)	茨城県	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.8 Bq/kg生
山いも	石川郡平田村	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.5 Bq/kg生
山いも(皮付き)	いわき市泉が丘	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.4 Bq/kg生
さつまいも	いわき市泉町滝尻	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.4 Bq/kg生
さつまいも	いわき市勿来町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.3 Bq/kg生
大根(身)	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.3 Bq/kg生
大根(葉)	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.5 Bq/kg生
大根(身)	相馬市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.3 Bq/kg生
大根(葉)	相馬市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.3 Bq/kg生
大根	石川郡平田村	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.3 Bq/kg生
かぶ(葉付き)	相馬市沖ノ内	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	0.8 Bq/kg生
かぶ(身)	いわき市常磐	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	—		Cs134	1.7 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
かぶ(葉)	いわき市常磐	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
かぶ(ヘタ・皮)	いわき市常磐	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.4 Bq/kg生
赤かぶ	いわき市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
キャベツ	いわき市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
白菜	福島県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
白菜	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
白菜	いわき市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
小松菜	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	5.4 Bq/kg生	±	2.7 Bq/kg生	5.4	Cs137	3.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.5 Bq/kg生
春菊	安達郡大玉村	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
春菊	いわき市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
からし菜	いわき市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
ブロッコリー	いわき市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
ヤーコン	いわき市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
かぼちゃ	いわき市広野町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
はやとうり	安達郡大玉村	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
冬瓜(種・綿)	南会津郡下郷町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
冬瓜(皮)	南会津郡下郷町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.2 Bq/kg生
ゆず	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	5.4 Bq/kg生	±	1.3 Bq/kg生	5.4	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
ゆず	いわき市泉が丘	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
ゆず	いわき市鹿島町	2018年11月	Cs137	6.5 Bq/kg生	±	1.6 Bq/kg生	6.5	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
ゆず	いわき市小名浜上神白	2018年11月	Cs137	2.1 Bq/kg生	±	0.9 Bq/kg生	2.1	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ゆず	いわき市錦町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
渋柿(実)	福島県	2018年11月	Cs137	2.5 Bq/kg生	±	0.9 Bq/kg生	2.5	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
柿(実)	相馬郡飯館村	2018年11月	Cs137	1.9 Bq/kg生	±	0.9 Bq/kg生	1.9	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
柿(ヘタ・皮)	相馬郡飯館村	2018年11月	Cs137	3.5 Bq/kg生	±	1.8 Bq/kg生	3.5	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
柿(実)	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
柿(ヘタ・皮)	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	2.6 Bq/kg生	±	1.0 Bq/kg生	2.6	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
柿(実)	相馬市中村字	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
柿(実)	安達郡大玉村	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
柿(ヘタ・皮)	安達郡大玉村	2018年10月	Cs137	4.2 Bq/kg生	±	1.9 Bq/kg生	4.2	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
柿(皮付き)	いわき市泉が丘	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
柿(実)	いわき 小名浜花畑町	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
柿(皮・種)	いわき 小名浜花畑町	2018年10月	Cs137	4.1 Bq/kg生	±	2.3 Bq/kg生	4.1	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
渋柿(皮・種)	いわき市江名町	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
りんご(皮付き)	福島県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
りんご(実)	福島県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
りんご (ヘタ・皮)	福島県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
りんご(実)	福島県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
みかん(実)	いわき市 小名浜岡小名	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
みかん(皮)	いわき市 小名浜岡小名	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
みかん(実)	いわき市 小名浜上神白	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
みかん(皮)	いわき市 小名浜上神白	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.2 Bq/kg生
みかん(実)	静岡県熱海市	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
みかん(皮)	静岡県熱海市	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
かりん	相馬郡飯館村	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
かりん	いわき市洋向台	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
キウイ	相馬市中村字	2018年11月	Cs137	2.0 Bq/kg生	±	0.7 Bq/kg生	2.0	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
キウイ	いわき市鹿島町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ラ・フランス (実)	山形県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
ラ・フランス (皮)	山形県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
マゾイ(全身)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	13.1 Bq/kg生	±	3.7 Bq/kg生	13.1	Cs137	4.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.3 Bq/kg生
マゾイ(身)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	4.1 Bq/kg生	±	1.4 Bq/kg生	4.1	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
マゾイ(頭)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
マゾイ(骨)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
マゾイ(内臓)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	5.5 Bq/kg生	±	3.1 Bq/kg生	5.5	Cs137	4.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.1 Bq/kg生
マゾイ(全身)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
オキメバル (全身)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	2.1 Bq/kg生	±	1.9 Bq/kg生	2.1	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
オキメバル (全身)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
ブリ(全身)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	2.5 Bq/kg生	±	1.2 Bq/kg生	2.5	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
サメ(身)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	8.6 Bq/kg生	±	1.9 Bq/kg生	8.6	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
サメ(頭)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	3.2 Bq/kg生	±	1.1 Bq/kg生	3.2	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
サメ(骨・皮)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	8.2 Bq/kg生	±	2.3 Bq/kg生	8.2	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
サメ(内臓)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	3.7 Bq/kg生	±	1.3 Bq/kg生	3.7	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
サケ(全身)	双葉郡広野町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
サバ(小魚)	いわき市 小名浜沖	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
タラ(全身)	岩手県 上閉伊郡大槌町	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
地下水	双葉郡双葉町	2018年11月	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.8 Bq/L
川水	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	0.022 Bq/L	±	0.010 Bq/L	0.022	Cs137	0.016 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	— Bq/L
海水A(表層)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	0.029 Bq/L	±	0.011 Bq/L	0.029	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	— Bq/L
海水A(下層)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	0.035 Bq/L	±	0.010 Bq/L	0.035	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	— Bq/L
海水B(表層)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	0.028 Bq/L	±	0.010 Bq/L	0.028	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	— Bq/L
海水B(下層)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	0.020 Bq/L	±	0.010 Bq/L	0.020	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	— Bq/L

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
海水C(表層)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	0.023 Bq/L	± 0.010 Bq/L	0.023	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	— Bq/L
海水C(下層)	福島第二原発沖	2018年10月	Cs137	0.023 Bq/L	± 0.010 Bq/L	0.023	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	— Bq/L
干し芋	茨城県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
梅干し	安達郡大玉村	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
大豆	伊達市伏黒	2018年10月	Cs137	1.0 Bq/kg生	± 0.6 Bq/kg生	1.0	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
大豆(青豆)	山形県	2018年	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
大麦	国産	2018年	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
米ぬか	不明	2018年	Cs137	1.6 Bq/kg生	± 0.9 Bq/kg生	1.6	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
甘酒	会津若松市	不明	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ひら茸	安達郡大玉村	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
原木しいたけ	いわき市 平下山口	2018年11月	Cs137	137.0 Bq/kg生	± 27.0 Bq/kg生	151.6	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	14.6 Bq/kg生	± 3.2 Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
原木しいたけ	神奈川県川崎市	2018年11月	Cs137	3.6 Bq/kg生	± 1.0 Bq/kg生	3.6	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
原木しいたけ	熊本県	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
はちみつ	伊達市伏黒	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
しょうゆ	いわき市小川町	2018年	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
米味噌	いわき市小川町	2018年	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
食塩	中国	不明	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
てんさい糖	北海道	2018年	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
米麴	不明	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
茶葉	静岡県	2018年	Cs137	5.1 Bq/kg生	± 2.5 Bq/kg生	5.1	Cs137	3.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.3 Bq/kg生
茶葉	静岡県	2018年	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
ヨーグルト	郡山市	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
緑茶 (ペットボトル)	国産	2018年	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
オレンジジュース	国産	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
グレープジュース	国産	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
給食	いわき市 内郷高坂	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.7 Bq/kg生
給食	いわき市 内郷高坂	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.7 Bq/kg生
給食	いわき市 常磐松が台	2018年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
みつろう	伊達市伏黒	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
落ち葉	いわき市広野町	2018年11月	Cs137	79.2 Bq/kg生	±	16.8 Bq/kg生	79.2	Cs137	8.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	7.9 Bq/kg生
松の葉	双葉郡大熊町	2018年10月	Cs137	23000.0 Bq/kg生	±	4600.0 Bq/kg生	25590.0	Cs137	61.7 Bq/kg生
			Cs134	2590.0 Bq/kg生	±	520.0 Bq/kg生		Cs134	60.8 Bq/kg生
南天の実	双葉郡大熊町	2018年10月	Cs137	2900.0 Bq/kg生	±	580.0 Bq/kg生	3218.0	Cs137	139.0 Bq/kg生
			Cs134	318.0 Bq/kg生	±	106.0 Bq/kg生		Cs134	133.0 Bq/kg生
葉	双葉郡大熊町	2018年10月	Cs137	1035.0 Bq/kg生	±	139.1 Bq/kg生	1161.0	Cs137	85.4 Bq/kg生
			Cs134	126.0 Bq/kg生	±	57.9 Bq/kg生		Cs134	76.6 Bq/kg生
灰(木材)	いわき市 平下神谷	2018年11月	Cs137	840.0 Bq/kg生	±	168.0 Bq/kg生	959.0	Cs137	3.1 Bq/kg生
			Cs134	119.0 Bq/kg生	±	24.0 Bq/kg生		Cs134	2.8 Bq/kg生
苔	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	16300.0 Bq/kg生	±	3300.0 Bq/kg生	18100.0	Cs137	27.5 Bq/kg生
			Cs134	1800.0 Bq/kg生	±	360.0 Bq/kg生		Cs134	26.0 Bq/kg生
苔	いわき市錦町	2018年11月	Cs137	1240.0 Bq/kg生	±	250.0 Bq/kg生	1373.0	Cs137	6.4 Bq/kg生
			Cs134	133.0 Bq/kg生	±	27.0 Bq/kg生		Cs134	6.0 Bq/kg生
苔	いわき市 遠野町入遠野	2018年10月	Cs137	80.5 Bq/kg生	±	16.1 Bq/kg生	95.7	Cs137	3.1 Bq/kg生
			Cs134	15.2 Bq/kg生	±	3.5 Bq/kg生		Cs134	2.4 Bq/kg生
土壌	相馬市飯館村	2018年11月	Cs137	7140.0 Bq/kg乾	±	772.0 Bq/kg乾	7879.0	Cs137	12.1 Bq/kg乾
			Cs134	739.0 Bq/kg乾	±	94.8 Bq/kg乾		Cs134	11.0 Bq/kg乾
土壌	相馬市飯館村	2018年11月	Cs137	4750.0 Bq/kg乾	±	513.0 Bq/kg乾	5236.0	Cs137	10.5 Bq/kg乾
			Cs134	486.0 Bq/kg乾	±	62.5 Bq/kg乾		Cs134	9.7 Bq/kg乾
土壌	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	1600.0 Bq/kg乾	±	175.0 Bq/kg乾	1771.0	Cs137	7.0 Bq/kg乾
			Cs134	171.0 Bq/kg乾	±	22.6 Bq/kg乾		Cs134	7.8 Bq/kg乾
土壌	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	1350.0 Bq/kg乾	±	147.0 Bq/kg乾	1497.0	Cs137	7.6 Bq/kg乾
			Cs134	147.0 Bq/kg乾	±	19.4 Bq/kg乾		Cs134	9.3 Bq/kg乾
土壌	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	1005.0 Bq/kg乾	±	116.0 Bq/kg乾	1120.0	Cs137	7.0 Bq/kg乾
			Cs134	115.0 Bq/kg乾	±	15.7 Bq/kg乾		Cs134	8.6 Bq/kg乾
土壌	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	895.0 Bq/kg乾	±	95.8 Bq/kg乾	980.9	Cs137	7.3 Bq/kg乾
			Cs134	85.9 Bq/kg乾	±	11.4 Bq/kg乾		Cs134	8.6 Bq/kg乾
土壌	相馬市	2018年11月	Cs137	191.0 Bq/kg乾	±	21.7 Bq/kg乾	207.6	Cs137	3.8 Bq/kg乾
			Cs134	16.6 Bq/kg乾	±	3.1 Bq/kg乾		Cs134	5.2 Bq/kg乾
土壌	いわき市 泉町滝尻	2018年10月	Cs137	68.1 Bq/kg乾	±	8.1 Bq/kg乾	75.9	Cs137	3.7 Bq/kg乾
			Cs134	7.8 Bq/kg乾	±	1.8 Bq/kg乾		Cs134	4.7 Bq/kg乾
土壌	埼玉県 さいたま市	2018年11月	Cs137	227.0 Bq/kg乾	±	26.2 Bq/kg乾	246.6	Cs137	5.6 Bq/kg乾
			Cs134	19.6 Bq/kg乾	±	3.7 Bq/kg乾		Cs134	8.3 Bq/kg乾
土壌	埼玉県 さいたま市	2018年11月	Cs137	134.0 Bq/kg乾	±	15.7 Bq/kg乾	144.2	Cs137	5.6 Bq/kg乾
			Cs134	10.2 Bq/kg乾	±	2.4 Bq/kg乾		Cs134	8.1 Bq/kg乾
土壌	神奈川県川崎市	2018年11月	Cs137	79.6 Bq/kg乾	±	9.8 Bq/kg乾	86.7	Cs137	1.6 Bq/kg乾
			Cs134	7.1 Bq/kg乾	±	2.2 Bq/kg乾		Cs134	2.0 Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
灰土	熊本県阿蘇市 (阿蘇山)	2018年10月	Cs137	— Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾		Cs134	1.7 Bq/kg乾
掃除機のゴミ (dyson)	南相馬市鹿島区	2018年11月	Cs137	2730.0 Bq/kg生	±	550.0 Bq/kg生	2996.0	Cs137	58.1 Bq/kg生
			Cs134	266.0 Bq/kg生	±	62.0 Bq/kg生		Cs134	47.6 Bq/kg生
掃除機のゴミ	いわき市常磐	2018年11月	Cs137	450.3 Bq/kg生	±	46.1 Bq/kg生	482.2	Cs137	14.0 Bq/kg生
			Cs134	31.9 Bq/kg生	±	10.9 Bq/kg生		Cs134	13.0 Bq/kg生
掃除機のゴミ (日立サイクロン式)	いわき市常磐	2018年10月	Cs137	211.0 Bq/kg生	±	44.0 Bq/kg生	235.5	Cs137	20.2 Bq/kg生
			Cs134	24.5 Bq/kg生	±	13.0 Bq/kg生		Cs134	19.8 Bq/kg生
掃除機のゴミ (日立サイクロン式)	いわき市 小名浜大原	2018年10月	Cs137	40.8 Bq/kg生	±	10.1 Bq/kg生	40.8	Cs137	10.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	7.7 Bq/kg生
空気清浄機 フィルター	いわき市 小名浜上神白	2018年11月	Cs137	1640.0 Bq/kg生	±	330.0 Bq/kg生	1819.0	Cs137	9.7 Bq/kg生
			Cs134	179.0 Bq/kg生	±	36.0 Bq/kg生		Cs134	9.1 Bq/kg生
空気中のダスト	勿来第一中学校 (校庭)	2018年10月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0042 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³
空気中のダスト	勿来第二中学校 (校庭)	2018年10月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0041 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³
空気中のダスト	川部中学校 (校庭)	2018年10月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0045 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³
空気中のダスト	上遠野中学校 (校庭)	2018年10月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0049 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³
空気中のダスト	入遠野中学校 (校庭)	2018年11月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0042 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³
空気中のダスト	四倉中学校 (校庭)	2018年11月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0039 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³
空気中のダスト	若葉台保育園 (園庭)	2018年11月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0045 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³
空気中のダスト	船尾保育園 (園庭)	2018年11月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0044 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ただし0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

★ベータ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		検出下限値	
まかじき(肝)	いわき沖	2018年10月	T (組織)	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	1.31	Bq/kg乾
月桃の葉	沖縄県久米島	2018年9月	T (組織)	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	1.67	Bq/kg乾
じゃがいも	青森県六ヶ所村	2018年9月	T (自由)	検出下限値以下 Bq/L	±	— Bq/L	1.98	Bq/L
まかじき(身)	いわき沖	2018年10月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	0.16	Bq/kg乾
まかじき(骨)	いわき沖	2018年10月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	0.14	Bq/kg乾
まかじき(肝)	いわき沖	2018年10月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	0.16	Bq/kg乾
青しそ	茨城県 常陸太田市真弓町	2018年7月	Sr90	1.44 Bq/kg乾	±	0.19 Bq/kg乾	0.28	Bq/kg乾
桑の葉	茨城県 常陸太田市真弓町	2018年7月	Sr90	3.62 Bq/kg乾	±	0.55 Bq/kg乾	0.67	Bq/kg乾
松の葉	茨城県 那珂郡東海村	2018年7月	Sr90	1.33 Bq/kg乾	±	0.44 Bq/kg乾	0.63	Bq/kg乾
土壌	茨城県 常陸太田市真弓町	2018年7月	Sr90	4.68 Bq/kg乾	±	1.25 Bq/kg乾	1.86	Bq/kg乾
土壌	茨城県 常陸太田市真弓町	2018年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	2.02	Bq/kg乾
土壌	茨城県 那珂郡東海村	2018年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	2.02	Bq/kg乾
土壌(赤土)	沖縄県久米島	2018年9月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾	1.64	Bq/kg乾
海水A(上層)	福島第二原発沖	2018年10月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	±	— Bq/L	0.0017	Bq/L
海水	沖縄県久米島	2018年9月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	±	— Bq/L	0.0011	Bq/L
湧き水	沖縄県久米島	2018年9月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	±	— Bq/L	0.0015	Bq/L
深層水	沖縄県久米島	2018年9月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	±	— Bq/L	0.0020	Bq/L

※検出下限値以下とは、必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。