2019年6月の放射能測定結果 158件

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

★ガンマ線

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市小川町	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
白米	栃木県大田原市	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
じゃがいも	千葉県旭市	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
玉ねぎ	北海道	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
大根	いわき市小名浜上神白	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
大根菜	いわき市小名浜上神白	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
きゅうり	福島県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.7 Bq/kg生
きゅうり	いわき市遠野町入遠野	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
紫きゃべつ	茨城県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
レタス	福島県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
かぼちゃ	茨城県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ピーマン	茨城県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
ブロッコリー	いわき市錦町	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
にら	茨城県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ズッキーニ	栃木県大田原市	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
小松菜	いわき市平下神谷	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.7 Bq/kg生
ゴーヤ	福島県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
アスパラガス	福島県会津	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
らっきょう	福島県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
らっきょう	宮城県角田市	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
　決ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

★ガンマ線

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
そら豆	福島県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
そら豆	茨城県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
トマト	いわき市	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
大葉	茨城県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.5 Bq/kg生
赤しそ	群馬県	2019年4月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
葉しょうが（身）	福島県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
みょうがたけ	いわき市 平下神谷	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	3.0 Bq/kg生
ケール	福島県白河市	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
ハーブ（ミント）	いわき市 平下神谷	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.6 Bq/kg生
ハーブ（セージ）	いわき市 平下神谷	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.7 Bq/kg生
小玉すいか	茨城県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
メロン	茨城県旭村	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
ブルーベリー	福島県福島市 松本	2019年6月	Cs137	4.8 Bq/kg生	± 1.2 Bq/kg生	4.8	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
青梅（種付き）	福島県	2019年6月	Cs137	2.7 Bq/kg生	± 0.8 Bq/kg生	2.7	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
青梅（実）	福島県河沼郡 柳津町	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
青梅（種付き）	いわき市 平下神谷	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
青梅（種付き）	いわき市小名浜 御殿後	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
青梅（実）	いわき市永崎 地切	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
青梅（種）	いわき市永崎 地切	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
青梅（種付き）	いわき市泉が丘	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
青梅（種付き）	いわき市遠野町	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
ひめたけ（生）	福島県河沼郡 柳津町	2019年6月	Cs137	96.5 Bq/kg生	± 19.3 Bq/kg生	105.5	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	9.0 Bq/kg生	± 2.2 Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
ひめたけ（葉）	福島県河沼郡 柳津町	2019年6月	Cs137	153.0 Bq/kg生	± 31.0 Bq/kg生	168.0	Cs137	4.3 Bq/kg生
			Cs134	15.0 Bq/kg生	± 4.0 Bq/kg生		Cs134	3.9 Bq/kg生
たけのこ（生）	福島県平田村	2019年6月	Cs137	2.7 Bq/kg生	± 1.0 Bq/kg生	2.7	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
　必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

★ガンマ線

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
たけのこ（生）	福島県平田村	2019年6月	Cs137	1.2 Bq/kg生	± 0.7 Bq/kg生	1.2	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
たけのこ（生）	いわき市 平下神谷	2019年6月	Cs137	49.6 Bq/kg生	± 5.6 Bq/kg生	54.0	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	4.4 Bq/kg生	± 1.7 Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
たけのこ（生）	いわき市小名浜 観音作	2019年6月	Cs137	24.9 Bq/kg生	± 5.0 Bq/kg生	27.9	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	3.0 Bq/kg生	± 0.8 Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
たけのこ（生）	いわき市遠野町	2019年6月	Cs137	7.5 Bq/kg生	± 1.8 Bq/kg生	7.5	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
たけのこ①（生） 先端部分	いわき市遠野町	2019年6月	Cs137	4.2 Bq/kg生	± 2.0 Bq/kg生	4.2	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
たけのこ①（生） 根元付近	いわき市遠野町	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.2 Bq/kg生
切干大根	いわき市平	2019年2月	Cs137	56.4 Bq/kg生	± 5.6 Bq/kg生	56.4	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
切干大根	福島県大沼郡 金山町	2019年2月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	4.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	4.1 Bq/kg生
ぜんまい（乾燥）	福島県大沼郡 三島町	2019年4月	Cs137	63.7 Bq/kg生	± 7.9 Bq/kg生	63.7	Cs137	3.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	3.0 Bq/kg生
ふき	福島県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
ふき	福島県大沼郡 三島町	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
原木しいたけ	福島県河沼郡 柳津町	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
しめじ	宮城県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
まいたけ	新潟県	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
豚肉	山形県米沢市	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
いのしし・オス （心臓）	いわき市 永崎地切	2019年6月	Cs137	21.8 Bq/kg生	± 4.1 Bq/kg生	21.8	Cs137	2.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
いのしし・オス （肝臓）	いわき市 永崎地切	2019年6月	Cs137	12.3 Bq/kg生	± 2.6 Bq/kg生	12.3	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
ポークウインナー	国産	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
いわし（身）	いわき市小名浜沖	2019年6月	Cs137	2.1 Bq/kg生	± 0.8 Bq/kg生	2.1	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
アイナメ（全身）	いわき市小名浜沖	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
さば・いわし このしろ	いわき市小名浜沖	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
ほたて（蒸し）	青森県	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
いわし（煮干し）	静岡県富士宮市	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	7.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	5.7 Bq/kg生
わかめ（乾燥）	三陸産 （岩手・宮城）	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
　必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

★ガンマ線

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
米味噌	福島県河沼郡会津坂下町	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
ソース	群馬県館林市	2019年4月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
醤油加工調味料	茨城県土浦市	不明	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
岩塩	ドイツ	不明	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.2 Bq/kg生
塩	オーストラリア	不明	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ガーリック（フライド）	いわき市泉町	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
えごま（粉末）	福島県鮫川村	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
きな粉	福島県鮫川村	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
片栗粉	北海道	2019年5月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
デザートベース（いちご）	愛知県江南市	不明	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
赤ワイン	いわき市好間町	2018年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
井戸水	いわき市川前町下桶売	2019年5月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	— Bq/L
山水	いわき市川前町下桶売	2019年5月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.019 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	— Bq/L
海水（表層）	福島第一原発沖	2019年4月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.016 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	— Bq/L
海水（下層）	福島第一原発沖	2019年4月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.017 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	— Bq/L
桜の葉	いわき市小名浜諏訪町	2019年6月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
苔	いわき市常磐	2019年6月	Cs137	919.0 Bq/kg生	± 184.0 Bq/kg生	1027.0	Cs137	2.7 Bq/kg生
			Cs134	108.0 Bq/kg生	± 22.0 Bq/kg生		Cs134	2.6 Bq/kg生
土壌	いわき市小川町上小川	2019年5月	Cs137	1590.0 Bq/kg乾	± 176.0 Bq/kg乾	1707.0	Cs137	7.8 Bq/kg乾
			Cs134	117.0 Bq/kg乾	± 18.6 Bq/kg乾		Cs134	8.4 Bq/kg乾
土壌①	いわき市常磐湯本町	2019年6月	Cs137	370.0 Bq/kg乾	± 42.2 Bq/kg乾	398.6	Cs137	11.2 Bq/kg乾
			Cs134	28.6 Bq/kg乾	± 5.1 Bq/kg乾		Cs134	15.0 Bq/kg乾
土壌②	いわき市常磐湯本町	2019年6月	Cs137	190.0 Bq/kg乾	± 22.7 Bq/kg乾	206.3	Cs137	7.4 Bq/kg乾
			Cs134	16.3 Bq/kg乾	± 3.7 Bq/kg乾		Cs134	9.3 Bq/kg乾
土壌③	いわき市常磐湯本町	2019年6月	Cs137	175.0 Bq/kg乾	± 21.7 Bq/kg乾	196.5	Cs137	7.2 Bq/kg乾
			Cs134	21.5 Bq/kg乾	± 4.1 Bq/kg乾		Cs134	10.9 Bq/kg乾
土壌（自宅表）	いわき市小名浜住吉	2019年6月	Cs137	512.0 Bq/kg乾	± 56.4 Bq/kg乾	551.3	Cs137	5.4 Bq/kg乾
			Cs134	39.3 Bq/kg乾	± 6.5 Bq/kg乾		Cs134	7.4 Bq/kg乾
土壌（自宅裏）	いわき市小名浜住吉	2019年6月	Cs137	499.0 Bq/kg乾	± 54.5 Bq/kg乾	539.8	Cs137	5.3 Bq/kg乾
			Cs134	40.8 Bq/kg乾	± 6.3 Bq/kg乾		Cs134	6.2 Bq/kg乾
土壌①	いわき市遠野町	2019年6月	Cs137	777.0 Bq/kg乾	± 88.4 Bq/kg乾	842.4	Cs137	5.2 Bq/kg乾
			Cs134	65.4 Bq/kg乾	± 10.8 Bq/kg乾		Cs134	5.9 Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
　必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

★ガンマ線

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
土壌②	いわき市遠野町	2019年6月	Cs137	370.0 Bq/kg乾	± 40.1 Bq/kg乾	403.1	Cs137	4.1 Bq/kg乾
			Cs134	33.1 Bq/kg乾	± 4.5 Bq/kg乾		Cs134	4.8 Bq/kg乾
土壌（雨どい下）	いわき市勿来町窪田	2019年6月	Cs137	5730.0 Bq/kg乾	± 618.0 Bq/kg乾	6218.0	Cs137	18.1 Bq/kg乾
			Cs134	488.0 Bq/kg乾	± 63.6 Bq/kg乾		Cs134	16.9 Bq/kg乾
土壌（側溝）	いわき市植田町	2019年6月	Cs137	1900.0 Bq/kg乾	± 209.0 Bq/kg乾	2049.0	Cs137	11.4 Bq/kg乾
			Cs134	149.0 Bq/kg乾	± 21.9 Bq/kg乾		Cs134	12.3 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県薄磯海岸①	2019年5月	Cs137	9.1 Bq/kg乾	± 1.2 Bq/kg乾	9.1	Cs137	1.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.2 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	19.3 Bq/kg乾	± 2.3 Bq/kg乾	22.0	Cs137	1.3 Bq/kg乾
			Cs134	2.7 Bq/kg乾	± 0.6 Bq/kg乾		Cs134	2.1 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	56.7 Bq/kg乾	± 7.5 Bq/kg乾	62.3	Cs137	2.3 Bq/kg乾
			Cs134	5.6 Bq/kg乾	± 1.7 Bq/kg乾		Cs134	3.6 Bq/kg乾
海砂（深さ50cm）			Cs137	219.0 Bq/kg乾	± 24.4 Bq/kg乾	238.9	Cs137	5.3 Bq/kg乾
			Cs134	19.9 Bq/kg乾	± 3.6 Bq/kg乾		Cs134	6.4 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県薄磯海岸②	2019年5月	Cs137	10.1 Bq/kg乾	± 1.4 Bq/kg乾	10.1	Cs137	1.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.6 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	41.9 Bq/kg乾	± 6.2 Bq/kg乾	41.9	Cs137	4.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	7.6 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	52.0 Bq/kg乾	± 7.9 Bq/kg乾	59.6	Cs137	2.7 Bq/kg乾
			Cs134	7.6 Bq/kg乾	± 2.7 Bq/kg乾		Cs134	4.3 Bq/kg乾
海砂（深さ50cm）			Cs137	32.7 Bq/kg乾	± 4.7 Bq/kg乾	32.7	Cs137	2.4 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	4.1 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県薄磯海岸③	2019年5月	Cs137	10.9 Bq/kg乾	± 1.7 Bq/kg乾	10.9	Cs137	1.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.2 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	6.8 Bq/kg乾	± 1.1 Bq/kg乾	6.8	Cs137	1.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.2 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	13.8 Bq/kg乾	± 3.1 Bq/kg乾	13.8	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	3.3 Bq/kg乾
海砂（深さ50cm）			Cs137	23.7 Bq/kg乾	± 3.0 Bq/kg乾	23.7	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	3.5 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県薄磯海岸④	2019年5月	Cs137	11.3 Bq/kg乾	± 2.0 Bq/kg乾	11.3	Cs137	4.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	5.3 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県勿来海岸①	2019年5月	Cs137	8.6 Bq/kg乾	± 1.4 Bq/kg乾	8.6	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.6 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	9.8 Bq/kg乾	± 1.5 Bq/kg乾	9.8	Cs137	2.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.4 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	25.3 Bq/kg乾	± 3.4 Bq/kg乾	25.3	Cs137	3.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	6.1 Bq/kg乾
海砂（深さ50cm）			Cs137	49.1 Bq/kg乾	± 5.6 Bq/kg乾	54.0	Cs137	2.1 Bq/kg乾
			Cs134	4.9 Bq/kg乾	± 1.0 Bq/kg乾		Cs134	2.8 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県勿来海岸②	2019年5月	Cs137	6.5 Bq/kg乾	± 1.1 Bq/kg乾	6.5	Cs137	2.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.5 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	9.3 Bq/kg乾	± 1.6 Bq/kg乾	9.3	Cs137	3.5 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	4.7 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	19.4 Bq/kg乾	± 2.7 Bq/kg乾	19.4	Cs137	3.4 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	3.9 Bq/kg乾
海砂（深さ50cm）			Cs137	30.9 Bq/kg乾	± 4.1 Bq/kg乾	30.9	Cs137	3.6 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	4.2 Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
　必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

★ガンマ線

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
海砂（表層）	福島県 勿来海岸③	2019年5月	Cs137	43.9 Bq/kg乾	± 6.6 Bq/kg乾	43.9	Cs137	7.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	6.7 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	35.3 Bq/kg乾	± 5.3 Bq/kg乾	35.3	Cs137	3.5 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	4.1 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	45.9 Bq/kg乾	± 5.4 Bq/kg乾	49.5	Cs137	2.1 Bq/kg乾
			Cs134	3.6 Bq/kg乾	± 1.0 Bq/kg乾		Cs134	3.4 Bq/kg乾
海砂（深さ50cm）			Cs137	53.5 Bq/kg乾	± 6.9 Bq/kg乾	53.5	Cs137	3.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	6.0 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県 勿来海岸④	2019年5月	Cs137	8.7 Bq/kg乾	± 1.7 Bq/kg乾	8.7	Cs137	1.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.3 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	22.1 Bq/kg乾	± 3.1 Bq/kg乾	22.1	Cs137	3.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	5.9 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	42.9 Bq/kg乾	± 5.1 Bq/kg乾	42.9	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	3.4 Bq/kg乾
海砂（表層）	福島県 勿来海岸⑤	2019年5月	Cs137	17.2 Bq/kg乾	± 2.2 Bq/kg乾	17.2	Cs137	2.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	3.5 Bq/kg乾
海砂（深さ10cm）			Cs137	16.6 Bq/kg乾	± 2.2 Bq/kg乾	16.6	Cs137	1.6 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.9 Bq/kg乾
海砂（深さ30cm）			Cs137	33.0 Bq/kg乾	± 4.3 Bq/kg乾	33.0	Cs137	3.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	3.0 Bq/kg乾
掃除機のゴミ	いわき市小名浜 上神白	2019年6月	Cs137	588.0 Bq/kg生	± 118.0 Bq/kg生	650.9	Cs137	9.2 Bq/kg生
			Cs134	62.9 Bq/kg生	± 14.0 Bq/kg生		Cs134	8.3 Bq/kg生
掃除機のゴミ（日立サイクロン式）	いわき市常磐 水野谷	2019年6月	Cs137	179.6 Bq/kg生	± 22.0 Bq/kg生	189.5	Cs137	7.8 Bq/kg生
			Cs134	9.9 Bq/kg生	± 7.2 Bq/kg生		Cs134	7.4 Bq/kg生
雑巾（室内ドアふき取り後）	いわき市小名浜 諏訪町	2019年6月	Cs137	122.4 Bq/kg生	± 13.7 Bq/kg生	122.4	Cs137	6.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	4.4 Bq/kg生
掃除シート（塵・埃）	いわき市小名浜 大原	2019年6月	Cs137	510.0 Bq/kg生	± 32.3 Bq/kg生	542.3	Cs137	8.3 Bq/kg生
			Cs134	32.3 Bq/kg生	± 7.9 Bq/kg生		Cs134	7.9 Bq/kg生
掃除シート（塵・埃）	いわき市小名浜	2019年6月	Cs137	434.0 Bq/kg生	± 89.0 Bq/kg生	434.0	Cs137	32.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	31.9 Bq/kg生
掃除シート（サッシ・塵・埃）	いわき市小名浜 諏訪町	2019年6月	Cs137	367.0 Bq/kg生	± 73.0 Bq/kg生	408.1	Cs137	15.7 Bq/kg生
			Cs134	41.1 Bq/kg生	± 11.3 Bq/kg生		Cs134	12.4 Bq/kg生
掃除シート（サッシ・塵・埃）	いわき市泉が丘	2019年6月	Cs137	5340.0 Bq/kg生	± 1070.0 Bq/kg生	5762.0	Cs137	30.0 Bq/kg生
			Cs134	422.0 Bq/kg生	± 86.0 Bq/kg生		Cs134	25.3 Bq/kg生
空気中のダスト	小名浜第二中学校（校庭）	2019年5月	Cs137	— Bq/m³	± — Bq/m³	検出下限値以下	Cs137	0.0050 Bq/m³
			Cs134	— Bq/m³	± — Bq/m³		Cs134	— Bq/m³
空気中のダスト	鹿島小学校（校庭）	2019年6月	Cs137	— Bq/m³	± — Bq/m³	検出下限値以下	Cs137	0.0058 Bq/m³
			Cs134	— Bq/m³	± — Bq/m³		Cs134	— Bq/m³
空気中のダスト	永崎小学校（校庭）	2019年6月	Cs137	— Bq/m³	± — Bq/m³	検出下限値以下	Cs137	0.0052 Bq/m³
			Cs134	— Bq/m³	± — Bq/m³		Cs134	— Bq/m³
空気中のダスト	勿来第一小学校（校庭）	2019年6月	Cs137	— Bq/m³	± — Bq/m³	検出下限値以下	Cs137	0.0055 Bq/m³
			Cs134	— Bq/m³	± — Bq/m³		Cs134	— Bq/m³
空気中のダスト	中央台幼稚園（校庭）	2019年6月	Cs137	— Bq/m³	± — Bq/m³	検出下限値以下	Cs137	0.0051 Bq/m³
			Cs134	— Bq/m³	± — Bq/m³		Cs134	— Bq/m³
空気中のダスト	東田保育園（校庭）	2019年6月	Cs137	— Bq/m³	± — Bq/m³	検出下限値以下	Cs137	0.0039 Bq/m³
			Cs134	— Bq/m³	± — Bq/m³		Cs134	— Bq/m³
空気中のダスト	菊田保育所（校庭）	2019年6月	Cs137	— Bq/m³	± — Bq/m³	検出下限値以下	Cs137	0.0050 Bq/m³
			Cs134	— Bq/m³	± — Bq/m³		Cs134	— Bq/m³

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
　必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

★ベータ線

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	検出下限値
松ぼっくり	沖縄県久米島	2018年6月	T（組織）	検出下限値以下 Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	1.28 Bq/kg乾
カレイ	福島第一原発沖	2018年7月	T（組織）	検出下限値以下 Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	1.24 Bq/kg乾
海水A（下層）	福島第二原発沖	2019年4月	T（自由）	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	1.98 Bq/L
海水B（下層）	福島第一原発沖	2019年4月	T（自由）	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	2.02 Bq/L
海水C（表層）	福島第一原発沖	2019年4月	T（自由）	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	2.02 Bq/L
海水C（下層）	福島第一原発沖	2019年4月	T（自由）	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	2.02 Bq/L
ヤマメ	いわき市田人町	2015年3月	Sr90	0.22 Bq/kg乾	± 0.07 Bq/kg乾	0.10 Bq/kg乾
いわし	いわき市小名浜沖	2019年6月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	0.12 Bq/kg乾
アイナメ（身）	福島第一原発沖	2017年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	0.11 Bq/kg乾
マコガレイ（全身）	福島第一原発沖	2017年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	0.12 Bq/kg乾
フグ（全身）	福島第一原発沖	2017年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	0.17 Bq/kg乾
銀杏	いわき市川前町下桶売	2014年10月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	0.18 Bq/kg乾
ミルク	ウクライナナロージチ	2013年6月	Sr90	3.35 Bq/kg乾	± 0.14 Bq/kg乾	0.17 Bq/kg乾
南天	双葉郡大熊町大河原	2015年11月	Sr90	6.04 Bq/kg乾	± 0.31 Bq/kg乾	0.40 Bq/kg乾
井戸水	いわき市川前町下桶売	2019年5月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	0.0016 Bq/L
山水	いわき市川前町下桶売	2019年5月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	0.0015 Bq/L
海水A（下層）	福島第二原発沖	2019年4月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	0.0015 Bq/L
海水B（下層）	福島第一原発沖	2019年4月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± — Bq/L	0.0014 Bq/L

※検出下限値以下とは、必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima