



2020年1月の放射能測定結果 165件



測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

★ガンマ線

測定器		特長	下限値目安※	
NaIシンチレーションスペクトロメータ				
ATOMTEX社製AT1320A	BERTHOLD社製LB2045	・ NaIシンチレーション検出器を搭載した ガンマ線スペクトロメータ	食材（試料1kg）	下限値 1.0Bq/Kg
			土壌（試料1kg）	下限値 2.5Bq/Kg
			資材（試料1kg）	下限値 1.0Bq/Kg
			水（試料20L）	下限値 0.02Bq/L
ゲルマニウム半導体検出器				
ORTEC GEM30-70		・ 放射能測定法シリーズ 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 スペクトロメトリ」に準拠した定量分析 ・ 相対効率35%	食材（試料2kg）	下限値 0.04Bq/Kg
			土壌（試料1kg）	下限値 0.06Bq/Kg
			資材（試料1kg）	下限値 0.06Bq/Kg
			水（試料20L）	下限値 0.001Bq/L

※下限値は、試料の重量・測定時間で変動があります。

測定器：NaIシンチレーションスペクトロメータ (Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
白米	福島県双葉郡大熊町	2019年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
白米	いわき市錦町	2019年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.6 Bq/kg生
白米	栃木県大田原市	2019年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.7 Bq/kg生
白米	新潟県新発田市	2019年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
玄米	新潟県新発田市	2019年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.6 Bq/kg生
じゃがいも	宮城県名取市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
じゃがいも	鹿児島県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
里芋	茨城県つくば市谷田部	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
里芋(水煮)	福島県郡山市田村町	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
さつまいも	福島県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
干し芋	茨城県銚田市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
人参	福島県郡山市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
玉ねぎ	北海道	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
大根(実)	いわき市平下神谷	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
大根(葉)	いわき市平下神谷	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
大根	福島県会津若松市神指町	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ごぼう(細切り)	青森県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
白菜	茨城県つくば市谷田部	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
白菜	茨城県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
白菜	宮城県名取市愛島台	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
フリルレタス	いわき市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
きゅうり	静岡県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
ねぎ	いわき市遠野町入遠野	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
葉ねぎ	いわき市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
あさつき(茎)	福島県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
あさつき(根)	福島県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	6.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.7 Bq/kg生
かぼちゃ	いわき市遠野町	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
トマト	宮城県石巻市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ブロッコリー	静岡県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
カリフラワー	いわき市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
セロリ	静岡県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
小松菜	茨城県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
菜の花	茨城県北茨城市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
菜花	宮城県名取市愛島台	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
山うど	群馬県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
ふきのとう(栽培)	福島県田村郡三春町	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.2 Bq/kg生
りんご	福島県石川郡石川町	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
りんご	福島県福島市下飯坂	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
みかん(皮)	神奈川県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
みかん(実)	和歌山県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
みかん(皮)	和歌山県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
キウイ	栃木県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
ぶどう (スチューベン)	青森県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
金柑	いわき市平下神谷	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
原木しいたけ	福島県田村市	2019年12月	Cs137	87.5 Bq/kg生	±	17.5 Bq/kg生	95.1	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	7.6 Bq/kg生	±	2.0 Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
なめこ(身)	福島県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
なめこ(根)	福島県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	9.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	7.1 Bq/kg生
きくらげ (水煮)	栃木県那須郡	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
きくらげ (水煮の水)	栃木県那須郡	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
いのしし・オス (心臓・肝臓)	いわき市折戸	2020年1月	Cs137	46.0 Bq/kg生	±	9.2 Bq/kg生	46.0	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
いのしし (身)	神奈川県丹沢	2019年2月	Cs137	17.9 Bq/kg生	±	3.6 Bq/kg生	17.9	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
メバル(全身)	富岡港	2020年1月	Cs137	1.0 Bq/kg生	±	0.6 Bq/kg生	1.0	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
カレイ(一夜干し)	福島県南相馬市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
ホキ(身)	ニュージーランド	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
さば(水煮)	青森県八戸市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
茎わかめ	宮城県松島湾	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
米味噌	福島県相馬市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.7 Bq/kg生
米味噌	福島県会津若松市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.5 Bq/kg生
砂糖 (さとうきび使用)	沖縄県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
パン粉	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	5.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	5.6 Bq/kg生
ホットケーキ ミックス	不明	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
お好み焼き粉	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
すいとん粉	不明	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
上新粉	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
青大豆きな粉	東北地方	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	4.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.7 Bq/kg生
スポーツ栄養飲料 (粉末)	不明	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
お茶の葉	静岡県牧ノ原	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
牛乳	福島県南相馬市 原町区	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
牛乳	山形県西村山郡 河北町	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
牛乳	岩手県二戸郡 一戸町	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
牛乳	千葉県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
のむヨーグルト	山形県酒田市 市条	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
カフェオレ	千葉県八千代市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
オレンジジュース	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
オレンジジュース	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
タピオカほうじ茶	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
赤ワイン	スペイン	2001年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
赤ワイン	フランス	2004年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
赤ワイン	チリ	2012年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
めんつゆ (希釈用)	千葉県香取市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
パスタソース	長野県	2021年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
麺用ソース	不明	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
卵	福島県東白川郡 塙町	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.6 Bq/kg生
凍り豆腐	長野県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	4.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.4 Bq/kg生
金時豆	北海道	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
こんにゃく	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ポテトサラダ	滋賀県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生	
フィッシュソーセージ	東京都八王子市	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生	
麺サラダ(揚げ)	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.9 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	3.3 Bq/kg生	
やきそば	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生	
つぶあん	北海道	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生	
クリームシチュー(粉末タイプ)	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生	
ポテトチップス	国産	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生	
豆菓子	国産	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	4.2 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	3.4 Bq/kg生	
どんぐり	いわき市葉山	2020年1月	Cs137	4.3 Bq/kg生	± 1.1 Bq/kg生	4.3	Cs137	1.0 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生	
菊	不明	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.3 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.5 Bq/kg生	
榊	不明	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	7.6 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	7.4 Bq/kg生	
髪の毛	いわき市	2019年10月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	5.9 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	4.6 Bq/kg生	
苔	いわき市錦町	2020年1月	Cs137	1690.0 Bq/kg生	± 340.0 Bq/kg生	1875.0	Cs137	18.6 Bq/kg生	
			Cs134	185.0 Bq/kg生	± 39.0 Bq/kg生		Cs134	17.9 Bq/kg生	
土壌①	いわき市常磐湯本町	2020年1月	Cs137	11900.0 Bq/kg乾	± 1290.0 Bq/kg乾	12750.0	Cs137	33.7 Bq/kg乾	
			Cs134	850.0 Bq/kg乾	± 114.0 Bq/kg乾		Cs134	33.4 Bq/kg乾	
土壌②	いわき市常磐湯本町	2020年1月	Cs137	28.8 Bq/kg乾	± 4.0 Bq/kg乾	28.8	Cs137	4.7 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	5.5 Bq/kg乾	
土壌	いわき市小名浜花畑町	2020年1月	Cs137	4490.0 Bq/kg乾	± 501.0 Bq/kg乾	4812.0	Cs137	22.6 Bq/kg乾	
			Cs134	322.0 Bq/kg乾	± 46.6 Bq/kg乾		Cs134	22.8 Bq/kg乾	
土壌	いわき市泉ヶ丘	2020年1月	Cs137	807.0 Bq/kg乾	± 88.6 Bq/kg乾	861.4	Cs137	8.0 Bq/kg乾	
			Cs134	54.4 Bq/kg乾	± 8.8 Bq/kg乾		Cs134	11.0 Bq/kg乾	
土壌①	いわき市内郷御厩町	2020年1月	Cs137	36.6 Bq/kg乾	± 4.9 Bq/kg乾	36.6	Cs137	4.0 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	4.6 Bq/kg乾	
土壌②	いわき市内郷御厩町	2020年1月	Cs137	24.0 Bq/kg乾	± 3.4 Bq/kg乾	24.0	Cs137	3.9 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	4.5 Bq/kg乾	
掃除シート	いわき市小名浜花畑町	2019年12月	Cs137	127.8 Bq/kg生	± 17.4 Bq/kg生	127.8	Cs137	11.1 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	9.5 Bq/kg生	
掃除機のごみ	福島県二本松市長折	2019年10月	Cs137	421.0 Bq/kg生	± 84.0 Bq/kg生	467.3	Cs137	4.2 Bq/kg生	
			Cs134	46.3 Bq/kg生	± 9.6 Bq/kg生		Cs134	3.7 Bq/kg生	
掃除機のごみ①(HITACHI充電式)	いわき市小名浜花畑町	2019年10月	Cs137	332.2 Bq/kg生	± 33.7 Bq/kg生	352.7	Cs137	10.0 Bq/kg生	
			Cs134	20.5 Bq/kg生	± 7.5 Bq/kg生		Cs134	9.0 Bq/kg生	
掃除機のごみ②(HITACHI充電式)	いわき市小名浜花畑町	2019年12月	Cs137	331.1 Bq/kg生	± 41.6 Bq/kg生	331.1	Cs137	22.6 Bq/kg生	
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	17.7 Bq/kg生	
掃除機のごみ(紙パック式)	いわき市泉町玉露	2019年3月	Cs137	150.0 Bq/kg生	± 30.0 Bq/kg生	166.7	Cs137	5.3 Bq/kg生	
			Cs134	16.7 Bq/kg生	± 4.5 Bq/kg生		Cs134	4.7 Bq/kg生	

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
掃除機のごみ (Dyson)	いわき市小名浜 大原	2019年11月	Cs137	112.0 Bq/kg生	±	22.0 Bq/kg生	112.0	Cs137	7.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	5.8 Bq/kg生
掃除機のごみ	いわき市葉山	2019年12月	Cs137	84.5 Bq/kg生	±	11.4 Bq/kg生	84.5	Cs137	6.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.9 Bq/kg生
掃除機のごみ (日立サイクロン式)	いわき市小名浜 大原	2019年11月	Cs137	84.3 Bq/kg生	±	15.3 Bq/kg生	84.3	Cs137	12.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	10.5 Bq/kg生
掃除機のごみ (三菱サイクロン式)	いわき市小名浜 玉川	2019年10月	Cs137	62.9 Bq/kg生	±	10.0 Bq/kg生	62.9	Cs137	7.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	5.8 Bq/kg生
掃除機のごみ	東京都武蔵野市	2019年10月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	7.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	7.5 Bq/kg生
掃除機のごみ (紙パック式)	東京都八王子市 絹ヶ丘	2019年12月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.5 Bq/kg生
空気中のダスト	植田中学校	2020年1月	Cs137	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³	検出下限値以下	Cs137	0.0049 Bq/m ³
			Cs134	— Bq/m ³	±	— Bq/m ³		Cs134	— Bq/m ³

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ガンマ線

測定器		特長	下限値目安※	
NaIシンチレーションスペクトロメータ				
ATOMTEX社製AT1320A	BERTHOLD社製LB2045	・ NaIシンチレーション検出器を搭載した ガンマ線スペクトルメータ	食材（試料1kg）	下限値 1.0Bq/Kg
			土壌（試料1kg）	下限値 2.5Bq/Kg
			資材（試料1kg）	下限値 1.0Bq/Kg
			水（試料20L）	下限値 0.02Bq/L
ゲルマニウム半導体検出器				
ORTEC GEM30-70		・ 放射能測定法シリーズ 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 スペクトロメトリー」に準拠した定量分析 ・ 相対効率35%	食材（試料2kg）	下限値 0.04Bq/Kg
			土壌（試料1kg）	下限値 0.06Bq/Kg
			資材（試料1kg）	下限値 0.06Bq/Kg
			水（試料20L）	下限値 0.001Bq/L

※下限値は、試料の重量・測定時間で変動があります。

測定器：ゲルマニウム半導体検出器

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
きゅうり	静岡県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.06 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.06 Bq/kg生
たまねぎ	北海道	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.07 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.08 Bq/kg生
ブロッコリー	静岡県	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.06 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.06 Bq/kg生
りんご	福島県二本松市	2019年11月	Cs137	1.01 Bq/kg生	±	0.03 Bq/kg生	1.10	Cs137	0.04 Bq/kg生
			Cs134	0.09 Bq/kg生	±	0.02 Bq/kg生		Cs134	0.02 Bq/kg生
りんご	福島県飯坂	2019年11月	Cs137	1.51 Bq/kg生	±	0.03 Bq/kg生	1.59	Cs137	0.04 Bq/kg生
			Cs134	0.08 Bq/kg生	±	0.01 Bq/kg生		Cs134	0.03 Bq/kg生
りんご①	長野県	2019年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.04 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.04 Bq/kg生
りんご②	長野県	2019年11月	Cs137	0.14 Bq/kg生	±	0.02 Bq/kg生	0.14	Cs137	0.04 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.03 Bq/kg生
ゆずジャム	不明	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
鶏肉	ブラジル	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.06 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.06 Bq/kg生
ホキ(魚)	国産	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.06 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.06 Bq/kg生
お魚ソーセージ	ニュージーランド	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.06 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.06 Bq/kg生
ホタテパウダー	青森県陸奥湾	2020年1月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.03 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.03 Bq/kg生
生卵	福島県東白川郡塙町	2019年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.04 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.04 Bq/kg生
米みそ	福島県	2019年9月	Cs137	0.73 Bq/kg生	±	0.01 Bq/kg生	0.77	Cs137	0.03 Bq/kg生
			Cs134	0.04 Bq/kg生	±	0.01 Bq/kg生		Cs134	0.02 Bq/kg生
米みそ	福島県郡山市田村町	2019年11月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.02 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.02 Bq/kg生
濃口醤油	福島県福島市瀬上町	2019年9月	Cs137	0.36 Bq/L	±	0.01 Bq/L	0.36	Cs137	0.02 Bq/L
			Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.02 Bq/L
粉ミルク	国産	2019年9月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.06 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.06 Bq/kg生

※検出下限値以下とは、必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

★ガンマ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
牛乳	福島県郡山市 田村町	2019年10月	Cs137	0.04 Bq/L	± 0.01 Bq/L	0.04	Cs137	0.03 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.03 Bq/L	
牛乳	福島県南相馬市 原町区	2020年1月	Cs137	0.15 Bq/L	± 0.02 Bq/L	0.15	Cs137	0.04 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.04 Bq/L	
牛乳	岩手県 奥中山高原	2020年1月	Cs137	0.16 Bq/L	± 0.02 Bq/L	0.16	Cs137	0.03 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.04 Bq/L	
牛乳	山形県西村山郡	2020年1月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.04 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.04 Bq/L	
牛乳	千葉県野田市	2020年1月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.04 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.04 Bq/L	
水道水	いわき市小川町	2019年11月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.001 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L	
海水	セラフィールド 核施設周辺	2019年10月	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.3 Bq/L	
海水 表層	富岡港	2019年11月	Cs137	0.042 Bq/L	± 0.0010 Bq/L	0.044	Cs137	0.001 Bq/L	
			Cs134	0.002 Bq/L	± 0.0006 Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L	
海水 下層	富岡港	2019年11月	Cs137	0.090 Bq/L	± 0.0014 Bq/L	0.096	Cs137	0.001 Bq/L	
			Cs134	0.006 Bq/L	± 0.0006 Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L	
海水 表層	福島第一原発沖	2019年11月	Cs137	0.017 Bq/L	± 0.0007 Bq/L	0.017	Cs137	0.001 Bq/L	
			Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L	
海水 下層	福島第一原発沖	2019年11月	Cs137	0.109 Bq/L	± 0.0015 Bq/L	0.116	Cs137	0.001 Bq/L	
			Cs134	0.007 Bq/L	± 0.0007 Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L	
海水 表層	福島第一原発沖	2019年11月	Cs137	0.031 Bq/L	± 0.0009 Bq/L	0.033	Cs137	0.001 Bq/L	
			Cs134	0.002 Bq/L	± 0.0005 Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L	
海水 下層	福島第一原発沖	2019年11月	Cs137	0.040 Bq/L	± 0.0010 Bq/L	0.043	Cs137	0.001 Bq/L	
			Cs134	0.003 Bq/L	± 0.0006 Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L	
海砂	高知県安芸郡 東洋	2019年10月	Cs137	0.26 Bq/kg乾	± 0.02 Bq/kg乾	0.26	Cs137	0.05 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	0.04 Bq/kg乾	
海砂	徳島県海部郡 海陽町	2019年10月	Cs137	0.10 Bq/kg乾	± 0.02 Bq/kg乾	0.10	Cs137	0.04 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	0.04 Bq/kg乾	

※検出下限値以下とは、必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



★ベータ線

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月		測定結果	不確かさ	検出下限値
水道水	いわき市常磐	2019年10月	T (自由)	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	2.15 Bq/L
水道水	いわき市小名浜 花畑町	2019年10月	T (自由)	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	2.15 Bq/L
松ぼっくりA	佐賀県 玄海原発周辺	2019年9月	T (組織)	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	1.26 Bq/kg乾
松ぼっくりC	佐賀県 玄海原発周辺	2019年9月	T (組織)	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	1.64 Bq/kg乾
松ぼっくりC-2	佐賀県 玄海原発周辺	2019年9月	T (組織)	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	1.65 Bq/kg乾
れんこん	茨城県	2016年6月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.19 Bq/kg乾
じゃがいも	茨城県常陸太田市	2019年8月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.17 Bq/kg乾
ソイ(全身)	新潟県	2016年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.12 Bq/kg乾
ソイ(頭・骨)	福島県相馬沖	2019年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.11 Bq/kg乾
ホタテ(身)	青森県陸奥湾	2017年9月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.14 Bq/kg乾
松の葉	茨城県大洗	2019年9月	Sr90	2.90 Bq/kg乾	± 0.35 Bq/kg乾	0.33 Bq/kg乾
松の葉	茨城県東海村	2019年9月	Sr90	0.82 Bq/kg乾	± 0.31 Bq/kg乾	0.44 Bq/kg乾
土壌	茨城県東海村	2018年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.85 Bq/kg乾
土壌①	福島県双葉郡 富岡町	2019年12月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	1.57 Bq/kg乾
土壌②	福島県双葉郡 富岡町	2019年12月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	1.65 Bq/kg乾
土壌③	福島県双葉郡 富岡町	2019年12月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	1.52 Bq/kg乾

※検出下限値以下とは、必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

