



2022年3月の放射能測定結果 232件



測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

測定器		特長	下限値目安※
NaIシンチレーションスペクトロメータ			
ATOMTEX社製AT1320A	BERTHOLD社製LB2045	・ NaIシンチレーション検出器を搭載したガンマ線スペクトルメータ	食材（試料1kg）下限値 1.0Bq/Kg
			土壌（試料1kg）下限値 2.5Bq/Kg
			資材（試料1kg）下限値 1.0Bq/Kg
			水（試料20L）下限値 0.02Bq/L

測定器：NaIシンチレーションスペクトロメータ (Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	福島県田村市都路町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
じゃがいも	福島県二本松市	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
里いも	福島県双葉郡広野町	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.2 Bq/kg生
長いも	福島県郡山市交積町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生
キクイモ	福島県伊達市保原町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生
キクイモ	福島県本宮市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.3 Bq/kg生
さつまいも	福島県双葉郡檜葉町	2022年2月	Cs137	3.9 Bq/kg生	± 1.5 Bq/kg生	3.9	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
さつまいも	千葉県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	3.1 Bq/kg生
干しいも	茨城県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
かぼちゃ	福島県耶麻郡猪苗代町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
人参	福島県双葉郡檜葉町	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生
人参	福島県郡山市湖南町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.4 Bq/kg生
人参	福島県伊達市霊山町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.4 Bq/kg生
人参	いわき市錦町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生
葉玉ねぎ	福島県田村市都路町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生
大根(実)	福島県双葉郡檜葉町	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.3 Bq/kg生
大根(実)	福島県相馬市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
大根(葉)	福島県相馬市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.1 Bq/kg生
大根(実)	福島県郡山市 三穂田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.9 Bq/kg生
大根(葉)	福島県郡山市 三穂田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.4 Bq/kg生
大根(実)	福島県本宮市	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生
大根(実)	神奈川県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.5 Bq/kg生
凍み大根	福島県郡山市 田村町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	5.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.5 Bq/kg生
かぶ(実)	福島県相馬市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.3 Bq/kg生
かぶ(葉)	福島県相馬市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.7 Bq/kg生
かぶ(実)	福島県郡山市 三穂田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
かぶ(葉)	福島県郡山市 三穂田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.4 Bq/kg生
かぶ(実)	千葉県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
かぶ(葉)	千葉県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.2 Bq/kg生
赤かぶ	福島県二本松市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.6 Bq/kg生
きゅうり	福島県南相馬市 原町区	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
きゅうり	茨城県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
きゅうり	茨城県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
ズッキーニ	茨城県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.3 Bq/kg生
キャベツ	福島県郡山市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.8 Bq/kg生
紫キャベツ	茨城県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.1 Bq/kg生
白菜	福島県郡山市 三穂田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.9 Bq/kg生
ブロッコリー	福島県相馬市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.5 Bq/kg生
ほうれん草	福島県双葉郡 川内村	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
ほうれん草	福島県田村市 都路町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.2 Bq/kg生
ほうれん草	福島県郡山市 安積町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	5.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.8 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
こまつ菜	福島県郡山市 三穂田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.2 Bq/kg生
チンゲン菜	福島県郡山市 喜久田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
春菊	福島県双葉郡 楢葉町	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
春菊	福島県伊達郡 桑折町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
水菜	福島県二本松市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
菜の花	千葉県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.6 Bq/kg生
あぶら菜	いわき市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	4.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.0 Bq/kg生
アイスプラント	福島県会津	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.7 Bq/kg生
紅名苣	福島県郡山市 大槻町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.2 Bq/kg生
大葉	福島県郡山市 逢瀬町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	5.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.5 Bq/kg生
ごぼう	福島県郡山市 西田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.4 Bq/kg生
ごぼう	福島県二本松市	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.5 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.3 Bq/kg生
ヤーコン	福島県双葉郡 広野町	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
もやし	福島県相馬市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.5 Bq/kg生
ねぎ	福島県双葉郡 広野町	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県須賀川市	2022年3月	Cs137	6.8 Bq/kg生	±	4.0 Bq/kg生	6.8	Cs137	5.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.4 Bq/kg生
ふきのとう	福島県河沼郡 会津坂下町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	3.5 Bq/kg生
ふき	愛知県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
山うど	秋田県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
干しぜんまい	福島県南会津郡 只見町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	3.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.9 Bq/kg生
原木しいたけ	福島県郡山市 中田町	2022年3月	Cs137	10.0 Bq/kg生	±	2.3 Bq/kg生	10.0	Cs137	1.7 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
エリンギ	いわき市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
りんご(実)	福島県須賀川市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
りんご(皮・芯)	福島県須賀川市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.1 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
りんご(実)	福島県二本松市	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.1 Bq/kg生
りんご(皮・芯)	福島県二本松市	2022年2月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.0 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.6 Bq/kg生
いちご	福島県	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
キウイフルーツ	福島県郡山市 三穂田町	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.2 Bq/kg生
小麦粉	福島県郡山市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.2 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.0 Bq/kg生
三五八(米麴)	福島県郡山市	2022年3月	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.6 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.5 Bq/kg生
土壌(公園内)	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	1380.0 Bq/kg乾	±	140.0 Bq/kg乾	1421.2	Cs137	2.1 Bq/kg乾
			Cs134	41.2 Bq/kg乾	±	4.7 Bq/kg乾		Cs134	2.2 Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	1280.0 Bq/kg乾	±	130.0 Bq/kg乾	1318.0	Cs137	1.9 Bq/kg乾
			Cs134	38.0 Bq/kg乾	±	4.4 Bq/kg乾		Cs134	1.9 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	694.0 Bq/kg乾	±	71.4 Bq/kg乾	720.1	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	26.1 Bq/kg乾	±	3.2 Bq/kg乾		Cs134	2.8 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	680.0 Bq/kg乾	±	70.7 Bq/kg乾	700.9	Cs137	2.8 Bq/kg乾
			Cs134	20.9 Bq/kg乾	±	2.8 Bq/kg乾		Cs134	3.5 Bq/kg乾
土壌(公園内) ぶらんこ下	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	435.0 Bq/kg乾	±	44.6 Bq/kg乾	450.5	Cs137	1.4 Bq/kg乾
			Cs134	15.5 Bq/kg乾	±	1.9 Bq/kg乾		Cs134	1.6 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	393.0 Bq/kg乾	±	40.3 Bq/kg乾	405.6	Cs137	1.6 Bq/kg乾
			Cs134	12.6 Bq/kg乾	±	1.7 Bq/kg乾		Cs134	1.9 Bq/kg乾
土壌(公園内) てつぼう下	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	320.0 Bq/kg乾	±	34.1 Bq/kg乾	331.5	Cs137	2.8 Bq/kg乾
			Cs134	11.5 Bq/kg乾	±	2.0 Bq/kg乾		Cs134	3.4 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代堂ノ前児童遊園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	313.0 Bq/kg乾	±	33.2 Bq/kg乾	323.2	Cs137	2.6 Bq/kg乾
			Cs134	10.2 Bq/kg乾	±	1.7 Bq/kg乾		Cs134	3.4 Bq/kg乾
土壌(公園内) 大型遊具	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	798.0 Bq/kg乾	±	81.7 Bq/kg乾	824.4	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	26.4 Bq/kg乾	±	3.2 Bq/kg乾		Cs134	2.3 Bq/kg乾
土壌(公園内) 木の下	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	747.0 Bq/kg乾	±	76.2 Bq/kg乾	771.2	Cs137	1.6 Bq/kg乾
			Cs134	24.2 Bq/kg乾	±	2.9 Bq/kg乾		Cs134	1.9 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	454.0 Bq/kg乾	±	46.7 Bq/kg乾	467.7	Cs137	1.6 Bq/kg乾
			Cs134	13.7 Bq/kg乾	±	1.8 Bq/kg乾		Cs134	1.8 Bq/kg乾
土壌(公園内) 大型遊具下	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	416.0 Bq/kg乾	±	43.9 Bq/kg乾	430.4	Cs137	2.8 Bq/kg乾
			Cs134	14.4 Bq/kg乾	±	2.1 Bq/kg乾		Cs134	3.6 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	346.0 Bq/kg乾	±	36.4 Bq/kg乾	357.4	Cs137	2.4 Bq/kg乾
			Cs134	11.4 Bq/kg乾	±	1.9 Bq/kg乾		Cs134	2.9 Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	297.0 Bq/kg乾	±	30.6 Bq/kg乾	305.4	Cs137	1.2 Bq/kg乾
			Cs134	8.4 Bq/kg乾	±	1.2 Bq/kg乾		Cs134	1.6 Bq/kg乾
土壌(公園内) 遊具トンネル	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	266.0 Bq/kg乾	±	27.6 Bq/kg乾	275.3	Cs137	1.3 Bq/kg乾
			Cs134	9.3 Bq/kg乾	±	1.3 Bq/kg乾		Cs134	1.6 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	255.0 Bq/kg乾	±	26.3 Bq/kg乾	262.9	Cs137	1.2 Bq/kg乾
			Cs134	7.9 Bq/kg乾	±	1.1 Bq/kg乾		Cs134	1.5 Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	137.0 Bq/kg乾	±	15.0 Bq/kg乾	141.6	Cs137	1.8 Bq/kg乾
			Cs134	4.6 Bq/kg乾	±	1.0 Bq/kg乾		Cs134	2.3 Bq/kg乾
土壌(公園内) ぶらんこ下	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	104.0 Bq/kg乾	±	11.5 Bq/kg乾	104.0	Cs137	3.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	±	— Bq/kg乾		Cs134	2.8 Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
土壌(公園内) すべり台下	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	90.5	Bq/kg乾	± 10.0	Bq/kg乾	94.8	Cs137	1.7	Bq/kg乾
			Cs134	4.3	Bq/kg乾	± 0.9	Bq/kg乾		Cs134	2.0	Bq/kg乾
土壌(公園内)	御代団地公園 いわき市鹿島町	2022年2月	Cs137	84.3	Bq/kg乾	± 9.5	Bq/kg乾	87.7	Cs137	1.7	Bq/kg乾
			Cs134	3.4	Bq/kg乾	± 0.9	Bq/kg乾		Cs134	2.1	Bq/kg乾
土壌(公園内)	柿境児童遊園 いわき市鹿島町御代	2022年2月	Cs137	408.0	Bq/kg乾	± 41.8	Bq/kg乾	420.6	Cs137	1.3	Bq/kg乾
			Cs134	12.6	Bq/kg乾	± 1.6	Bq/kg乾		Cs134	1.6	Bq/kg乾
土壌(公園内)	柿境児童遊園 いわき市鹿島町御代	2022年2月	Cs137	327.0	Bq/kg乾	± 34.4	Bq/kg乾	337.9	Cs137	2.6	Bq/kg乾
			Cs134	10.9	Bq/kg乾	± 1.7	Bq/kg乾		Cs134	3.3	Bq/kg乾
土壌(公園内)	柿境児童遊園 いわき市鹿島町御代	2022年2月	Cs137	326.0	Bq/kg乾	± 33.3	Bq/kg乾	334.5	Cs137	0.9	Bq/kg乾
			Cs134	8.5	Bq/kg乾	± 1.1	Bq/kg乾		Cs134	1.2	Bq/kg乾
土壌(公園内) 遊具下	柿境児童遊園 いわき市鹿島町御代	2022年2月	Cs137	189.0	Bq/kg乾	± 20.7	Bq/kg乾	196.3	Cs137	2.3	Bq/kg乾
			Cs134	7.3	Bq/kg乾	± 1.5	Bq/kg乾		Cs134	2.8	Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	柿境児童遊園 いわき市鹿島町御代	2022年2月	Cs137	178.0	Bq/kg乾	± 19.1	Bq/kg乾	182.7	Cs137	1.8	Bq/kg乾
			Cs134	4.7	Bq/kg乾	± 1.0	Bq/kg乾		Cs134	2.2	Bq/kg乾
土壌(公園内)	柿境児童遊園 いわき市鹿島町御代	2022年2月	Cs137	154.0	Bq/kg乾	± 16.0	Bq/kg乾	157.5	Cs137	1.1	Bq/kg乾
			Cs134	3.5	Bq/kg乾	± 0.6	Bq/kg乾		Cs134	1.5	Bq/kg乾
土壌(公園内) 植え込み内	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	3130.0	Bq/kg乾	± 327.0	Bq/kg乾	3239.0	Cs137	11.8	Bq/kg乾
			Cs134	109.0	Bq/kg乾	± 13.9	Bq/kg乾		Cs134	12.4	Bq/kg乾
土壌(公園内)	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	2310.0	Bq/kg乾	± 235.0	Bq/kg乾	2382.9	Cs137	3.4	Bq/kg乾
			Cs134	72.9	Bq/kg乾	± 8.2	Bq/kg乾		Cs134	3.3	Bq/kg乾
土壌(公園内)	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	485.0	Bq/kg乾	± 50.5	Bq/kg乾	497.9	Cs137	2.5	Bq/kg乾
			Cs134	12.9	Bq/kg乾	± 2.0	Bq/kg乾		Cs134	2.9	Bq/kg乾
土壌(公園内)	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	422.0	Bq/kg乾	± 44.0	Bq/kg乾	435.9	Cs137	1.9	Bq/kg乾
			Cs134	13.9	Bq/kg乾	± 1.8	Bq/kg乾		Cs134	2.4	Bq/kg乾
土壌(公園内) ロープ遊具下	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	272.0	Bq/kg乾	± 28.7	Bq/kg乾	281.3	Cs137	2.0	Bq/kg乾
			Cs134	9.3	Bq/kg乾	± 1.5	Bq/kg乾		Cs134	2.6	Bq/kg乾
土壌(公園内)	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	207.0	Bq/kg乾	± 21.3	Bq/kg乾	212.7	Cs137	0.9	Bq/kg乾
			Cs134	5.7	Bq/kg乾	± 0.8	Bq/kg乾		Cs134	1.1	Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	153.0	Bq/kg乾	± 15.9	Bq/kg乾	155.1	Cs137	1.1	Bq/kg乾
			Cs134	2.1	Bq/kg乾	± 0.5	Bq/kg乾		Cs134	1.4	Bq/kg乾
土壌(公園内) アニマル遊具下	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	37.8	Bq/kg乾	± 4.2	Bq/kg乾	37.8	Cs137	1.1	Bq/kg乾
			Cs134	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾		Cs134	1.4	Bq/kg乾
土壌(公園内) すな場	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	5.0	Bq/kg乾	± 0.8	Bq/kg乾	5.0	Cs137	1.2	Bq/kg乾
			Cs134	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾		Cs134	1.5	Bq/kg乾
土壌(公園内) ブランコ下	そでこし公園 いわき市鹿島町久保	2022年2月	Cs137	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾	検出下限値以下	Cs137	1.1	Bq/kg乾
			Cs134	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾		Cs134	1.1	Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	564.0	Bq/kg乾	± 57.2	Bq/kg乾	580.3	Cs137	1.2	Bq/kg乾
			Cs134	16.3	Bq/kg乾	± 1.9	Bq/kg乾		Cs134	1.2	Bq/kg乾
土壌(公園内) ベンチ下	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	556.0	Bq/kg乾	± 57.7	Bq/kg乾	576.5	Cs137	2.4	Bq/kg乾
			Cs134	20.5	Bq/kg乾	± 2.8	Bq/kg乾		Cs134	2.8	Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	366.0	Bq/kg乾	± 38.1	Bq/kg乾	376.0	Cs137	2.0	Bq/kg乾
			Cs134	10.0	Bq/kg乾	± 1.5	Bq/kg乾		Cs134	2.5	Bq/kg乾
土壌(公園内)	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	227.0	Bq/kg乾	± 23.5	Bq/kg乾	234.6	Cs137	1.2	Bq/kg乾
			Cs134	7.6	Bq/kg乾	± 1.1	Bq/kg乾		Cs134	1.5	Bq/kg乾
土壌(公園内)	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	162.0	Bq/kg乾	± 16.9	Bq/kg乾	167.7	Cs137	1.2	Bq/kg乾
			Cs134	5.7	Bq/kg乾	± 0.9	Bq/kg乾		Cs134	1.5	Bq/kg乾
土壌(公園内)	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	145.0	Bq/kg乾	± 15.3	Bq/kg乾	149.9	Cs137	1.4	Bq/kg乾
			Cs134	4.9	Bq/kg乾	± 0.9	Bq/kg乾		Cs134	1.7	Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
土壌(公園内)	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	119.0	Bq/kg乾	± 13.6	Bq/kg乾	123.1	Cs137	2.4	Bq/kg乾
			Cs134	4.1	Bq/kg乾	± 1.2	Bq/kg乾		Cs134	3.0	Bq/kg乾
土壌(公園内) 水飲み場	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	117.0	Bq/kg乾	± 12.3	Bq/kg乾	120.6	Cs137	1.0	Bq/kg乾
			Cs134	3.6	Bq/kg乾	± 0.6	Bq/kg乾		Cs134	1.2	Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	76.1	Bq/kg乾	± 8.1	Bq/kg乾	78.6	Cs137	1.1	Bq/kg乾
			Cs134	2.5	Bq/kg乾	± 0.5	Bq/kg乾		Cs134	1.3	Bq/kg乾
土壌(公園内)	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	24.7	Bq/kg乾	± 3.0	Bq/kg乾	24.7	Cs137	1.9	Bq/kg乾
			Cs134	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾		Cs134	2.3	Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	吉野谷公園 いわき市中央台飯野	2022年3月	Cs137	22.7	Bq/kg乾	± 2.6	Bq/kg乾	22.7	Cs137	1.0	Bq/kg乾
			Cs134	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾		Cs134	1.2	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	1750.0	Bq/kg乾	± 179.0	Bq/kg乾	1808.5	Cs137	3.9	Bq/kg乾
			Cs134	58.5	Bq/kg乾	± 6.8	Bq/kg乾		Cs134	4.3	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	787.0	Bq/kg乾	± 79.9	Bq/kg乾	806.4	Cs137	1.6	Bq/kg乾
			Cs134	19.4	Bq/kg乾	± 2.5	Bq/kg乾		Cs134	1.8	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	690.0	Bq/kg乾	± 70.1	Bq/kg乾	707.0	Cs137	1.6	Bq/kg乾
			Cs134	17.0	Bq/kg乾	± 2.2	Bq/kg乾		Cs134	1.8	Bq/kg乾
土壌(公園内) 遊具下	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	411.0	Bq/kg乾	± 42.2	Bq/kg乾	423.8	Cs137	1.4	Bq/kg乾
			Cs134	12.8	Bq/kg乾	± 1.7	Bq/kg乾		Cs134	1.7	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	401.0	Bq/kg乾	± 41.4	Bq/kg乾	419.2	Cs137	1.6	Bq/kg乾
			Cs134	18.2	Bq/kg乾	± 2.2	Bq/kg乾		Cs134	1.9	Bq/kg乾
土壌(公園内) ぶらんこ下	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	315.0	Bq/kg乾	± 32.9	Bq/kg乾	322.4	Cs137	2.4	Bq/kg乾
			Cs134	7.4	Bq/kg乾	± 1.4	Bq/kg乾		Cs134	2.8	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	280.0	Bq/kg乾	± 29.0	Bq/kg乾	288.8	Cs137	1.4	Bq/kg乾
			Cs134	8.8	Bq/kg乾	± 1.3	Bq/kg乾		Cs134	1.7	Bq/kg乾
土壌(公園内) てつぼう下	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	268.0	Bq/kg乾	± 28.2	Bq/kg乾	275.8	Cs137	2.0	Bq/kg乾
			Cs134	7.8	Bq/kg乾	± 1.4	Bq/kg乾		Cs134	2.5	Bq/kg乾
土壌(公園内) すな場	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	97.7	Bq/kg乾	± 11.0	Bq/kg乾	97.7	Cs137	3.4	Bq/kg乾
			Cs134	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾		Cs134	3.1	Bq/kg乾
土壌(公園内) 遊具下	草木台南公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	23.1	Bq/kg乾	± 2.9	Bq/kg乾	23.1	Cs137	2.3	Bq/kg乾
			Cs134	—	Bq/kg乾	± —	Bq/kg乾		Cs134	2.7	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	927.0	Bq/kg乾	± 95.5	Bq/kg乾	963.9	Cs137	3.0	Bq/kg乾
			Cs134	36.9	Bq/kg乾	± 4.4	Bq/kg乾		Cs134	3.2	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	824.0	Bq/kg乾	± 83.9	Bq/kg乾	850.4	Cs137	1.7	Bq/kg乾
			Cs134	26.4	Bq/kg乾	± 3.1	Bq/kg乾		Cs134	1.9	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	765.0	Bq/kg乾	± 78.0	Bq/kg乾	796.2	Cs137	1.7	Bq/kg乾
			Cs134	31.2	Bq/kg乾	± 3.5	Bq/kg乾		Cs134	1.8	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	579.0	Bq/kg乾	± 60.2	Bq/kg乾	599.9	Cs137	2.9	Bq/kg乾
			Cs134	20.9	Bq/kg乾	± 2.9	Bq/kg乾		Cs134	3.3	Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	492.0	Bq/kg乾	± 44.1	Bq/kg乾	507.1	Cs137	1.8	Bq/kg乾
			Cs134	15.1	Bq/kg乾	± 2.0	Bq/kg乾		Cs134	2.1	Bq/kg乾
土壌(公園内) ぶらんこ下	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	444.0	Bq/kg乾	± 45.3	Bq/kg乾	458.0	Cs137	1.3	Bq/kg乾
			Cs134	14.0	Bq/kg乾	± 1.8	Bq/kg乾		Cs134	1.6	Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	430.0	Bq/kg乾	± 45.1	Bq/kg乾	442.3	Cs137	2.8	Bq/kg乾
			Cs134	12.3	Bq/kg乾	± 2.0	Bq/kg乾		Cs134	3.3	Bq/kg乾
土壌(公園内) 遊具下	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	386.0	Bq/kg乾	± 40.8	Bq/kg乾	405.1	Cs137	2.7	Bq/kg乾
			Cs134	19.1	Bq/kg乾	± 2.6	Bq/kg乾		Cs134	3.3	Bq/kg乾
土壌(公園内) ベンチ下	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	184.0	Bq/kg乾	± 19.4	Bq/kg乾	191.4	Cs137	1.6	Bq/kg乾
			Cs134	7.4	Bq/kg乾	± 1.2	Bq/kg乾		Cs134	2.0	Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
土壌(公園内) すな場	草木台2丁目公園 いわき市草木台2丁目	2022年3月	Cs137	110.0 Bq/kg乾	± 11.5 Bq/kg乾		114.5	Cs137	1.0 Bq/kg乾
			Cs134	4.5 Bq/kg乾	± 0.7 Bq/kg乾			Cs134	1.3 Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	1590.0 Bq/kg乾	± 162.0 Bq/kg乾		1647.7	Cs137	2.9 Bq/kg乾
			Cs134	57.7 Bq/kg乾	± 6.4 Bq/kg乾			Cs134	2.8 Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	606.0 Bq/kg乾	± 62.2 Bq/kg乾		626.7	Cs137	2.3 Bq/kg乾
			Cs134	20.7 Bq/kg乾	± 2.7 Bq/kg乾			Cs134	2.4 Bq/kg乾
土壌(公園内) すべり台下	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	338.0 Bq/kg乾	± 35.3 Bq/kg乾		351.0	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	13.0 Bq/kg乾	± 2.0 Bq/kg乾			Cs134	2.6 Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	269.0 Bq/kg乾	± 28.4 Bq/kg乾		278.6	Cs137	2.3 Bq/kg乾
			Cs134	9.6 Bq/kg乾	± 1.7 Bq/kg乾			Cs134	2.8 Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	220.0 Bq/kg乾	± 22.8 Bq/kg乾		225.8	Cs137	1.2 Bq/kg乾
			Cs134	5.8 Bq/kg乾	± 0.9 Bq/kg乾			Cs134	1.5 Bq/kg乾
土壌(公園内) 遊具下	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	182.0 Bq/kg乾	± 18.8 Bq/kg乾		187.9	Cs137	1.0 Bq/kg乾
			Cs134	5.9 Bq/kg乾	± 0.9 Bq/kg乾			Cs134	1.2 Bq/kg乾
土壌(公園内) ぶらんこ下	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	115.0 Bq/kg乾	± 12.5 Bq/kg乾		120.2	Cs137	1.7 Bq/kg乾
			Cs134	5.2 Bq/kg乾	± 1.1 Bq/kg乾			Cs134	2.2 Bq/kg乾
土壌(公園内)	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	77.3 Bq/kg乾	± 8.7 Bq/kg乾		77.3	Cs137	2.5 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	3.1 Bq/kg乾
土壌(公園内) 休憩所	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	55.8 Bq/kg乾	± 6.3 Bq/kg乾		55.8	Cs137	2.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.5 Bq/kg乾
土壌(公園内) すな場	草木台4丁目公園 いわき市草木台4丁目	2022年3月	Cs137	41.1 Bq/kg乾	± 4.5 Bq/kg乾		41.1	Cs137	1.3 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	1.2 Bq/kg乾
梅の木(灰)	いわき市泉ヶ丘	2021年6月	Cs137	62.4 Bq/kg生	± 9.1 Bq/kg生		62.4	Cs137	4.4 Bq/kg生
			Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	3.3 Bq/kg生
掃除機のゴミ	いわき市小名浜	2022年3月	Cs137	465.4 Bq/kg生	± 46.8 Bq/kg生		475.5	Cs137	8.7 Bq/kg生
			Cs134	10.1 Bq/kg生	± 6.8 Bq/kg生			Cs134	6.7 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



測定器		特長	下限値目安※
ゲルマニウム半導体検出器			
ORTEC GEM30-70	CANBERRA GC4020	・放射能測定法シリーズ 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に準拠した定量分析 ・ORTEC GEM30-70 相対効率35% ・CANBERRA GC4020 相対効率43%	食材（試料2kg） 下限値 0.04Bq/Kg 土壌（試料1kg） 下限値 0.06Bq/Kg 資材（試料1kg） 下限値 0.06Bq/Kg 水（試料20L） 下限値 0.001Bq/L

※下限値は、試料の重量・測定時間で変動があります。

測定器：ゲルマニウム半導体検出器

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定器種	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	秋田県	2021年10月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.05 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.05 Bq/kg生
さつまいも	福島県双葉郡 広野町	2022年2月	OR	Cs137	4.2 Bq/kg生	±	0.4 Bq/kg生	4.2	Cs137	0.6 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.7 Bq/kg生
さつまいも	茨城県	2022年2月	OR	Cs137	3.7 Bq/kg生	±	0.1 Bq/kg生	3.7	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
大豆	福島県伊達市	2021年12月	OR	Cs137	4.3 Bq/kg生	±	0.4 Bq/kg生	4.3	Cs137	0.6 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
よもぎ	いわき市鹿島町 下蔵持	2022年3月	OR	Cs137	0.2 Bq/kg生	±	0.09 Bq/kg生	0.2	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県双葉郡 双葉町	2022年3月	CA	Cs137	1083.5 Bq/kg生	±	29.4 Bq/kg生	1123.0	Cs137	13.0 Bq/kg生
				Cs134	39.5 Bq/kg生	±	6.7 Bq/kg生		Cs134	10.1 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県双葉郡 大熊町	2022年3月	CA	Cs137	299.1 Bq/kg生	±	17.7 Bq/kg生	299.1	Cs137	11.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	10.5 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県双葉郡 浪江町	2022年3月	CA	Cs137	140.1 Bq/kg生	±	14.1 Bq/kg生	140.1	Cs137	11.9 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	11.5 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県双葉郡 葛尾村	2022年3月	CA	Cs137	200.3 Bq/kg生	±	3.4 Bq/kg生	207.7	Cs137	2.0 Bq/kg生
				Cs134	7.4 Bq/kg生	±	0.8 Bq/kg生		Cs134	1.8 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県双葉郡 葛尾村	2022年3月	CA	Cs137	36.2 Bq/kg生	±	1.6 Bq/kg生	36.2	Cs137	1.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.3 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県双葉郡 富岡町	2022年3月	OR	Cs137	56.8 Bq/kg生	±	4.7 Bq/kg生	56.8	Cs137	4.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	4.3 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県双葉郡 楢葉町	2022年3月	OR	Cs137	20.2 Bq/kg生	±	1.8 Bq/kg生	20.2	Cs137	1.9 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	2.6 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県田村市 船引町	2022年3月	CA	Cs137	2.0 Bq/kg生	±	0.7 Bq/kg生	2.0	Cs137	1.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県福島市 金谷川	2022年3月	OR	Cs137	4.4 Bq/kg生	±	0.4 Bq/kg生	4.4	Cs137	0.6 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
ふきのとう(野生)	福島県田村市 都路町	2022年3月	OR	Cs137	1.6 Bq/kg生	±	0.6 Bq/kg生	1.6	Cs137	1.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.4 Bq/kg生
マダラ	福島県/原釜港	2022年3月	OR	Cs137	0.3 Bq/kg生	±	0.1 Bq/kg生	0.3	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
シロメバル	福島県/請戸港	2022年3月	CA	Cs137	1.8 Bq/kg生	±	0.1 Bq/kg生	1.8	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
キツネメバル	福島県/請戸港	2021年11月	OR	Cs137	0.8 Bq/kg生	±	0.1 Bq/kg生	0.8	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
真イワシ	福島県/小名浜港	2022年3月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
ブリ	不明	2021年12月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.4 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※ただし0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

試料品名	採取地	採取月		測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
アイナメ(身)	福島第一原発沖	2022年2月	OR	Cs137	1.1 Bq/kg生	± 0.09 Bq/kg生		1.1	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.1 Bq/kg生
クロメバル(身)	福島第一原発沖	2022年2月	CA	Cs137	1.2 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		1.2	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
シロメバル(身)	福島第一原発沖	2022年2月	CA	Cs137	1.5 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		1.5	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
シロメバル(身)	福島第一原発沖	2022年2月	CA	Cs137	1.0 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		1.0	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
シロメバル(身)	福島第一原発沖	2022年2月	OR	Cs137	1.8 Bq/kg生	± 0.2 Bq/kg生		1.8	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.5 Bq/kg生
キツネメバル(身)	福島第一原発沖	2022年2月	OR	Cs137	0.9 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		0.9	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.3 Bq/kg生
ウスメバル(全身)	福島第一原発沖	2022年2月	CA	Cs137	1.5 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		1.5	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
ウスメバル(全身)	福島第一原発沖	2022年2月	OR	Cs137	1.7 Bq/kg生	± 0.3 Bq/kg生		1.7	Cs137	0.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.7 Bq/kg生
ウスメバル(全身)	福島第一原発沖	2022年2月	OR	Cs137	0.8 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		0.8	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
ムシガレイ(身)	福島第一原発沖	2022年2月	OR	Cs137	0.9 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		0.9	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
ムシガレイ(身)	福島第一原発沖	2022年2月	CA	Cs137	0.6 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		0.6	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
ムシガレイ(身)	福島第一原発沖	2022年2月	OR	Cs137	0.6 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		0.6	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
ムシガレイ(身・骨)	福島第一原発沖	2022年2月	CA	Cs137	0.5 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		0.5	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.2 Bq/kg生
ハゼ	福島県/鮫川河口	2021年11月	OR	Cs137	0.4 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生		0.4	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.3 Bq/kg生
土壌(公園内)	柿境児童遊園 いわき市鹿島町御代	2022年3月	CA	Cs137	255.0 Bq/kg乾	± 2.7 Bq/kg乾		263.7	Cs137	1.3 Bq/kg乾
				Cs134	8.7 Bq/kg乾	± 0.5 Bq/kg乾			Cs134	1.1 Bq/kg乾
土壌(公園内)	そでこし公園 いわき市鹿島町	2022年3月	CA	Cs137	185.6 Bq/kg乾	± 2.5 Bq/kg乾		192.4	Cs137	1.3 Bq/kg乾
				Cs134	6.8 Bq/kg乾	± 0.5 Bq/kg乾			Cs134	1.2 Bq/kg乾
海水(表層)	福島第一原発沖 海水A 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.004 Bq/L	± 0.0005 Bq/L		0.004	Cs137	0.0009 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水(下層)	福島第一原発沖 海水A 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.004 Bq/L	± 0.0005 Bq/L		0.004	Cs137	0.0009 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水(表層)	福島第一原発沖 海水B 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.006 Bq/L	± 0.0006 Bq/L		0.006	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水(下層)	福島第一原発沖 海水B 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.002 Bq/L	± 0.0005 Bq/L		0.002	Cs137	0.0009 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水(表層)	福島第一原発沖 海水C 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.003 Bq/L	± 0.0005 Bq/L		0.003	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水(下層)	福島第一原発沖 海水C 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.002 Bq/L	± 0.0005 Bq/L		0.002	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水(表層)	福島第一原発沖 海水D 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.005 Bq/L	± 0.0005 Bq/L		0.005	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水(下層)	福島第一原発沖 海水D 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.003 Bq/L	± 0.0004 Bq/L		0.003	Cs137	0.0008 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.0009 Bq/L

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

試料品名	採取地	採取月		測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
海水(表層)	福島県/富岡港	2022年2月	OR	Cs137	0.031 Bq/L	± 0.0008 Bq/L	0.032		Cs137	0.0009 Bq/L
				Cs134	0.001 Bq/L	± 0.0005 Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(表層)	福島県/相馬港	2020年9月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下		Cs137	0.0008 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.0007 Bq/L
海水中懸濁物(表層)	福島県/大熊河口	2021年11月	CA	Cs137	0.046 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.048		Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	0.002 Bq/L	± 0.001 Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
川水中懸濁物(表層)	福島県/双葉海水浴場	2021年11月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下		Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.002 Bq/L
海水中懸濁物(表層)	福島第一原発沖海水A 地点	2022年2月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(下層)	福島第一原発沖海水A 地点	2022年2月	CA	Cs137	0.005 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.005		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(表層)	福島第一原発沖海水B 地点	2022年2月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(下層)	福島第一原発沖海水B 地点	2022年2月	CA	Cs137	0.002 Bq/L	± 0.0009 Bq/L	0.002		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(表層)	福島第一原発沖海水C 地点	2022年2月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(下層)	福島第一原発沖海水C 地点	2022年2月	CA	Cs137	0.002 Bq/L	± 0.0008 Bq/L	0.002		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(表層)	福島第一原発沖海水D 地点	2022年2月	OR	Cs137	0.003 Bq/L	± 0.0007 Bq/L	0.003		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(下層)	福島第一原発沖海水D 地点	2022年2月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
海水中懸濁物(表層)	福島県/富岡港	2022年2月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下		Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.001 Bq/L
川の中懸濁物(表層)	福島県/地蔵川	2020年9月	CA	Cs137	0.0008 Bq/L	± 0.0004 Bq/L	0.0008		Cs137	0.0008 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L			Cs134	0.0008 Bq/L
白樺の樹液	福島県双葉郡川内村	2022年3月	OR	Cs137	0.49 Bq/kg生	± 0.02 Bq/kg生	0.49		Cs137	0.04 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	0.07 Bq/kg生
樹皮	いわき市南台	2022年3月	CA	Cs137	198.9 Bq/kg生	± 16.7 Bq/kg生	198.9		Cs137	18.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	18.7 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"—"は検出下限値以下ということです。

※必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



測定器		特長
液体シンチレーションカウンター		
Hidex社製 ハイデックス 300SL	パーキンエルマー・ジャパン Quantulus GCT 6220	・ 低エネルギーのベータ線放出核種を測定する機器
		・ 測定核種 ストロンチウム90 半減期 30年 有機結合型トリチウム 半減期 12.3年 自由水型トリチウム 半減期 12.3年 ・ どの試料も、数日間の前処理を経て液体の状態で測定を行う

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	検出下限値
山水	いわき市川前町 下桶売	2021年10月	T (自由)	0.37 Bq/L	± 0.21 Bq/L	0.19 Bq/L
川の水	福島県/木戸川	2021年12月	T (自由)	0.41 Bq/L	± 0.22 Bq/L	0.19 Bq/L
雨水	沖縄県島尻郡 久米島	2021年10月	T (自由)	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.19 Bq/L
水蒸気(空气中)	たらちね	2021年9月	T (自由)	0.69 Bq/L	± 0.25 Bq/L	0.20 Bq/L
海水(表層)	茨城県/ 河原子海水浴場	2021年12月	T (自由)	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.20 Bq/L
ゆず(種入り)	福島県双葉郡 大熊町	2021年2月	Sr90	2.29 Bq/kg乾	± 0.10 Bq/kg乾	0.12 Bq/kg乾
乾燥しいたけ	岩手県	2020年5月	Sr90	0.55 Bq/kg乾	± 0.13 Bq/kg乾	0.19 Bq/kg乾
桑茶	福島県二本松市	2020年9月	Sr90	2.17 Bq/kg乾	± 0.10 Bq/kg乾	0.13 Bq/kg乾
ブリ	福島県/小名浜港	2020年8月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.12 Bq/kg乾
土壌	福島県田村市 船引町	2021年3月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.90 Bq/kg乾
土壌(公園内)	ハッ坂西公園 いわき市平南白土	2021年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.90 Bq/kg乾
土壌(公園内)	前川田公園 いわき市平南白土	2021年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.85 Bq/kg乾
土壌(公園内)	大畑公園 いわき市中央台鹿島	2021年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.83 Bq/kg乾
土壌(公園内)	つるまき公園 いわき市中央台鹿島	2021年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.84 Bq/kg乾
土壌(公園内)	ハッ坂南児童遊園 いわき市平南白土	2021年3月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	0.81 Bq/kg乾
土壌(公園内)	中洲児童遊園 いわき市平下荒川	2021年3月	Sr90	1.48 Bq/kg乾	± 0.61 Bq/kg乾	0.91 Bq/kg乾
土壌(公園内)	中洲第2児童遊園 いわき市平下荒川	2021年3月	Sr90	検出下限値以下 Bq/kg乾	± ー Bq/kg乾	1.03 Bq/kg乾

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	検出下限値
海水(表層)	福島第一原発沖 海水A地点	2022年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0008 Bq/L
海水(下層)	福島第一原発沖 海水A地点	2022年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0008 Bq/L
海水(表層)	福島第一原発沖 海水B地点	2022年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0008 Bq/L
海水(下層)	福島第一原発沖 海水B地点	2022年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0007 Bq/L
海水(表層)	福島第一原発沖 海水C地点	2022年2月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0008 Bq/L



ゲルマニウム半導体検出器による測定結果 16件


京都大学複合原子力科学研究所 今中哲二先生

皆様により多くの測定結果をお伝えできるよう、京都大学複合原子力科学研究所 今中哲二先生にゲルマニウム半導体検出器による低線量試料の測定を依頼しております。福島県内だけではなく、県外の測定結果もでています。様々な地域の測定値を参考にデータの比較をし、お子さんの被ばく防護に役立ててください。

★ガンマ線

測定器種類：ゲルマニウム半導体検出器

- ・ 米国 CANBERRA社製(CA) GX3018 相対効率 30%以上
- ・ 米国 ORTEC社製(OR) GMX25-70 相対効率 35%



(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定器種	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	福島県相馬郡飯館村	2021年11月	OR	Cs137	0.54 Bq/kg生	± 0.04 Bq/kg生	0.54	0.54	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
白米	福島県白河市	2021年10月	OR	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
さつまいも	福島県石川郡古殿町	2021年11月	OR	Cs137	0.09 Bq/kg生	± 0.05 Bq/kg生	0.09	0.09	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
レンコン	茨城県	2022年1月	OR	Cs137	4.3 Bq/kg生	± 0.05 Bq/kg生	4.39	4.39	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	0.09 Bq/kg生	± 0.02 Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
ゆず	福島県西白河郡矢吹町	2021年12月	OR	Cs137	1.4 Bq/kg生	± 0.07 Bq/kg生	1.4	1.4	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
柿	いわき市勿来町	2021年12月	CA	Cs137	0.04 Bq/kg生	± 0.01 Bq/kg生	0.04	0.04	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
落花生(生)	福島県双葉郡浪江町	2021年11月	OR	Cs137	0.8 Bq/kg生	± 0.2 Bq/kg生	0.8	0.8	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
菌床きくらげ	福島県相馬郡飯館村	2021年8月	CA	Cs137	1.2 Bq/kg生	± 0.07 Bq/kg生	1.2	1.2	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
原木しいたけ	いわき市渡辺町	2021年11月	CA	Cs137	2.0 Bq/kg生	± 0.09 Bq/kg生	2.0	2.0	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
菌床しいたけ	栃木県	2021年10月	CA	Cs137	5.9 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生	6.1	6.1	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	0.2 Bq/kg生	± 0.03 Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
菌床しいたけ	宮城県伊具郡丸森町	2021年11月	CA	Cs137	1.8 Bq/kg生	± 0.08 Bq/kg生	1.8	1.8	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
なめこ	福島県東白川郡棚倉町	2021年12月	CA	Cs137	1.6 Bq/kg生	± 0.03 Bq/kg生	1.63	1.63	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	0.03 Bq/kg生	± 0.01 Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
エリンギ	新潟県	2021年10月	CA	Cs137	0.03 Bq/kg生	± 0.01 Bq/kg生	0.03	0.03	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
こんにゃく	群馬県	2021年11月	CA	Cs137	0.1 Bq/kg生	± 0.08 Bq/kg生	0.1	0.1	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
紅茶	イギリス	2013年3月	OR	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	検出下限値以下	Cs137	0.7 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生
カブトムシ	いわき市	2021年8月	OR	Cs137	13 Bq/kg生	± 1 Bq/kg生	13	13	Cs137	Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生			Cs134	Bq/kg生

2022年3月 空間線量

測定場所	測定器		特長
福島県いわき市小名浜 横町公園	CsIシンチレーション式 サーベイメーター	NaIシンチレーション式 サーベイメーター	空間(場所)の放射線 量や人・物の表面汚染 を調べる
	⑧HITACHI ALOKA TCS-1172	⑦HORIBA Radi PA-1100	
			

	測定器	HITACHI ALOKA	HORIBA Radi	HITACHI ALOKA	HORIBA Radi
測定日	天気	地表付近($\mu\text{Sv/h}$)		地表 1m($\mu\text{Sv/h}$)	
2022/3/1		0.07	0.062	0.06	0.063
2022/3/2		0.07	0.074	0.06	0.076
2022/3/3		0.06	0.057	0.07	0.074
2022/3/4		0.07	0.063	0.06	0.063
測定日	天気	地表付近($\mu\text{Sv/h}$)		地表 1m($\mu\text{Sv/h}$)	
2022/3/7		0.06	0.06	0.06	0.058
2022/3/8		0.07	0.077	0.07	0.072
2022/3/9		0.06	0.061	0.06	0.059
2022/3/10		0.07	0.078	0.06	0.068
2022/3/11		0.06	0.061	0.06	0.058
測定日	天気	地表付近($\mu\text{Sv/h}$)		地表 1m($\mu\text{Sv/h}$)	
2022/3/14		0.06	0.068	0.06	0.06
2022/3/15		0.07	0.068	0.06	0.062
2022/3/16		0.06	0.063	0.07	0.069
2022/3/17		0.06	0.057	0.06	0.061
2022/3/18		0.08	0.078	0.07	0.073
測定日	天気	地表付近($\mu\text{Sv/h}$)		地表 1m($\mu\text{Sv/h}$)	
2022/3/22		0.08	0.085	0.07	0.075
2022/3/23		0.07	0.07	0.06	0.067
2022/3/24		0.06	0.065	0.06	0.062
2022/3/25		0.06	0.067	0.06	0.062
測定日	天気	地表($\mu\text{Sv/h}$)		地表 1m($\mu\text{Sv/h}$)	
2022/3/28		0.07	0.077	0.06	0.063
2022/3/29		0.06	0.069	0.06	0.064
2022/3/30		0.06	0.064	0.05	0.061
2022/3/31		0.06	0.067	0.06	0.068