



2026年9月の放射能測定結果 126件



測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

測定器		特長	下限値目安※
NaIシンチレーションスペクトロメータ			
ATOMTEX社製AT1320A	BERTHOLD社製LB2045	・ NaIシンチレーション検出器を搭載した ガンマ線スペクトルメータ	食材（試料1kg） 下限値 1.0Bq/kg 土壌（試料1kg） 下限値 2.5Bq/kg 資材（試料1kg） 下限値 1.0Bq/kg 水（試料20L） 下限値 0.02Bq/L

測定器：NaIシンチレーションスペクトロメータ (Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
土壌	いわき市好間町 大館児童遊園	2026年6月	Cs137	73.2 Bq/kg乾	± 8.2 Bq/kg乾		73.2	Cs137	2.3 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.3 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 大館児童遊園	2026年6月	Cs137	180.0 Bq/kg乾	± 18.7 Bq/kg乾		180.0	Cs137	1.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	1.2 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 大館児童遊園	2026年6月	Cs137	142.0 Bq/kg乾	± 14.8 Bq/kg乾		142.0	Cs137	1.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	1.3 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 大館児童遊園	2026年6月	Cs137	147.0 Bq/kg乾	± 15.9 Bq/kg乾		147.0	Cs137	3.3 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.4 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 大館児童遊園	2026年6月	Cs137	164.0 Bq/kg乾	± 17.1 Bq/kg乾		164.0	Cs137	1.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	1.2 Bq/kg乾
土壌 (パンダ遊具)	いわき市好間町 大館児童遊園	2026年6月	Cs137	49.0 Bq/kg乾	± 5.2 Bq/kg乾		49.0	Cs137	1.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	1.0 Bq/kg乾
土壌 (ライオン遊具)	いわき市好間町 大館児童遊園	2026年6月	Cs137	137.0 Bq/kg乾	± 15.0 Bq/kg乾		137.0	Cs137	3.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	4.0 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	344.0 Bq/kg乾	± 35.9 Bq/kg乾		344.0	Cs137	3.4 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.6 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	594.0 Bq/kg乾	± 61.3 Bq/kg乾		600.7	Cs137	2.4 Bq/kg乾
			Cs134	6.7 Bq/kg乾	± 1.2 Bq/kg乾			Cs134	2.2 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	304.0 Bq/kg乾	± 31.9 Bq/kg乾		304.0	Cs137	3.3 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.5 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	261.0 Bq/kg乾	± 27.5 Bq/kg乾		261.0	Cs137	3.4 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.5 Bq/kg乾
土壌	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		検出下限値以下	Cs137	1.4 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	1.5 Bq/kg乾
土壌(バスケット ゴール下)	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	19.4 Bq/kg乾	± 2.2 Bq/kg乾		19.4	Cs137	0.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	0.9 Bq/kg乾
土壌(ベンチⅠ)	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	163.0 Bq/kg乾	± 17.5 Bq/kg乾		163.0	Cs137	3.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.3 Bq/kg乾
土壌(スプリング 遊具Ⅰ)	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	161.0 Bq/kg乾	± 17.3 Bq/kg乾		161.0	Cs137	3.2 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.4 Bq/kg乾
土壌(スプリング 遊具Ⅱ)	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	379.0 Bq/kg乾	± 39.4 Bq/kg乾		379.0	Cs137	3.3 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾			Cs134	2.4 Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの“—”は検出下限値以下ということです。

必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
土壌(ベンチⅡ)	いわき市好間町 向山児童遊園	2026年6月	Cs137	14.6 Bq/kg乾	± 1.7 Bq/kg乾	14.6	Cs137	0.9 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.1 Bq/kg乾	
土壌	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	288.0 Bq/kg乾	± 30.3 Bq/kg乾	288.0	Cs137	3.3 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.5 Bq/kg乾	
土壌	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	239.0 Bq/kg乾	± 25.2 Bq/kg乾	239.0	Cs137	2.8 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.2 Bq/kg乾	
土壌	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	378.0 Bq/kg乾	± 39.4 Bq/kg乾	378.0	Cs137	3.5 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.6 Bq/kg乾	
土壌	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	365.1 Bq/kg乾	± 2.1 Bq/kg乾	367.5	Cs137	0.7 Bq/kg乾	
			Cs134	2.4 Bq/kg乾	± 0.4 Bq/kg乾		Cs134	0.7 Bq/kg乾	
土壌	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	547.3 Bq/kg乾	± 2.4 Bq/kg乾	552.0	Cs137	0.8 Bq/kg乾	
			Cs134	4.7 Bq/kg乾	± 0.4 Bq/kg乾		Cs134	0.7 Bq/kg乾	
土壌	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	311.0 Bq/kg乾	± 32.8 Bq/kg乾	311.0	Cs137	3.8 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.9 Bq/kg乾	
土壌(ブランコ)	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	119.0 Bq/kg乾	± 12.4 Bq/kg乾	119.0	Cs137	1.4 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.1 Bq/kg乾	
土壌(シーソー)	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	68.3 Bq/kg乾	± 7.2 Bq/kg乾	68.3	Cs137	1.2 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	0.9 Bq/kg乾	
土壌(ベンチⅠ)	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	145.0 Bq/kg乾	± 15.7 Bq/kg乾	145.0	Cs137	2.8 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.1 Bq/kg乾	
土壌(ベンチⅡ)	いわき市小名浜 権現山公園	2026年8月	Cs137	184.0 Bq/kg乾	± 19.0 Bq/kg乾	184.0	Cs137	1.5 Bq/kg乾	
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.1 Bq/kg乾	

測定器		特長	下限値目安※
ゲルマニウム半導体検出器			
ORTEC GEM30-70	CANBERRA GC4020	・放射能測定法シリーズ 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 スペクトロメトリー」に準拠した定量分析 ・ORTEC GEM30-70 相対効率35% ・CANBERRA GC4020 相対効率43%	食材（試料2kg） 下限値 0.04Bq/kg 土壌（試料1kg） 下限値 0.06Bq/kg 資材（試料1kg） 下限値 0.06Bq/kg 水（試料10L） 下限値 0.002Bq/L

※下限値は、試料の重量・測定時間で変動があります。

測定器：ゲルマニウム半導体検出器

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定器種	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	いわき市	2026年8月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
じゃがいも	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
じゃがいも	山形県米沢市	2026年8月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
にんじん	宮城県角田市	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
ごぼう	宮城県角田市	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
さつまいも	茨城県	2026年8月	CA	Cs137	0.5 Bq/kg生	±	0.1 Bq/kg生	0.5	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
長いも	青森県	2026年8月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
玉ねぎ	山形県米沢市	2026年8月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
にんにく	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
セロリ	宮城県仙台市 若林区六郷	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
キャベツ	宮城県仙台市 宮城野区	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
アスパラガス	宮城県仙台市 若林区七郷	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
サニーレタス	宮城県仙台市 若林区六郷	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.1 Bq/kg生
空芯菜	宮城県仙台市 太白区	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.4 Bq/kg生
モロヘイヤ	宮城県仙台市 太白区中田	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.4 Bq/kg生
金時草	宮城県仙台市 宮城野区	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
バジル	宮城県仙台市 宮城野区高砂	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.9 Bq/kg生
ケール	宮城県仙台市 宮城野区高砂	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	1.0 Bq/kg生
かぼちゃ	福島県	2026年8月	OR	Cs137	0.7 Bq/kg生	±	0.1 Bq/kg生	0.7	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの“—”は検出下限値以下ということです。

必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。



試料品名	採取地	採取月		測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
とうもろこし	山形県米沢市	2026年8月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
なす	宮城県多賀城市	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
きゅうり	宮城県多賀城市	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
ピーマン	山形県米沢市	2026年8月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.6 Bq/kg生
ピーマン	宮城県	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
パプリカ	宮城県伊具郡丸森町	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
冬瓜	宮城県仙台市宮城野区高砂	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
ゴーヤ	宮城県多賀城市南官	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
コリンキー	宮城県宮城郡七ヶ浜町	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
枝豆	山形県米沢市	2026年8月	OR	Cs137	0.2 Bq/kg生	±	0.07 Bq/kg生	0.2	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
枝豆	宮城県仙台市若林区六郷	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.6 Bq/kg生
いんげん	宮城県角田市	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.07 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.08 Bq/kg生
シカクマメ	宮城県	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
うちまめ	山形県	2026年8月	CA	Cs137	0.6 Bq/kg生	±	0.2 Bq/kg生	0.6	Cs137	0.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.5 Bq/kg生
しょうが	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	0.1 Bq/kg生	±	0.03 Bq/kg生	0.1	Cs137	0.06 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.06 Bq/kg生
しょうが	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生
みょうが	宮城県仙台市若林区六郷	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
青唐辛子	宮城県伊具郡丸森町	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
りんご	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
梨	宮城県刈田郡蔵王町	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
梨	宮城県宮城郡利府町	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
イチジク	いわき市泉ヶ丘	2026年9月	OR	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.5 Bq/kg生
ドライイチジク	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.6 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.6 Bq/kg生
プルーン	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの“—”は検出下限値以下ということです。

必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

試料品名	採取地	採取月		測定結果			不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
バカマツタケ	いわき市大久町 大久	2026年9月	OR	Cs137	2256.4	Bq/kg生	± 39.8	Bq/kg生	2272.3	Cs137	10.2	Bq/kg生
				Cs134	15.9	Bq/kg生	± 5.3	Bq/kg生		Cs134	9.9	Bq/kg生
しいたけ(干し)	福島県田村郡 三春町	2026年6月	OR	Cs137	40.7	Bq/kg生	± 1.9	Bq/kg生	40.7	Cs137	2.6	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	3.0	Bq/kg生
しいたけ(生)	宮城県亘理郡 山元町	2026年9月	OR	Cs137	1.0	Bq/kg生	± 0.08	Bq/kg生	1.0	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
しいたけ(菌床)	宮城県	2026年9月	OR	Cs137	0.7	Bq/kg生	± 0.2	Bq/kg生	0.7	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
きくらげ(乾燥)	宮城県亘理郡 山元町	2026年9月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	2.1	Bq/kg生
こごみ(干し)	山形県	2026年8月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	2.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	2.1	Bq/kg生
銀杏	宮城県角田市	2026年9月	CA	Cs137	5.7	Bq/kg生	± 0.3	Bq/kg生	5.7	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.6	Bq/kg生
くるみ	山形県米沢市	2026年8月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.7	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.8	Bq/kg生
ヒラメ(全身)	宮城県/仙台湾	2026年9月	CA	Cs137	0.2	Bq/kg生	± 0.06	Bq/kg生	0.2	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
ヒラメ(全身)	宮城県/仙台湾	2026年9月	OR	Cs137	0.2	Bq/kg生	± 0.1	Bq/kg生	0.2	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
ヒラメ(全身)	宮城県/仙台湾	2026年9月	OR	Cs137	0.3	Bq/kg生	± 0.1	Bq/kg生	0.3	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
ヒラメ(全身)	宮城県/仙台湾	2026年9月	OR	Cs137	0.3	Bq/kg生	± 0.09	Bq/kg生	0.3	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
カサゴ(全身)	宮城県/仙台湾	2026年9月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
荳わかめ	宮城県/三陸産	2026年9月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.5	Bq/kg生
あおさ	福島県相馬市	2026年9月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.9	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	1.9	Bq/kg生
たまご	宮城県	2026年9月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
たまご	国産	2026年9月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
おから	国産	2026年9月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
アロエベラ	宮城県宮城郡	2026年9月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	± —	Bq/kg生		Cs134	1.4	Bq/kg生
海水(懸濁物)	宮城県/ 浜市海岸	2026年7月	CA	Cs137	—	Bq/L	± —	Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002	Bq/L
				Cs134	—	Bq/L	± —	Bq/L		Cs134	0.002	Bq/L
海水(懸濁物)	宮城県/ 仙台新港	2026年7月	CA	Cs137	—	Bq/L	± —	Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.001	Bq/L
				Cs134	—	Bq/L	± —	Bq/L		Cs134	0.001	Bq/L
海水(懸濁物)	宮城県/ 荒浜海岸	2026年7月	CA	Cs137	0.008	Bq/L	± 0.001	Bq/L	0.008	Cs137	0.002	Bq/L
				Cs134	—	Bq/L	± —	Bq/L		Cs134	0.002	Bq/L
海水A 表層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	—	Bq/L	± —	Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.001	Bq/L
				Cs134	—	Bq/L	± —	Bq/L		Cs134	0.001	Bq/L
海水A 下層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	0.006	Bq/L	± 0.001	Bq/L	0.006	Cs137	0.002	Bq/L
				Cs134	—	Bq/L	± —	Bq/L		Cs134	0.002	Bq/L

※測定結果と不確かさの“—”は検出下限値以下ということです。

必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月		測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
海水B 表層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.001 Bq/L
海水B 下層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水C 表層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水C 下層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	0.005 Bq/L	± 0.001	Bq/L	0.005	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水D 表層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水D 下層 (懸濁物)	福島第一原発沖	2026年7月	CA	Cs137	0.002 Bq/L	± 0.001	Bq/L	0.002	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水(懸濁物)	福島県/富岡港	2026年7月	CA	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水	宮城県/ 荒浜海岸	2026年7月	CA	Cs137	0.004 Bq/L	± 0.001	Bq/L	0.004	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水	宮城県/ 浜市海岸	2026年7月	CA	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水	宮城県/ 仙台新港	2026年7月	CA	Cs137	— Bq/L	±	— Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	±	— Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
空気清浄機の フィルター	いわき市郷ヶ丘	2026年5月	OR	Cs137	23.2 Bq/kg生	± 0.4	Bq/kg生	23.2	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
布袋菜	いわき市泉ヶ丘	2026年9月	CA	Cs137	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	±	— Bq/kg生		Cs134	0.2 Bq/kg生

※測定結果と不確かさの“—”は検出下限値以下ということです。

必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。




測定器		特長
液体シンチレーションカウンター		
Hidex社製 ハイデックス 300SL	パーキンエルマー・ジャパン Quantulus GCT 6220	・低エネルギーのベータ線放出核種を測定する機器 ・測定核種 ストロンチウム90 半減期 30年 有機結合型トリチウム 半減期 12.3年 自由水型トリチウム 半減期 12.3年 ・どの試料も、数日間の前処理を経て液体の状態で測定を行う
		

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	検出下限値
キツネメバル	福島第一原発沖	2026年7月	T (組織自由型)	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.37 Bq/L
シロメバル	福島第一原発沖	2026年7月	T (組織自由型)	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.37 Bq/L
海水B 表層	福島第一原発沖	2026年7月	T (自由)	0.07 Bq/L	± 0.04 Bq/L	0.04 Bq/L
海水B 下層	福島第一原発沖	2026年7月	T (自由)	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.04 Bq/L
海水C 表層	福島第一原発沖	2026年7月	T (自由)	0.06 Bq/L	± 0.04 Bq/L	0.04 Bq/L
海水C 下層	福島第一原発沖	2026年7月	T (自由)	0.05 Bq/L	± 0.04 Bq/L	0.04 Bq/L
海水D 表層	福島第一原発沖	2026年7月	T (自由)	0.07 Bq/L	± 0.04 Bq/L	0.04 Bq/L
海水D 下層	福島第一原発沖	2026年7月	T (自由)	0.11 Bq/L	± 0.04 Bq/L	0.04 Bq/L
海水 表層	福島県/富岡港	2026年7月	T (自由)	0.07 Bq/L	± 0.04 Bq/L	0.04 Bq/L
海水A 表層	福島第一原発沖	2026年7月	Sr90	0.0006 Bq/L	± 0.0003 Bq/L	0.0004 Bq/L
海水A 下層	福島第一原発沖	2026年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0004 Bq/L
海水C 表層	福島第一原発沖	2026年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0004 Bq/L
海水B 下層	福島第一原発沖	2026年7月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0004 Bq/L
海水A 表層	宮城県/仙台湾	2026年9月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0004 Bq/L
海水A 下層	宮城県/仙台湾	2026年9月	Sr90	0.0005 Bq/L	± 0.0003 Bq/L	0.0004 Bq/L
海水B 表層	宮城県/仙台湾	2026年9月	Sr90	0.0007 Bq/L	± 0.0003 Bq/L	0.0004 Bq/L
海水B 下層	宮城県/仙台湾	2026年9月	Sr90	検出下限値以下 Bq/L	± ー Bq/L	0.0004 Bq/L
薪ストーブの灰 (建築廃材)	栃木県	2026年1月	Sr90	53.87 Bq/kg乾	± 1.22 Bq/kg乾	1.09 Bq/kg乾
薪ストーブのすす	栃木県	2026年1月	Sr90	15.27 Bq/kg乾	± 0.91 Bq/kg乾	1.13 Bq/kg乾
薪ストーブの灰	栃木県芳賀郡 益子町	2026年1月	Sr90	121.10 Bq/kg乾	± 1.94 Bq/kg乾	1.82 Bq/kg乾

2026年9月 空間線量

測定器		測定場所
CsIシンチレーション式 サーベイメーター	NaIシンチレーション式 サーベイメーター	福島県いわき市小名浜 横町公園
⑧HITACHI ALOKA TCS-1172	⑦HORIBA Radi PA-1100	
		
特徴：空間(場所)の放射線量や人・物の表面汚染を調べる。		



	測定器	HORIBA Radi	
測定日	天気	地表付近 (μSv/h)	地表 1m (μSv/h)
2026/9/1		0.061	0.055
2026/9/2		0.059	0.055
2026/9/3		0.075	0.060
2026/9/4		0.061	0.055
測定日	天気	地表付近 (μSv/h)	地表 1m (μSv/h)
2026/9/7		0.061	0.057
2026/9/8		0.061	0.053
2026/9/9		0.065	0.052
2026/9/10		0.061	0.053
2026/9/11		0.069	0.057
測定日	天気	地表付近 (μSv/h)	地表 1m (μSv/h)
2026/9/14		0.062	0.052
2026/9/15		0.061	0.053
2026/9/16		0.072	0.065
2026/9/17		0.057	0.052
2026/9/18		0.059	0.052
測定日	天気	地表付近 (μSv/h)	地表 1m (μSv/h)
2026/9/24		0.069	0.059
2026/9/25		0.061	0.051
測定日	天気	地表付近 (μSv/h)	地表 1m (μSv/h)
2026/9/28		0.059	0.049
2026/9/29		0.069	0.057
2026/9/30		0.065	0.057

お知らせ…2025年1月15日より、「HORIBA Radi PA-1100」のみでの測定といたします。

理由として、2022年3月より定点測定を開始しましたが、「HITACHI ALOKA TCS-1172」と「HORIBA Radi PA-1100」の2台を使用し、2年間測定を継続していく中で、どちらの機器も安定しており、誤差の範囲内で測定値が一致していることがわかりました。そこで、実用性も踏まえ「HORIBA Radi PA-1100」での定点測定とします。

