

2014年 海の砂浜 測定結果

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測入されている可能性を否定できません。

下記はあくまで、その時に採取した検体の測定結果です。同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | | セシウム合計 | 検出下限値 | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 海砂 (表層) | 福島県 龍ヶ崎岬砂場 | 2014年1月 | Cs137 | 20.9 | Bq/Kg生 | ± 4.7 | Bq/Kg生 | 31.5 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 10.6 | Bq/Kg生 | ± 2.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 25.6 | Bq/Kg生 | ± 5.4 | Bq/Kg生 | 40.2 | Cs137 | 1.4 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 14.6 | Bq/Kg生 | ± 3.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.3 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 32.1 | Bq/Kg生 | ± 6.9 | Bq/Kg生 | 50.8 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 18.7 | Bq/Kg生 | ± 4.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 33.1 | Bq/Kg生 | ± 7.1 | Bq/Kg生 | 49.6 | Cs137 | 2.1 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 16.5 | Bq/Kg生 | ± 3.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | 福島県 龍ヶ崎岬砂場 | 2014年1月 | Cs137 | 21.2 | Bq/Kg生 | ± 4.7 | Bq/Kg生 | 35.2 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 14.0 | Bq/Kg生 | ± 3.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 28.9 | Bq/Kg生 | ± 6.4 | Bq/Kg生 | 44.9 | Cs137 | 2.1 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 16.0 | Bq/Kg生 | ± 3.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | | | 28.8 | Bq/Kg生 | ± 6.3 | Bq/Kg生 | 44.5 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 15.7 | Bq/Kg生 | ± 3.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | | 39.5 | Bq/Kg生 | ± 7.9 | Bq/Kg生 | 61.3 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 21.8 | Bq/Kg生 | ± 4.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 三崎公園砂浜 | | 2014年1月 | Cs137 | 30.3 | Bq/Kg生 | ± 6.7 | Bq/Kg生 | 51.8 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 21.5 | Bq/Kg生 | ± 4.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 12.1 | Bq/Kg生 | ± 2.5 | Bq/Kg生 | 32.2 | Cs137 | 0.8 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 20.1 | Bq/Kg生 | ± 4.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | Cs137 | | 2.6 | Bq/Kg生 | ± 1.5 | Bq/Kg生 | 10.3 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | |
| | | Cs134 | | 7.7 | Bq/Kg生 | ± 2.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 0.5 | Bq/Kg生 | ± 2.1 | Bq/Kg生 | 11.4 | Cs137 | 2.2 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 10.9 | Bq/Kg生 | ± 2.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.0 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | 福島県 三崎公園砂浜 | 2014年1月 | Cs137 | 36.7 | Bq/Kg生 | ± 7.9 | Bq/Kg生 | 69.8 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 33.1 | Bq/Kg生 | ± 6.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 28.2 | Bq/Kg生 | ± 6.2 | Bq/Kg生 | 43.1 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 14.9 | Bq/Kg生 | ± 3.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | | | 30.4 | Bq/Kg生 | ± 6.2 | Bq/Kg生 | 46.5 | Cs137 | 1.3 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 16.1 | Bq/Kg生 | ± 3.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | | 25.2 | Bq/Kg生 | ± 5.6 | Bq/Kg生 | 40.5 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 15.3 | Bq/Kg生 | ± 3.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 三崎公園砂浜 | | 2014年1月 | Cs137 | 28.3 | Bq/Kg生 | ± 6.3 | Bq/Kg生 | 45.4 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 17.1 | Bq/Kg生 | ± 4.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 33.5 | Bq/Kg生 | ± 7.3 | Bq/Kg生 | 52.9 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 19.4 | Bq/Kg生 | ± 4.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | Cs137 | | 25.3 | Bq/Kg生 | ± 5.2 | Bq/Kg生 | 43.2 | Cs137 | 1.2 | Bq/Kg生 | |
| | | Cs134 | | 17.9 | Bq/Kg生 | ± 3.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.1 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 33.4 | Bq/Kg生 | ± 7.2 | Bq/Kg生 | 54.3 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 20.9 | Bq/Kg生 | ± 4.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 海砂 (表層) | 福島県 岩間海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 36.1 | Bq/Kg生 | ± 7.6 | Bq/Kg生 | 99.3 | Cs137 | 1.2 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 63.2 | Bq/Kg生 | ± 12.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.1 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 49.4 | Bq/Kg生 | ± 10.4 | Bq/Kg生 | 98.7 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 49.3 | Bq/Kg生 | ± 9.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 52.4 | Bq/Kg生 | ± 10.5 | Bq/Kg生 | 121.9 | Cs137 | 1.2 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 69.5 | Bq/Kg生 | ± 13.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.1 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 57.9 | Bq/Kg生 | ± 11.6 | Bq/Kg生 | 160.9 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 103.0 | Bq/Kg生 | ± 21.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | 福島県 岩間海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 37.4 | Bq/Kg生 | ± 8.0 | Bq/Kg生 | 62.9 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 25.5 | Bq/Kg生 | ± 5.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 35.5 | Bq/Kg生 | ± 7.1 | Bq/Kg生 | 91.8 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 56.3 | Bq/Kg生 | ± 11.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | | | 37.3 | Bq/Kg生 | ± 8.3 | Bq/Kg生 | 96.1 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 58.8 | Bq/Kg生 | ± 11.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | | 35.5 | Bq/Kg生 | ± 7.6 | Bq/Kg生 | 58.6 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 23.1 | Bq/Kg生 | ± 5.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 岩間海岸 | | 2014年1月 | Cs137 | 46.6 | Bq/Kg生 | ± 9.7 | Bq/Kg生 | 71.7 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 25.1 | Bq/Kg生 | ± 5.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 68.1 | Bq/Kg生 | ± 13.6 | Bq/Kg生 | 108.1 | Cs137 | 2.1 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 40.0 | Bq/Kg生 | ± 8.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | Cs137 | | 58.5 | Bq/Kg生 | ± 12.0 | Bq/Kg生 | 90.5 | Cs137 | 2.3 | Bq/Kg生 | |
| | | Cs134 | | 32.0 | Bq/Kg生 | ± 6.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.1 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 37.9 | Bq/Kg生 | ± 8.0 | Bq/Kg生 | 60.2 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 22.3 | Bq/Kg生 | ± 4.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | 福島県 勿来海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 235.0 | Bq/Kg生 | ± 47.0 | Bq/Kg生 | 346.0 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 111.0 | Bq/Kg生 | ± 22.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 52.2 | Bq/Kg生 | ± 10.8 | Bq/Kg生 | 82.9 | Cs137 | 2.2 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 30.7 | Bq/Kg生 | ± 6.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | | | 3.0 | Bq/Kg生 | ± 0.9 | Bq/Kg生 | 17.2 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 14.2 | Bq/Kg生 | ± 2.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | | 16.8 | Bq/Kg生 | ± 4.0 | Bq/Kg生 | 28.3 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 11.5 | Bq/Kg生 | ± 2.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | | 2014年1月 | Cs137 | 437.0 | Bq/Kg生 | ± 87.0 | Bq/Kg生 | 641.0 | Cs137 | 2.6 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 204.0 | Bq/Kg生 | ± 41.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.3 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | | Cs137 | 1.3 | Bq/Kg生 | ± 1.8 | Bq/Kg生 | 10.7 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 9.4 | Bq/Kg生 | ± 2.4 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | Cs137 | | 11.2 | Bq/Kg生 | ± 2.4 | Bq/Kg生 | 22.3 | Cs137 | 0.9 | Bq/Kg生 | |
| | | Cs134 | | 11.1 | Bq/Kg生 | ± 2.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.8 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 2.3 | Bq/Kg生 | ± 1.3 | Bq/Kg生 | 9.8 | Cs137 | 1.3 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 7.5 | Bq/Kg生 | ± 1.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-----|--------|
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 62.3 | Bq/Kg生 | ± 12.5 | Bq/Kg生 | 96.4 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 34.1 | Bq/Kg生 | ± 7.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 92.4 | Bq/Kg生 | ± 18.5 | Bq/Kg生 | 145.2 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 52.8 | Bq/Kg生 | ± 10.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 58.2 | Bq/Kg生 | ± 11.8 | Bq/Kg生 | 91.9 | Cs137 | 2.1 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 33.7 | Bq/Kg生 | ± 7.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 1220.0 | Bq/Kg生 | ± 240.0 | Bq/Kg生 | 1746.0 | Cs137 | 2.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 526.0 | Bq/Kg生 | ± 105.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.1 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 55.5 | Bq/Kg生 | ± 11.2 | Bq/Kg生 | 82.2 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 26.7 | Bq/Kg生 | ± 5.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 178.0 | Bq/Kg生 | ± 36.0 | Bq/Kg生 | 268.0 | Cs137 | 2.1 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 90.0 | Bq/Kg生 | ± 18.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 104.0 | Bq/Kg生 | ± 21.0 | Bq/Kg生 | 153.9 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 49.9 | Bq/Kg生 | ± 10.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 60.1 | Bq/Kg生 | ± 12.0 | Bq/Kg生 | 89.5 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 29.4 | Bq/Kg生 | ± 6.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 61.8 | Bq/Kg生 | ± 12.5 | Bq/Kg生 | 92.5 | Cs137 | 2.3 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 30.7 | Bq/Kg生 | ± 6.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.2 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 73.7 | Bq/Kg生 | ± 14.7 | Bq/Kg生 | 107.9 | Cs137 | 2.3 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 34.2 | Bq/Kg生 | ± 7.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 71.9 | Bq/Kg生 | ± 14.4 | Bq/Kg生 | 109.2 | Cs137 | 1.2 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 37.3 | Bq/Kg生 | ± 7.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.1 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 7.6 | Bq/Kg生 | ± 2.3 | Bq/Kg生 | 15.1 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 7.5 | Bq/Kg生 | ± 2.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 四倉海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 112.0 | Bq/Kg生 | ± 22.0 | Bq/Kg生 | 170.2 | Cs137 | 2.6 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 58.2 | Bq/Kg生 | ± 11.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 57.1 | Bq/Kg生 | ± 12.3 | Bq/Kg生 | 85.9 | Cs137 | 3.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 28.8 | Bq/Kg生 | ± 6.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 3.1 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 92.6 | Bq/Kg生 | ± 18.5 | Bq/Kg生 | 128.0 | Cs137 | 2.9 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 35.4 | Bq/Kg生 | ± 7.4 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.2 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 51.6 | Bq/Kg生 | ± 10.7 | Bq/Kg生 | 81.5 | Cs137 | 2.4 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 29.9 | Bq/Kg生 | ± 6.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 四倉海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 105.0 | Bq/Kg生 | ± 21.0 | Bq/Kg生 | 171.2 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 66.2 | Bq/Kg生 | ± 13.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 60.5 | Bq/Kg生 | ± 12.1 | Bq/Kg生 | 96.6 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 36.1 | Bq/Kg生 | ± 7.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 102.0 | Bq/Kg生 | ± 20.0 | Bq/Kg生 | 156.9 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 54.9 | Bq/Kg生 | ± 11.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 61.4 | Bq/Kg生 | ± 12.3 | Bq/Kg生 | 95.7 | Cs137 | 1.2 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 34.3 | Bq/Kg生 | ± 6.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 四倉海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 50.5 | Bq/Kg生 | ± 10.3 | Bq/Kg生 | 77.5 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 27.0 | Bq/Kg生 | ± 5.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 135.0 | Bq/Kg生 | ± 27.0 | Bq/Kg生 | 195.0 | Cs137 | 3.1 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 60.0 | Bq/Kg生 | ± 12.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.4 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 265.0 | Bq/Kg生 | ± 53.0 | Bq/Kg生 | 398.0 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 133.0 | Bq/Kg生 | ± 27.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 海砂 (表層) | 福島県 四倉海岸 | 2014年1月 | Cs137 | 106.0 | Bq/Kg生 | ± 21.0 | Bq/Kg生 | 159.6 | Cs137 | 2.2 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 53.6 | Bq/Kg生 | ± 10.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 197.0 | Bq/Kg生 | ± 39.0 | Bq/Kg生 | 283.8 | Cs137 | 3.2 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 86.8 | Bq/Kg生 | ± 17.4 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 1090.0 | Bq/Kg生 | ± 220.0 | Bq/Kg生 | 1612.0 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 522.0 | Bq/Kg生 | ± 104.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 19.0 | Bq/Kg生 | ± 4.4 | Bq/Kg生 | 35.5 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 16.5 | Bq/Kg生 | ± 3.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 0.3 | Bq/Kg生 | ± 0.8 | Bq/Kg生 | 9.0 | Cs137 | 1.1 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 8.7 | Bq/Kg生 | ± 1.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 2.4 | Bq/Kg生 | ± 1.3 | Bq/Kg生 | 10.8 | Cs137 | 1.4 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 8.4 | Bq/Kg生 | ± 2.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | 0.2 | Bq/Kg生 | ± 1.6 | Bq/Kg生 | 5.7 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | 5.5 | Bq/Kg生 | ± 1.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 10.2 | Bq/Kg生 | ± 2.5 | Bq/Kg生 | 21.6 | Cs137 | 1.3 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 11.4 | Bq/Kg生 | ± 2.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 4.1 | Bq/Kg生 | ± 1.8 | Bq/Kg生 | 12.8 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 8.7 | Bq/Kg生 | ± 2.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 2.6 | Bq/Kg生 | ± 0.7 | Bq/Kg生 | 11.9 | Cs137 | 0.6 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 9.3 | Bq/Kg生 | ± 1.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | ± 0.6 | Bq/Kg生 | 9.2 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | 7.6 | Bq/Kg生 | ± 1.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 10.9 | Bq/Kg生 | ± 2.8 | Bq/Kg生 | 19.9 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 9.0 | Bq/Kg生 | ± 2.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 13.0 | Bq/Kg生 | ± 2.7 | Bq/Kg生 | 21.1 | Cs137 | 0.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 8.1 | Bq/Kg生 | ± 1.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 17.0 | Bq/Kg生 | ± 3.9 | Bq/Kg生 | 27.4 | Cs137 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 10.4 | Bq/Kg生 | ± 2.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.3 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | 14.2 | Bq/Kg生 | ± 2.8 | Bq/Kg生 | 21.8 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | 7.6 | Bq/Kg生 | ± 1.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 勿来海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 10.9 | Bq/Kg生 | ± 2.3 | Bq/Kg生 | 19.2 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 8.3 | Bq/Kg生 | ± 1.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 10.1 | Bq/Kg生 | ± 2.7 | Bq/Kg生 | 17.0 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 6.9 | Bq/Kg生 | ± 2.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 10.6 | Bq/Kg生 | ± 2.2 | Bq/Kg生 | 21.2 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 10.6 | Bq/Kg生 | ± 2.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | 23.7 | Bq/Kg生 | ± 5.3 | Bq/Kg生 | 39.5 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | 15.8 | Bq/Kg生 | ± 3.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 薄磯海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 60.7 | Bq/Kg生 | ± 12.5 | Bq/Kg生 | 130.6 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 69.9 | Bq/Kg生 | ± 14.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 5.4 | Bq/Kg生 | ± 2.6 | Bq/Kg生 | 37.4 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 32.0 | Bq/Kg生 | ± 6.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 8.2 | Bq/Kg生 | ± 1.8 | Bq/Kg生 | 31.8 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 23.6 | Bq/Kg生 | ± 4.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/Kg生 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| 海砂 (表層) | 福島県 薄磯海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 115.0 | Bq/Kg生 | ± 23.0 | Bq/Kg生 | 172.7 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 57.7 | Bq/Kg生 | ± 11.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 53.0 | Bq/Kg生 | ± 10.8 | Bq/Kg生 | 85.8 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 32.8 | Bq/Kg生 | ± 6.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 38.7 | Bq/Kg生 | ± 7.7 | Bq/Kg生 | 78.3 | Cs137 | 0.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 39.6 | Bq/Kg生 | ± 7.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 | ± 0.8 | Bq/Kg生 | 21.7 | Cs137 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 19.7 | Bq/Kg生 | ± 3.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 薄磯海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 61.3 | Bq/Kg生 | ± 12.3 | Bq/Kg生 | 93.8 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 32.5 | Bq/Kg生 | ± 6.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 62.1 | Bq/Kg生 | ± 12.4 | Bq/Kg生 | 93.5 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 31.4 | Bq/Kg生 | ± 6.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 65.4 | Bq/Kg生 | ± 13.1 | Bq/Kg生 | 104.1 | Cs137 | 2.1 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 38.7 | Bq/Kg生 | ± 8.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 62.5 | Bq/Kg生 | ± 12.5 | Bq/Kg生 | 99.7 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 37.2 | Bq/Kg生 | ± 7.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 小浜海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 19.4 | Bq/Kg生 | ± 4.4 | Bq/Kg生 | 32.9 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 13.5 | Bq/Kg生 | ± 3.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 40.7 | Bq/Kg生 | ± 8.4 | Bq/Kg生 | 59.7 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 19.0 | Bq/Kg生 | ± 4.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 108.0 | Bq/Kg生 | ± 22.0 | Bq/Kg生 | 160.7 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 52.7 | Bq/Kg生 | ± 10.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 186.0 | Bq/Kg生 | ± 37.0 | Bq/Kg生 | 272.8 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 86.8 | Bq/Kg生 | ± 17.4 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 小浜海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 21.9 | Bq/Kg生 | ± 4.6 | Bq/Kg生 | 33.1 | Cs137 | 1.3 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 11.2 | Bq/Kg生 | ± 2.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 17.3 | Bq/Kg生 | ± 4.1 | Bq/Kg生 | 30.4 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 13.1 | Bq/Kg生 | ± 3.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 22.6 | Bq/Kg生 | ± 5.1 | Bq/Kg生 | 34.5 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 11.9 | Bq/Kg生 | ± 2.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 15.4 | Bq/Kg生 | ± 3.1 | Bq/Kg生 | 24.6 | Cs137 | 0.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 9.2 | Bq/Kg生 | ± 1.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 小浜海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 24.4 | Bq/Kg生 | ± 5.0 | Bq/Kg生 | 38.3 | Cs137 | 1.1 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 13.9 | Bq/Kg生 | ± 3.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.0 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 24.9 | Bq/Kg生 | ± 5.6 | Bq/Kg生 | 40.8 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 15.9 | Bq/Kg生 | ± 3.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 35.1 | Bq/Kg生 | ± 7.5 | Bq/Kg生 | 51.1 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 16.0 | Bq/Kg生 | ± 3.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 26.8 | Bq/Kg生 | ± 5.9 | Bq/Kg生 | 42.6 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 15.8 | Bq/Kg生 | ± 3.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (表層) | 福島県 小浜海岸 | 2014年2月 | Cs137 | 26.5 | Bq/Kg生 | ± 5.9 | Bq/Kg生 | 42.9 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 16.4 | Bq/Kg生 | ± 3.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 35.9 | Bq/Kg生 | ± 7.5 | Bq/Kg生 | 55.1 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 19.2 | Bq/Kg生 | ± 4.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 36.0 | Bq/Kg生 | ± 7.6 | Bq/Kg生 | 51.7 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | Cs134 | 15.7 | Bq/Kg生 | ± 3.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 海砂 (表層) | 福島県 鮫川河口 | 2014年2月 | Cs137 | 18.3 | Bq/Kg生 | ± 6.1 | Bq/Kg生 | 41.7 | Cs137 | 6.9 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 23.4 | Bq/Kg生 | ± 6.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 6.3 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 18.2 | Bq/Kg生 | ± 4.3 | Bq/Kg生 | 31.0 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 12.8 | Bq/Kg生 | ± 3.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 21.5 | Bq/Kg生 | ± 5.1 | Bq/Kg生 | 39.6 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | |
| | | | Cs134 | 18.1 | Bq/Kg生 | ± 4.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 15.2 | Bq/Kg生 | ± 3.5 | Bq/Kg生 | 37.7 | Cs137 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 22.5 | Bq/Kg生 | ± 4.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | 福島県 鮫川河口 | 2014年2月 | Cs137 | 55.0 | Bq/Kg生 | ± 11.2 | Bq/Kg生 | 88.3 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 33.3 | Bq/Kg生 | ± 6.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | Cs137 | | | 11.5 | Bq/Kg生 | ± 2.7 | Bq/Kg生 | 22.4 | Cs137 | 1.3 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 10.9 | Bq/Kg生 | ± 2.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | | | 16.6 | Bq/Kg生 | ± 3.9 | Bq/Kg生 | 26.1 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 9.5 | Bq/Kg生 | ± 2.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | | 15.3 | Bq/Kg生 | ± 3.7 | Bq/Kg生 | 25.1 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 9.8 | Bq/Kg生 | ± 2.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 鮫川河口 | | 2014年2月 | Cs137 | 35.8 | Bq/Kg生 | ± 7.2 | Bq/Kg生 | 55.5 | Cs137 | 0.9 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 19.7 | Bq/Kg生 | ± 3.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.8 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | | Cs137 | | 17.0 | Bq/Kg生 | ± 4.0 | Bq/Kg生 | 28.5 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | |
| | | Cs134 | | 11.5 | Bq/Kg生 | ± 2.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ30cm) | | Cs137 | | 13.4 | Bq/Kg生 | ± 3.3 | Bq/Kg生 | 22.9 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | |
| | | Cs134 | | 9.5 | Bq/Kg生 | ± 2.4 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | | Cs137 | 14.7 | Bq/Kg生 | ± 3.6 | Bq/Kg生 | 25.5 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 10.8 | Bq/Kg生 | ± 2.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | 福島県 鮫川河口 | 2014年2月 | Cs137 | 27.8 | Bq/Kg生 | ± 6.1 | Bq/Kg生 | 46.1 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 18.3 | Bq/Kg生 | ± 4.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | Cs137 | | | 23.3 | Bq/Kg生 | ± 5.2 | Bq/Kg生 | 36.1 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 12.8 | Bq/Kg生 | ± 3.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | | | 13.9 | Bq/Kg生 | ± 3.2 | Bq/Kg生 | 25.6 | Cs137 | 1.2 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 11.7 | Bq/Kg生 | ± 2.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.1 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | | 14.9 | Bq/Kg生 | ± 3.6 | Bq/Kg生 | 25.5 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 10.6 | Bq/Kg生 | ± 2.6 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 鮫川河口 | | 2014年2月 | Cs137 | 19.8 | Bq/Kg生 | ± 4.0 | Bq/Kg生 | 34.4 | Cs137 | 0.9 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 14.6 | Bq/Kg生 | ± 3.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 0.9 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ30cm) | | Cs137 | 37.5 | Bq/Kg生 | ± 8.0 | Bq/Kg生 | 60.9 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 | | |
| | | Cs134 | 23.4 | Bq/Kg生 | ± 5.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | Cs137 | 14.9 | Bq/Kg生 | ± 3.5 | Bq/Kg生 | 27.8 | Cs137 | 1.4 | Bq/Kg生 |
| | | | | Cs134 | 12.9 | Bq/Kg生 | ± 3.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.3 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | Cs137 | | | 26.6 | Bq/Kg生 | ± 5.8 | Bq/Kg生 | 60.0 | Cs137 | 1.3 | Bq/Kg生 | |
| | Cs134 | | | 33.4 | Bq/Kg生 | ± 6.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.2 | Bq/Kg生 | |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | | 25.3 | Bq/Kg生 | ± 5.7 | Bq/Kg生 | 45.4 | Cs137 | 1.9 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 20.1 | Bq/Kg生 | ± 4.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ50cm) | Cs137 | | 19.8 | Bq/Kg生 | ± 4.6 | Bq/Kg生 | 34.6 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | | 14.8 | Bq/Kg生 | ± 3.4 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-----|--------|
| 海砂 (表層) | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | Cs137 | 16.4 | Bq/Kg生 | ± 3.9 | Bq/Kg生 | 28.5 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 12.1 | Bq/Kg生 | ± 2.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 24.9 | Bq/Kg生 | ± 5.7 | Bq/Kg生 | 42.7 | Cs137 | 2.0 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 17.8 | Bq/Kg生 | ± 4.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 22.4 | Bq/Kg生 | ± 4.9 | Bq/Kg生 | 34.2 | Cs137 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 11.8 | Bq/Kg生 | ± 2.8 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 24.4 | Bq/Kg生 | ± 5.3 | Bq/Kg生 | 38.3 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 13.9 | Bq/Kg生 | ± 3.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | Cs137 | 47.4 | Bq/Kg生 | ± 9.6 | Bq/Kg生 | 72.2 | Cs137 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 24.8 | Bq/Kg生 | ± 5.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | Cs137 | 20.4 | Bq/Kg生 | ± 4.7 | Bq/Kg生 | 34.7 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 14.3 | Bq/Kg生 | ± 3.4 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.7 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 25.6 | Bq/Kg生 | ± 5.7 | Bq/Kg生 | 40.8 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 15.2 | Bq/Kg生 | ± 3.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 25.4 | Bq/Kg生 | ± 5.6 | Bq/Kg生 | 39.7 | Cs137 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 14.3 | Bq/Kg生 | ± 3.3 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ50cm) | | | Cs137 | 20.6 | Bq/Kg生 | ± 4.6 | Bq/Kg生 | 29.3 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 8.7 | Bq/Kg生 | ± 2.2 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | Cs137 | 30.7 | Bq/Kg生 | ± 6.6 | Bq/Kg生 | 48.8 | Cs137 | 1.8 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 18.1 | Bq/Kg生 | ± 4.1 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | Cs137 | 25.6 | Bq/Kg生 | ± 6.1 | Bq/Kg生 | 39.8 | Cs137 | 2.5 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 14.2 | Bq/Kg生 | ± 3.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 2.2 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ15cm) | | | Cs137 | 22.4 | Bq/Kg生 | ± 4.9 | Bq/Kg生 | 32.6 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 10.2 | Bq/Kg生 | ± 2.5 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ30cm) | | | Cs137 | 18.8 | Bq/Kg生 | ± 4.2 | Bq/Kg生 | 26.2 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | | | Cs134 | 7.4 | Bq/Kg生 | ± 2.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | | | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | Cs137 | 42.4 | Bq/Kg生 | ± 8.8 | Bq/Kg生 | 64.4 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 |
| | | | | | Cs134 | 22.0 | Bq/Kg生 | ± 4.9 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| 海砂 (深さ15cm) | Cs137 | 14.3 | | | Bq/Kg生 | ± 3.4 | Bq/Kg生 | 22.0 | Cs137 | 1.5 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | 7.7 | | | Bq/Kg生 | ± 2.0 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (深さ30cm) | Cs137 | 14.0 | | | Bq/Kg生 | ± 3.3 | Bq/Kg生 | 19.9 | Cs137 | 1.6 | Bq/Kg生 | | |
| | Cs134 | 5.9 | | | Bq/Kg生 | ± 1.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/Kg生 | | |
| 海砂 (表層) | 福島県 豊間海岸 | 2014年3月 | | | Cs137 | 22.2 | Bq/Kg生 | ± 4.9 | Bq/Kg生 | 33.2 | Cs137 | 1.5 | Bq/Kg生 |
| | | | | | Cs134 | 11.0 | Bq/Kg生 | ± 2.7 | Bq/Kg生 | | Cs134 | 1.3 | Bq/Kg生 |